

FLORA
COCHINCHINENSIS:

SISTENS

PLANTAS IN REGNO COCHINCHINA NASCENTES.

QUIBUS ACCEDUNT ALIÆ

OBSERVATÆ

IN

SINENSI IMPERIO,

AFRICA ORIENTALI,

INDIÆQUE LOCIS VARIIS.

OMNES DISPOSITÆ SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE LINNÆANUM.

LABORE, AC STUDIO

JOANNIS DE LOUREIRO

Regiæ Scientiarum Academiæ Ulyssiponensis Socii : olim in Cochinchinâ Catholicæ Fidei Præconis : ibique rebus Mathematicis ,
ac Phycis in Aulâ Præfecti.

Jussu Acad. R. Scient. in lucem edita.

*Xylaloen , Myrrham , Piper ardens , Sacchara profert :
Pluraque , si repetas , officiosa dabit.*

TOMUS II.



ULYSSIPONE
TYPIS, ET EXPENSIS ACADEMICIS.

ANNO M.DCCXC.

Permiffu Regii Concilii pro Examine, & Cenfurâ Librorum.

COCCINILLINUS

PLANTAS IN REGNO COCCINILLINAE NASCENTES

SIMON J. PERIERO

SYSTEMA REGIALE PERIERIANUM

JOANNIS DE LOUREIRO

Regia Societas... Joannis de Loureiro...

Joannis de Loureiro in hunc editum


Exemplum... Joannis de Loureiro...

PERIERO



ULYSIUS

Regia Societas... Ulysius...


CLASSIS XIV.
DIDYNAMIA.
GYMNOSPERMIA.

* *Calyces sub-quinquesidi.*

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 1. | LEONURUS. | <i>Anthera punctis nitidis adspersa.</i> |
| 2. | MENTHA. | <i>Filamenta distantia, recta. Cor. sub-æqualis.</i> |
| 3. | TEUCRIUM. | <i>Cor. labium superius divaricatum: staminibus ascendentibus pervium.</i> |
| 4. | AJUGA. | <i>Cor. labium superius staminibus brevius.</i> |
| 5. | BETONICA. | <i>Cor. labium superius planum, ascendens: tubo cylindrico. Stam. longitudine faucis.</i> |
| 6. | BALLOTA. | <i>Cor. labium superius fornicatum. Calyx 10-friatus.</i> |
| 7. | LAMIUM. | <i>Cor. labium inferius utrinque dente setaceo.</i> |
| 8. | STACHIS. | <i>Cor. labium inferius lateribus reflexum. Stam. deflorata ad latera deflexa.</i> |
| 9. | NEPETA. | <i>Cor. labium inferius crenatum. Fauces margine reflexo.</i> |
| † 10. | BARBULA. | <i>Cor. labium inferius magnum, fimbriatum.</i> |

** *Calyces bilabiati.*

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 11. | SCUTELLARIA. | <i>Cal. fructiferus, operculatus.</i> |
| 12. | MELISSA. | <i>Cal. angulatus, scariosus: labio superiore ascendente.</i> |
| † 13. | DENTIDIA. | <i>Cal. labium superius 3-fidum denticulatum.</i> |
| 14. | OCYMUM. | <i>Cor. resupinata, Filam. bina basis processu:
Zz 15. DRA-</i> |

15. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflato-dilatata.
 16. TRICHOSTEMA. *Filamenta* longissima.
 † 17. COLEUS. *Filamenta* in tubum coalita, stylum vaginantia.
 18. ORIGANUM. *Strobilus* calyces colligens.
 19. CLINOPODIUM. *Involucrum* calyces colligens.

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

20. ACANTHUS. *Capsula* 2-locularis. *Cor.* 1-labiata, 3-fida. *Antheræ* villosæ.

** *Calyces 4-fidi.*

21. GMELENA. *Drupa* nucleo 2-loculari. *Cor.* bilabiata. *Antheræ* binæ crassiores bipartitæ.
 22. LANTANA. *Drupa* nucleo 2-loculari. *Cor.* hippocraterif. *Stigma* uncinatum.
 23. BARLERIA. *Capsula* 2-locularis. *Cor.* infundibulif. *Sem.* bina. *Caps.* elastica.

*** *Calyces quinquesfidi.*

- † 24. CAMPSIS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* infundibulif. *Stamin.* mutuo inflexa.
 25. DIGITALIS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata, subtus ventricosa. *Stam.* declinata.
 26. BIGNONIA. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata.
 27. RUELLIA. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Stamin.* per paria approximata.
 † 28. DICEROS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata: laciniis obcordatis. *Antheræ* lobis divaricatis.

29. SESAMUM. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* campanulata, inæqualis. *Rudim.* filamenti quinti.
30. CHELONE. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* personata, inflata, clausa. *Rudim.* filamenti quinti.
31. ANTIRRHINUM. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* personata, subtus nectario prominente.
32. COLUMNEA. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* ringens, supra basim gibba. *Antheræ* connexæ.
- † 33. MAZUS. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* ringens: fauce papillofâ. *Antheræ* connexæ. *Cal.* 5-gonus.
34. MANVLEA. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* limbus 5-partitus: lacinia inferiore profundiore, reflexa.
35. MARTYNIA. *Caps.* 4 - locularis, lignosa. *Cor.* ringens, inflata.
36. CORNUTIA. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* ringens. *Stylus* longissimus.
37. CLERODENDRUM. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* ringens. *Stam.* longissima.
38. VOLKAMERIA. *Bacca* 2 - sperma. *Cor.* laciniis secundis. *Sem.* bilocularia.
39. VITEX. *Bacca* 4 - sperma. *Cor.* ringens: labio superiore 3-fido.
- † 40. TRIPINNA. *Bacca* polysperma. *Cor.* sub-campanulata; 5-fida: summâ maiori. *Cal.* cyathiformis.
- **** *Calyces* multifidi.
- † 41. SEPTAS. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* infundibulif. *Cal.* 7-partitus, inæqualis.
- ***** *Calyces* polyphylli.
- ‡ 42. PICRIA. *Bacca* 2 - locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* 4-phyllus.

GYMNOSPERMIA.

GENUS I. LEONURUS.

Char. Gener. *Anthera* punctis nitidis adpersæ. Lin. fy. pl. G. 780.

Sp. I. LEONURUS MARRUBIASTRUM. γ . . .

Differ. spec. Leon. *foliis* ovatis, lanceolatisque, serratis: *calycibus* sessilibus, spinosis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, simplex, quadrifidus. *Folia* omnia lanceolata, serrata, tomentosa, opposita. *Flos* croceus, capitulis lateralibus: *calycibus* spinosis, sessilibus.

Corolla ringens: tubo longo: labio superiore oblongo, integro, villosa, fornicato, stamina obtegente: inferiore brevior, 3-fida, laciniis obtusis. *Anthera* oblongæ, 2-fidæ, compressæ, exoticæ.

In illis microscopio observavi puncta illa nitida, elevata, sub-globosa, sparsa: cognovique nihil aliud esse, quam pollen vesiculare conglobatum, quod se junctim, aut in particulas minores conjunctum similiter nitet in aliis floribus partibus, germine, filamentis, & interiori tubo corollæ, in quas deciderat.

Habitat prope litora Africæ Orientalis in Zanguebariâ.

Sideritis foliis ovatis, & lanceolatis, inciso-serratis. Lin. H. Cliff. pag. 313. Leonurus Marrubiastrum. Burm. Ind. pag. 127.

GENUS II. MENTHA.

Char. Gener. *Cor.* sub-æqualis, 4-fida: laciniâ latiore emarginatâ. *Stam.* erecta, distantia. Lin. fy. pl. G. 771.

Sp. I. MENTHA CRISPA. α Rau húng.: Rau thom tau. β . . .

Differ. spec. Ment. *spicis* capitatis: *foliis* cordatis, dentatis, undulatis, sessilibus: *staminibus* corollam æquantibus. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Radix* perennis. *Caulis* herbaceus, sub-erectus, 6-pollicaris, 4-gonus, repens, rubescens. *Folia* sub-rotunda, sub-cordata, dentata, crispa, sessilia opposita. *Flos* dilute purpureus: *spicis* brevibus, capitatis. *Stamina* corollam sub-æquantia.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ ubique obvia.

Hort. Cliff. pag. 306. Berg. Mat. Med. pag. 343.

Virtus: totius herbæ. Resolvens, Stomachica, Deobstruens, Anthelmintica.

Usus in Anorexiâ, Colicâ, Hystericâ, Vermibus, obstructionibus mesentericis, maximè infantum. Præterea frequens, & gratus in condimento ciborum ejus usus.

Sp. 2.

Sp. 2. MENTHA HIRSUTA. *a* Rau thom nam. *β* Hiám tsái.
Differ. spec. Ment. *floribus* capitatis : *foliis* ovatis pubescentibus ;
ferratis : *staminibus* corollá longioribus. Lin. sp. 6.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , 1-pedalis , erectus , cespitosus , 4-
gonus : radice perenni , repente. *Folia* ovato-lanceolata , ferrata ,
pilosa , non crispa , opposita. *Flos* albo-violaceus , axillaris , capi-
tulatus : pedunculis propriis brevibus , communi longiore : *involu-
cro* communi 2-phylo , lanceolato. *Stamina* corollá longiora : *pe-
dunculi* omnes pilosi. Odor , sapor , usus fere iidem , qui præce-
dentis , sed debiliores.

Habitat in Cochinchinâ , & Chinâ similiter culta.

Mentha Aquatica hirsuta. Bauh. hist. 3, pag. 224. Hill. Brit. herb. pag.
351. sp. 1. tab. 50. fig. 11.

Sp. 3. MENTHA PULEGIUM. *a* Cây bạc hà. *β* Pồ hó.

Differ. spec. Ment. *floribus* verticillatis : *foliis* ovatis , obtusis , sub-
crenatis : *caulibus* sub-teretibus , repentibus : *staminibus* corollá ,
longioribus. Lin. sp. 14.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , perennis , sesquipedalis , sub-tetra-
gonus , fuscus , repens. *Folia* ovato-lanceolata , sub-crenata , oppo-
sita , petiolata. *Flos* albo-purpureus , verticillis axillaribus. *Calyx* 5-
fidus. *Corolla* infundibuliformis , 5-fida , sub-æqualis. *Stamina* Di-
dynamica , erecta , corollá longiora. *Semina* 4 , nuda.

Habitat agrestis , cultaque in Chinâ , & Cochinchinâ.

Pulegium Latifolium. Bauh. Pin. pag. 222. Math. in Diosc. 1. 3. cap.
30. pag. 521. fig. ibi.

Virtus : foliorum. Resolvens , Pectoralis , Cephalica , Diaphoretica ,
Emmenagoga. Prodest in Asthmate , Tussi , Hysteriâ , Cephalgiâ ,
Epilepsiâ puerorum.

† Sp. 4. MENTHA STELLATA. *a* Rau ngu hoang.

Differ. spec. Ment. *spicis* congestis , terminalibus : *foliis* stellatis ;
ferratis.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , erectus , 1-pedalis , 4-fidus : ra-
dice perenni , repente. *Folia* stellata , quaterna , oblonga , obtusa ,
ferrata , glabra. *Flos* minimus , albo-violaceus : *spicis* oblongis ,
congestis , terminalibus. *Calyx* 5-fidus , erectus , persistens : laciniis
acutis , sub-æqualibus. *Corolla* tubulosa , calyce duplo longior , basi
dilatata : limbo patente , 4-fido , laciniis obtusis , brevibus , unâ
emarginatâ. *Filamenta* 4 , quorum duo breviora , erecta , distantia ,
corollá longiora : pilis longis in medio circumdata. *Anthera* sub-
rotundæ , minimæ. *Germen* 4-fidum , superum. *Stylus* 2-fidus , de-
flexus ,

flexus, æqualis staminibus. *Stigmata* patentia. *Semina* 4, subrotunda, nuda.

Habitat loca humida incolta in Cochinchinâ.

GENUS III. TEUCRIUM.

Char. Gener. *Cor.* labium superius (nullam) ultra basim 2-partitum, divaricatum ubi *stamina*. Lin. fy. pl. G. 764.

Sp. 1. TEUCRIUM POLIUM. β Ty tam tsào. & Dia tam thao.

Differ. spec. *Teuc. capitulis* sub-rotundis: *foliis* oblongis, obtusis, crenatis, tomentosis, sessilibus: *caule* prostrato. Lin. sp. 32.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, sub-erectus; cespitosus, perennis, 4-gonus, purpurascens. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, crenato-incisa, tomentosa, opposita, petiolis brevibus. *Flos* dilute purpureus, capitulis sub-rotundis, densis, pilosissimis, terminalibus. *Calyx* 5-fidus. *Corollæ* labium superius brevissimum, divaricarum, emarginaturâ amplectens *stamina* ascendentia: labium inferius 3-fidum, laciniis rotundatis, mediâ emarginatâ. Glandula ad basim geminis, ut in *Lathræâ*. *Semina* 4 nuda, calycem, & corollæ tubum in maturitate dilatantia.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Podium candidum tomentosum, flore purpureo. Tourn. Inst. pag. 206. sp. 9.

Sp. 2. TEUCRIUM MASSILIENSE. α Tia co dat.

Differ. spec. *Teuc. foliis* ovatis, rugosis, inciso-crenatis: *caulibus* erectis: *racemis* rectis secundis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, 4-gonus, albicans, glaber. *Folia* ovata, acuta, profundè crenata, rugosa, opposita. *Flos* violaceus, spicis erectis, terminalibus. *Calyx* ovatus, 5-fidus. *Corolla* tubo cylindræo: labio superiore sub-nullo. *Semina* 4, nuda. Magnam hujus plantæ virtutem prædicant Indigenæ, quam propriâ experientiâ nondum probatam inculcare non præsumo.

Habitat incultum in Cochinchinâ.

Teucrium Creticum. Clus. hist. r. pag. 348. *Chamædriis* fruticosa. *Melissæ* folio. Tournes. Inst. pag. 205. sp. 8.

Sp. 3. TEUCRIUM UNDULATUM. α Cay som som.

Differ. spec. *Teuc. foliis* oblongis, undulatis, sub-crenatis: *corymbo* terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, teres, 5-pedalis: *ramis* patent-

patentibus. *Folia* ovato-oblonga[!], obtusa, undulata, sub-crenata, glabra, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, corymbo racemoso, terminali. *Corolla* 5-fida: tubo brevi: laciniis obtusis, superioribus divaricatis. *Stamina* longissima, ascendentia. *Semina* 4-nuda, calyce persistente forata.

Habitat ad sepēs Cochinchinæ.

† Sp. 4. TEUCRIUM THEA. α. Cây Chè baông.

Differ. spec. Teuc. *foliis* ovato-lanceolatis: *caule* procumbente: *pedunculis* axillaribus 3-floris.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 8-pedalis, procumbens, glaber; inermis, teres, ramulosus. *Folia* ovato-oblonga, acuta, integerrima, petiolata, glabra, opposita. *Flos* albus, axillaris: *pedunculis* 3-floris. *Stamina* Didynamica, corollâ longiora. *Stigma* acutum 2-partitum. *Semina* 4, calyce forata.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Virtus: foliorum. Attenuans, Deobstruens, Diuretica, Theam vocant indigenæ, addito vernaculo nomine; eaque frequenter utuntur ad digestionem promovendam, maximè quando sentiunt stomachum gravatum nimia ingurgitatione,

GENUS IV. AJUGA.

Char. Gener. *Cor.* labium superius minimum. *Stam.* labio superiore longiora. Lin. sy. pl. G. 763.

Sp. 1. AJUGA ORIENTALIS. α. Thich thao.

Differ. spec. Aj. *floribus* resupinatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* sesquipedalis, erectus, 4-gonus, perennis; fusco-purpureus. *Folia* ovata, sub-acuta, crenata, subtus tomentosa, opposita. *Flos* purpurascens, terminalis, & axillaris, spicatus. *Calyx* acutè semiquinque fidus, hirsutus, connivens. *Corolla* resupinata, labio superiore vix ullo; laciniis binis minimis, divaricatis; utrinque adhaerentibus labio inferiori, 3-fido. *Stam.* Didynamica, breviora. *Semina* nuda.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

Bugula Orientalis, villosa, flore inverso, candido, cum oris purpureis. Tournef. Cor. pag. 14. lin. 30. Ajuga Orientalis. Thunb. Jap. pag. 243.

Sp. 2. AJUGA REPTANS. β.

Differ. spec. Aj. *stolonibus* reptantibus. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, teres, villosus, repens. *Folia* ovata,

364 DIDYNAMIA. GYMNOSPERMIA.

ta, utrinque attenuata, crenata, incisa, crassa, villosa, opposita; radicalia minima. *Flos* albus, spicis terminalibus, verticillatis, interruptis: *bracteis* ovato-lanceolatis, integerrimis. *Calyx* 5-fidus, hirsutus, laciniis æqualibus, conniventibus. *Corolla* labium superius minimum, staminibus brevius. *Semina* 4, calyce persistente servata. Corollæ non resupinatae.

Habitat inculta circa Cantonem Sinarum. Nomen Sinicum non potui indagare.

Consolida Media, pratensis, purpurea. Bauh. Pin. pag. 260. n. 2. Ajuga Decumbens. Thunb. Jap. pag. 243.

GENUS V. BETONICA.

Char. Gener. *Cal.* aristatus. *Cor.* labium superius ascendens, planiusculum: tubo cylindrico. Lin. sy. pl. G. 776.

Sp. I. BETONICA OFFICINALIS? α Hoac huong, β Hô hiâm.

Differ. spec. Bet. *spicâ* interruptâ. *Corollarum* labii lacinia intermedia emarginata. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, sesquipedalis, sub-erectus, 4-gonus: *radice* repente: *ramis* oppositis, geniculatis. *Folia* oblongo-ovata, aliqua sub-cordata, profundè crenata, utrinque pubescentia, opposita: petiolis longis, gracilibus. Odor sub-aromaticus, gratus, debilis. Sapor fatuus. Florentem non vidi, quamvis in proprio horto per multos annos cultam: adeoque de specie certò judicare non possum nisi ex habitu.

Habitat non rarò culta in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Berg. Mat. Med. pag. 555. Betonica. Hort. Clifort. pag. 310.

Virtus: foliorum. Calefaciens, Tonica, Stomachica.

GENUS VI. BALLOTA.

Char. Gener. *Cal.* hippocrateriformis, 5-dentatus, 10-friatus. *Corollæ* labium superius crenatum concavum. Lin. sy. pl. G. 778.

† Sp. I. BALLOTA PILOSA. α Rau nhaong.

Differ. spec. Bal. *foliis* ovatis, crenatis, tomentosis: *verticillis* pilosis: *calycibus* 10-dentatis.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 4-pedalis, erectus, debilis, 4-gonus, striatus, pilosus, ramosus. *Folia* ovata, acuta, crenata, tomentosa, opposita. *Flos* albus, 2-labiatus, verticillis axillaribus, pilosis. *Calyx* tubulosus, recurvus, 10-friatus, limbo 10-dentato, dentibus acutis, reflexis. *Corollæ* labium superius fornicatum, integrum:

tegrum : inferius patens , 3-fidum. *Semina* 4 ; nuda. Stam. Didynamica.

Observ. A Ballotâ Distichâ imprimis differt calycibus 10-dentatis. Differt etiam foliis ovatis , crenatis , nec cordatis , & serratis ut in Ballota Distichâ videntur.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

GENUS VII. LAMIUM.

Char. Gener. *Cor.* labium superius integrum , fornicatum : labium inferius 2-lobum. *Faux* utrinque margine dentata. Lin. sy. pl. G. 774.

Sp. I. LAMIUM GARGANICUM. α Cỏ cút lạn. β Hĩ kiem tsào.

Differ. spec. Lam. *foliis* cordatis , pubescentibus : *corollis* fauce inflatâ , tubo recto , dente utrinque gemino. Lin. sp. 3.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , perennis , erectus , 3-pedalis , 4-gonus , ramosus , albicans. *Folia* cordata , sub-acuta , inæqualiter crenata , pubescencia , opposita petiolata. *Flos* albo-purpureus , spicis verticillatis. *Calyx* 5-fidus. *Corollæ* labium superius fornicatum ; integrum : inferius 2-lobum. Tubus rectus. *Faux* utrinque margine dentatâ. *Stamina* didynamica : *antheris* sub-rotundis , purpureis. *Stigma* acutum , 2-fidum. *Semina* 4 , nuda.

Habitat incultum in Cochinchinâ , & Chinâ : odore ingratum.

Thunb. Fl. Jap. pag. 246.

GENUS VIII. STACHYS.

Char. Gener. *Cor.* labium superius fornicatum : *lab.* inferius lateribus reflexum : intermediâ maiore , emarginatâ. *Stamina* deflorata versus latera reflexa. Lin. sy. pl. G. 777.

† Sp. I. STACHYS ARTEMISIA. α Cây lết máu. β Kẽ hoét : Sung úy.

Differ. spec. Stac. *verticillis* multifloris : *foliis* incisifs : *caule* simplici.

Hab. , & notæ. *Caulis* annuus , rectus , simplex , 3-pedalis , 4-gonus , sulcatus , albicans. *Folia* magna , radicalia sub-rotunda , crenata : caulina longiora , pinnati-fida , incisa , subtus tomentosa , petiolata , opposita. *Flos* bilabiatus , albo-purpureus , oblongus , verticillis polyfloris , axillaribus. *Calyx* angulatus , 5-fidus , laciniis acutis , binis inferioribus longioribus , pungentibus. *Corollæ* labium superius ovatum , integerrimum , fornicatum : inferius 3-fidum , laciniâ mediâ emarginatâ , lateralibus reflexis. *Stamina* 4 , quorum duo breviora , ad labium superius deflexa. *Stigma* acutum , 2-fidum.

Aaa

Semi-

Semina 4, nuda, longiuscula. *Odor* parum gratus. *Sapor* sub-amarus.

Habitat culta, incultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus: foliorum, florum, & feminum. Resolvens, Corroborans.

Valet in affectibus Hystericis, & aliis provenientiibus ex utero, cujus fluorem cohibet, dolores sedat, sanguinis grumos dissolvit, secundinas expellit. Usus tam internus, quam externus, nec violentus.

Observ. Habitum hujus plantæ nondum florentis est valde similis Artemisiæ Unicaulis: virtus Medica ab Artemisiæ Vulgaris vix differt; ideo aliqui Practici in illis locis pro verâ Artemisiâ habuerunt. Ast flos omnino repugnat, qui veræ Stachyos est.

GENUS IX. NEPETA.

Char. Gener. *Cor.* labium inferius lacinulâ intermediâ crenatâ. *Faux* margine reflexo. *Stam.* approximata. Lin. sy. pl. G. 768.

Sp. 1. NEPETA HIRSUTA. a. Cay mè dat.

Differ. spec. *Nep. floribus* sessilibus verticillato-spicatis, tomento involutis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, erectus, 4-gonus, pilosus, pallidus. *Folia* lanceolata, ferrata, hirsuta, sessilia, opposita. *Flos* albus, sessilis, verticillis axillaribus, pilis multis intermixtis. *Corollæ* labium inferius latius, crenatum: *faucis* margine reflexâ. *Stamina* recta, approximata. *Semina* 4.

Habitat spontanea in agris Cochinchinæ.

Hort. Cliffort. pag. 311. n. 3.

+ GENUS X. BARBULA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-fidum: laciniis acutis, erectis, æqualibus.

Cor. Ringens, tubo calyci æquali: limbo 5-fido, laciniis 4 labii superioris ovatis, erectis, sub-æqualibus: labium inferum magnum, patens, incurvum, terminatum fimbriâ longâ, capillari.

Stam. Filamenta 4, erecta, quorum 2 longiora, corollam superantia. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen sub-rotundum, 4-sulcum. Stylus 2-fidus, brevior staminibus. Stigmata simplicia.

Peric. Nullum. Calyx connivens.

Sem. 4, sub-rotunda, nuda.

Nom.

Nom. Barbulam dixi a fimbriâ barbata labii inferioris.

Char. Gener. *Cor.* Labium inferius magnum, fimbriatum: superius 4-fidum, laciniis ovatis.

† Sp. 1. BARBULA SINENSIS. α Sat song kim.

Differ. spec. Bar. *floribus* verticillatis: *foliis* oblongis, serratis.

Hab. *Frutex* lignosus, 1-pedalis: *ramis* ascendentibus, paucis. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, serrata, basi integerrima, lineata, tomentosa, opposita: *petiolis* brevibus. *Flos* albus axillaris, verticillis fastigiatis. Planta grati odoris.

Habitat Cantone Sinarum inculta.

GENUS XI. SCUTELLARIA.

Char. Gener. *Cal.* ore integro: post florescentiam clauso, operculato. Lin. sy. gl. G. 792.

Sp. 1. SCUTELLARIA ALTISSIMA. α Cây thiét còt: Thiét còt rìng.

Differ. spec. Scut. *foliis* cordato-oblongis, acuminatis, serratis: *spicis* sub-nudis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 3-pedalis, 4-gonus, ramosus. *Folia* cordato-oblonga, acuminata, serrata, tomentosa, opposita. *Flos* cæruleus, spicis longis, sub-nudis, terminalibus. *Stamina* 4, Didynamica, longa. *Stigma* acutum. *Calyx* integer, foliolo quodam rotundo, concavo femina nuda operiens.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Cassida Orientalis altissima, urticæ folio. Tourn. Cor. pag. 11. lin. 15.

Virtus. Emmenagoga, Consolidans. Usus externus proficius in ossium fracturis.

Sp. 2. SCUTELLARIA ALBIDA. α Thiét còt tâu.

Differ. spec. Scut. *foliis* sub-cordatis, serratis, rugosis, opacis: *spicis* secundis: bracteis ovatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 1-pedalis, 4-gonus, tomentosus, rubescens, sub-erectus, aliquando repens. *Folia* cordata, obtusa, serrata, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, spicis brevibus, foliosis, terminalibus.

Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Scutellaria Teucriti facie, flore albo. Bauh. hist. 3. pag. 291.

Sp. 3. SCUTELLARIA ALPINA. α Hán sấn thao.

Differ. spec. Scut. *foliis* cordatis, inciso-crenatis: *spicis* imbricatis, rotundato-tetragonis. Lin. sp. 3.

Aaa ii

Hab.,

368 DIDYNAMIA. GYMNOSPERMIA.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, erectus, sesquipedalis. *Folia* cordata, obtusa, profundè crenata, tomentosa, opposita. *Flos* violaceus, terminalis, spicis oblongis, sub-tetragonis. *Calyx* integer, rotundatus, pilosus. *Corolla* ringens, tubo longo, ad basim tumido, retrorsum flexo. *Semina* 4, squamâ calycinâ tecta.

Habitat in Cochinchinâ, agrestis.

Teucrium Alpinum, inodorum, magno flore. Bauh. Pin. pag. 247. n. 5.

GENUS XII. MELISSA.

Char. Gener. *Cal.* aridus, supra planiusculus: labio superiore sub-fastigatio. *Cor.* labium superius sub-fornicatum, 2-fidum: labium inferius lobo medio cordato. Lin. sy. pl. G. 786.

Sp. 1. MELISSA CRETICA. β Tsù sū. α Tu tó.

Differ. spec. Mel. *racemis* terminalibus: *pedunculis* solitariis, brevissimis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, ramifus. *Folia* lato-ovata, acuta, obtusè serrata, lævia, opposita, petiolis longis. *Flos* albo-purpureus, racemis spicatis, terminalibus: *pedunculis* florum brevissimis. *Caulis*, *petioli*, *folia*, *calyces*, omnia rubro-fusca, parco viridi maculata, mixto odore Pulegii, & cimicum imbuta.

Habitat culta in Chinâ, & Cochinchinâ.

Thunb-Japon. pag. 247. Calamintha Clinopodii Austriaci foliis, odore Pulegii. Pluk. Almg. 75. tab. 163. fig. 4.

Virtus: foliorum, & seminum. Resolvens, Diaphoretica, Cephalica. Prodest in Cephalgiâ, Hypochondriaci, & Maniâ ex humoribus crassis, & frigidis ortis. Foliis recentibus vescuntur indigenæ in acetariis.

† Sp. 2. MELISSA RUGOSA. α Tia tó nhâm lá.

Differ. spec. Mel. *racemis* confertis axillaribus, & terminalibus: *foliis* rugosissimis, sub-rotundis, acuminatis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, 4-gonus, erectus, ramosissimus. *Folia* rugosissima, sub-rotunda, acuminata, serrata, opposita, petiolata. *Flos* albo-ruber, racemis confertis axillaribus, & terminalibus. Planta tota, corollis exceptis, colore obscuro-viridi prædita. Odore, & virtute præcedenti similis.

Habitat culta, & spontanea in Cochinchinâ.

GENUS XIII. DENTIDIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium bilabiatum, 5-fidum, nitidum, pilosum, 5-nerviis; erectum: laciniis 3 superioribus obtusis, denticulatis: 2 inferioribus subulatis, longioribus.

Corolla. Ringens, pilosa: labio superiore 4-fido, laciniis sub-æqualibus, rotundatis, erectis: labio inferiore maiore, integerrimo, incurvo, reflexo.

Stam. Filamenta Didynamica, fauci infidentia, omnia corollâ breviora. Antheræ 2-lobæ, stantes, lobis ad basim divaricatis.

Pist. Germen 4-fidum. Stylus brevis, æqualis staminibus. Stigma acutum, 2-fidum.

Peric. Nullum. Calyx persistens, femina fovens.

Sem. 4, sub-rotunda.

Nom. Dentidia a calycis laciniis superioribus denticulatis.

Char. Gener. Cal. laciniis 3, superioribus denticulatis. Cor. labium superius brevius, 4-fidum: inferius integerrimum.

† Sp. I. DENTIDIA NANKINENSIS. *β* Kiam nân tsu sū.

Differ. spec. Dent. *foliis* reniformibus, *simbriatis*: *spicis* prismaticis; axillaribus.

Hab. *Caulis* herbaceus annuus, 1-pedalis, erectus, duriusculus, 4-gonus, rectus, purpureus, glaber: ramis brachiatis. *Folia* reniformia, concava, limbo reflexo, simbrato, glabra, fusco-purpurea, opposita, petiolis longis. *Flos* albo-ruber, spicis prismaticis, quadrangulis, axillaribus. *Planta* aspectu elegans: colore, & odore *Melissæ* Creticæ similis: foliis, spicis, calyce, & corollâ differens. Habitat Nankini in Sinis: inde Cantonem delata ob pulchritudinem studiosè colitur.

GENUS XIV. OCYMUM.

Char. Gener. Cal. labio superiore orbiculato: inferiore 4-fido. Corollæ resupinatæ alterum labium 4-fidum, alterum indivisum. Filamenta exteriora basi processum emittentia. Lin. fy. pl. G. 790.

Sp. I. OCYMUM GRATISSIMUM. *α* Rau ê lôn h.

Differ. spec. Oc. *caule* suffruticoso: *foliis* lanceolato-ovatis, *racemis* teretibus. Lin. sp. 3.

Hab. 2

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, rectus, 5-pedalis, 4-sulcatus, glaber, albicans, ramosus. *Folia* lanceolato-ovata, sub-ferrata, sub-rus punctata, superius lanuginosa, pallida, odoratissima, opposita, petiolata. *Flos* albus, *calycibus* coloratis: *racemis* spicatis, lateralibus, & terminalibus: *bracteis* acutis flores pedunculatos distinguentibus.

Habitat in hortis Cochinchinæ.

Ocymum Zeylanicum, perenne, odoratissimum, latifolium. Burm.

Zeyl. pag. 174. tab. 80. fig. 1. Oc. Gratissimum. Burm. Ind. pag. 129.

Virt. Pellens; Excitans, Stomachica. Usus culinaris.

Sp. 2. OCYUM BASILICUM. α Rau É tiá: Rau Qúe.

Differ. spec. Oc. *foliis* ovatis glabris: *calycibus* ciliatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, teres, fuscus, tomentosus, ramis rectis, ascendentibus. *Folia* ovata, sub-acuta, ferrata, pubescentia, rubro-fusca, undulata, opposita, petiolata, caryophyllos aromaticos redolentia. *Flos* albus, minutus, racemis spicatis, longis, erectis, terminalibus: *calycibus* pilosis, bracteatis, pedunculatis.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ.

Basilicum Indicum, tertium, nigrum: Rumph. Amb. 1. 8. c. 55. tab. 92.

fig. 1. Ocimum Crispum Thunb. Jap. pag. 248. Ocimum Caryophyllatum maius. Bauh. Pin. pag. 226.

Virtus: foliorum, & spicarum efficacior præcedente. Attenuans, Pellens, Excitans, Cephalica. Valet in Cephalgia petuitosa, doloribus Rheumaticis, & vagis. Semina efficacissima habentur contra morsus, & venena serpentum, si masticata partim devorentur, partim recenti plagæ imponantur.

Sp. 3. OCYUM MINIMUM. α Rau é nhó lá.

Differ. spec. Oc. *foliis* ovatis, integerrimis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, teres, glaber: *ramis* multis, patentibus. *Folia* ovata, integerrima, parva, glabra, opposita, odorata, lætè virentia. *Flos* albus, spicis simplicibus, terminalibus.

Habitat in hortis Cochinchinæ rarè.

Ocimum Minimum. Burm. Ind. pag. 129. Bauh. Pin. pag. 226. n. 10.

† Sp. 4. OCYUM AFRICANUM. γ

Differ. spec. Ocym. *foliis* lanceolatis, integerrimis, pilosis: *spicis* terminalibus, verticillatis, interruptis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, erectus, 4-gonus, pilosus: ramis paucis, ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima,

DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA. 371

rima, pilosa, opposita, petiolata. *Flos* albus, minutus, resupinatus, *spicis* verticillatis, erectis, longis, terminalibus: verticillis interruptis, hirsutis. Tota planta suave-oler.

Habitat incultum in arenariis Africæ Orientalis, Dubi illud virens ad examen revocavi.

Huic approximatur spicâ verticillatâ *Ocymum Album*. Lin. sp. 4. *Ocymum Verticillatum*. Lin. Jun. Sup. plant. pag. 276. *Ocymum Virgatum* Thunb. Jap. pag. 250. & *Ocymum Citratum* Rumph. Amb. 1. 8. c. 57. tab. 93. fig. 1. Omnia tamen ab Africano differunt foliis rotundioribus, & aliis notis. Rumphianum minus distat. Norandum est eandem *Ocymi* species, etiam in Indiâ, earum natali solo, frequenter variare habitum, & formam.

GENUS XV. DRACOCEPHALUM.

Char. Gener. *Cor.* faux inflata: *labium* superius concavum. Lin. Sy. pl. G. 787.

† Sp. 1. DRACOCEPHALUM COCHINCHINENSE. α Cây cỏ đỏ.
Differ. spec. *Drac. floribus* spicatis: *bracteis* sub-rotundis, acutis. *Foliis* ovato-lanceolatis, integerrimis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 10-pollicaris, erectus, 4-gonus sulcatus, villosus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, villosa, pauca, opposita. *Flos* violaceus, spicatus, terminalis: *bracteis* sub-rotundis, acutis, multifloris. *Corolla* fauce inflatâ: labio superiore concavo. *Filamenta* Didynamica, pilosa. *Stigma* acutum, 2-fidum, laciniis inæqualibus, mutuo inflexis. *Semina* 4.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

GENUS XVI. TRICHOSTEMA.

Char. Gener. *Cor.* labium superius falcatum. *Stamina* longissima. Lin. Sy. pl. G. 791.

† Sp. 1. TRICHOSTEMA SPIRALIS. α Cây rau meo.
Differ. spec. *Tric. staminibus* longissimis, spiralibus.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, erectus, 4-gonus: *ramis* brachiatis. *Folia* ovata, acuta, integerrima, tomentosa, opposita. *Flos* albo-violaceus, spicis longis, terminalibus. *Calyx* 2-labiatus. *Corolla* ringens, labio superiore falcato. *Stamina* longissima, in helicem convoluta (quorum 2-breviora) intra corollam retenta. *Semina* 4, nuda.

Observ. Ad *Trich. Brachiata* Linnæi quodammodo accedit: sed nostræ

372 DIDYNAMIA. GYMNOSPERMIA.

nostræ stamina nullatenus brevia dici possunt, imo nec mediocria.
Habitat inculta in Cochinchinâ.

† GENUS XVII. COLEUS.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium bilabiatum : labio superiore 4-fido, laciniis linearibus : inferiore lanceolato, integerrimo, incurvo, longiore.
† Cor. Ringens, calycem superans : labio superiore ascendente, brevi obtuso, 4-fido, laciniis lateralibus brevioribus : labio inferiore ovato, concavo, integro, duplè longiore.
Stam. *Filamenta* 4 (quorum 2 breviora) filiformia, sub-inflexa, faucibus infidentia, corollâ duplè longiora : omnia ad medium usque coalita in tubum, vaginantem stylum. Antheræ ovatae, incumbentes.
† Pist. Germen 4-fidum. Stylus æqualis staminibus. Stigma acutum, 2-fidum.
Peric. Nullum. Calyx fovens femina.
Sem. 4 ovata.
Nom. (Κολέος vagina) a filamentis stylum vaginantibus.
Char. Gener. Filamenta in tubum coalita, stylum vaginantia.

- † Sp. I. COLEUS AMBOINICUS. *α* Rau thom loug : Trà τό τὰυ.
Differ. spec. Col. *foliis* subcordatis, crenatis, carnosis : *spicis* terminalibus, longissimis.
Hab. *Radix* perennis, repens. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, sub erectus, crassus, teres, ad apicem sub-4 gonus, pilosus, pallidus. *Folia* subcordata, subrotunda, obtusa, crenata, carnosâ, pilosa, albicantia, mollia, odorata, opposita, petiolis longis. *Flos* purpurascens, terminalis, spicis longis, verticillatis, interruptis.
Habitat in hortis Cochinchinæ, & in variis Indiæ locis, præsertim humidis.
Marrubium Amboinicum Album. Rumph. Amb. l. 8. c. 75. tab. 72.
Marrubium Odoratissimum Betonice folio. Burm. Zeyl. pag. 153, tab. 71. fig. 1. Marrubium Zeylanicum, Odoratum, Nepetæ facie, folio Lamii Panonici. Herm. Mus. Zeyl. pag. 30.
Obs. Hæcplanta, ejusque flores sat bene describuntur a Rumphio, loco citato : spica vero (non flores singuli) melius repræsentatur a Burmanno.
Virt. Resolvens, Tonica, Cephalicâ. Prodest in Asthmate, antiquâ Tussi, affectionibus Epilepticis, & Convulsivis. Odor totius plantæ vehemens, nec ingratus : sapor subardens. Usus etiam edulis.

GENUS XVIII. ORIGANUM.

Char. Gener. *Strobilus* tetragonus, spicatus, calyces Colligens. Lin. sy. pl. G. 784.

Sp. 1. ORIGANUM DICTAMNUS. β Quām tūm fām fūm.
Differ. spec. Orig. *Foliis* inferioribus tomentosis: *spicis* nutantibus.
Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, 1-pedalis, durus, rectus: ramis longis debilibus, brachiatis. *Folia* ovata, acuta, serrata, inferiora tomentosa, superiora glabra, punctata, opposita. *Flos*, albus, *spicis* brevibus, reclinatis, terminalibus; *bracteis* laxis, subrotundis, acuminatis, magnis. Planta grati odoris.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum. Notandum in provinciis Borealibus Sinarum nasci aliam plantam eodem nomine *Fām fūm* vocatam, radice carnosā albā, sub-fusiformi, magni usus in Medicinā, sed prorsus alienam ab Origano.

Dictamnus Creticus. Bauh. Pin. pag. 222. n. 1. Hill. Brit. herb. pag. 381. tab. 54. f. 12.

Virt: totius plantæ. Calefaciens, Deobstruens, Emmenagoga.

Sp. 2. ORIGANUM CRETICUM. β Quām tūm Kīm kiāi.
Differ. spec. Orig. *Spicis* aggregatis, longis, prismaticis, rectis: *bracteis* membranaceis, calyce duplo longioribus. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Caulis* 1-pedalis, perennis, erectus, crallus, 4-gonus; tomentosus, rubescens. *Folia* ovata, subacuta, crenata, rugola, tomentosa, opposita, petiolata. *Flos* albo-violaceus, *spicis* prismaticis, congestis, terminalibus: *bracteis* flore longioribus. *Calyx* 2-labiatus, pilosus: labio altero ovato, integerrimo: altero 2-fido. *Corolla* ringens, calyce longior: labio superiore 2-fido, connivente: inferiore 3-fido, reflexo. *Bractee* rubescentes, sicut caulis. *Radix* Crassa in multis caudices ascendentes superius divisā. Planta odorata.

Habitat incultum prope Cantonem sinarum.

Virtus. Calefaciens, Tonica, Emmenagoga.

Bauh. Pin. pag. 223. n. 5. Berg. Mat. Med. pag. 562.

Sp. 3. ORIGANUM HERACLEOTICUM. α Kīnh giāi tād. β. . . .

Differ. spec. Orig. *Spicis* longis, pedunculatis, aggregatis: *bracteis* longitudine calycum. Lin. sp. 16.

Hab; & notæ. *Caulis* simplex, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, sulcatus, ramosus, perennis. *Folia* ovata, acuta, serrata, basi integer-

374 D I D Y N A M I A. G Y M N O S P E R M I A.

rima, glabra, punctata, opposita. *Flos* albo-ruber, spicis linearibus, longis, congestis, plerumque ternis, terminalibus: *bracteis* lanceolatis, calyce brevioribus, aut sub æqualibus, 5-fidis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ.

Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii. Bauh. Pin. pag. 223. n. 4.

Sp. 4. ORIGANUM SYRIACUM. α Kinh giâi Nâm.

Differ. spec. Orig. *Spicis* longis, ternatis, pedunculatis: *foliis* ovatis, villosis. Lin. sp. 9.

Hab; & notæ. *Caulis*, erectus, 2-pedalis, 4-gonus, durus, ramis diffusis. *Folia* ovata, acuta, tota serrata, nervis villosis, minuta, opposita. *Flos* rubescens. *Spicis* congestis, sub-ternatis, longis, axillaribus, & terminalibus: fauce villis obstructâ, ut in Thymo. Habitat agreste in Cochinchinâ.

Virtus: spicarum tam hujus, quam præcedentis speciei. Pellens, sudorifica, Emmenagoga. Prodest in febre Catarrhali, & in Vertigine: Exterius mundat scabiem. Utriusque odor gratus.

Maiorana syriaca, vel Cretica. Bauh. Pin. pag. 224. n. 3.

Sp. 5. ORIGANUM MAIORANA. α β. . . .

Differ. spec. Orig. *Foliis* ovalibus, obtusis: *spicis* subrotundis, compactis, pubescentibus. Lin. sp. 11.

Hab; & notæ. *Caulis* perennis, multiplex, sub erectus, teres, tenuis. *Folia* ovalia; integerrima, minuta, pubescentia, cinerea, opposita, petiolata. *Flos* albicans, terminalis: *spicis* brevissimis: *bracteis* lato-lanceolatis. Planta odoris gratissimi.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, rara tamen, forsân aliunde ad-
vecta.

Burm. Ind. pag. 128. Maiorana hortensis odorata; perennis. Moris. hist. 3. pag. 359.

Virt. Tonica, Resolvens, Stomachica, Errhina.

G E N U S XIX. C L I N O P O D I U M.

Char - Gener. *Involucrum* multifetum, verticillo subjectum. Lin. sy. pl. G. 783.

† Sp. 1. CLINOPODIUM ASIATICUM. α Cay Cò.

Differ. spec. Clin. *Foliis* oblongis, nervosis, rugosis, subtus tomentosis: *spicâ* verticillatâ, terminali.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, duos cum dimidio pedes longus, erectus, 4-gonus, 4-fulcus, simplex, villosus. *Folia* ovato-oblon-

ADIDYNAMIA: GYMNOSPERMIA: 875

ga, obtusa, leviter serrata, rugosa, polynervia, subtus tomentosa, opposita. *Flos* violaceus, *spica* terminali, oblonga, composita verticillis interruptis: *involucris* acutis, hirsutis, subjectis. *Calyx* 2-labiatus, integerrimus, inaequalis, pilosissimus. *Corolla* labio superiore concavo, aequaliter 3-fido: inferiore refracto, integerrimo, longiore.

Habitat incultum in Cochinchina.

ANGIOSPERMIA.

GENUS XX. ACANTHUS.

Char. Gener. *Cal.* bifol; bifidus. *Cor.* 1-labiata, deflexa, 3-fida: *Caps.* 2-locularis. Lin. G. 857.

Sp. 1. ACANTHUS ILICIFOLIUS. & Cay. Ô rô. ꞑ Lào chú H6.

Differ. spec. Ac. *Foliis* repandis, dentato-spinosis: *caule* fruticoso; aculeato. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Prutex* 3-pedalis, caule, & ramis suberectis, crassis; teretibus, inermibus: *cortice* albido, viscoso. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, magna, dura, sparsa, glabra, sinnato-plicata, angulis omnibus spinosis. *Flos* albus, racemo simplici, erecto, terminali, longo. *Calyx* tubulosus, teres, aequalis: limbo erecto, 4-partito, laciniis acutis, binis exterioribus maioribus. *Corolla* 1-petala, tubo antrorsum truncato: retrosum extensa in laciniam ovatam; erectam, leviter 3-fidam. *Filamenta* 4, Didynamica, plana, mutuo inflexa, longitudine inter calycem, & corollam. *Antheræ* oblongæ, ciliatæ, stantes. *Germen* ovatum, superum. *Stylus* aequalis staminibus. *Stigma* simplex. *Capsula* ovata; 2-valvis, 2-locularis, 2-sperma: seminibus oblongis, hinc planis, inde convexis.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchina, & China.

Obsev. Præcedens descriptio pertinet ad plantam Cochinchinensem.

Cantone Sinarum idem habitus: at floris calyx ad basin vestitur foliolis duobus concavis, parvis, calyci adpressis: corollæ vero pars truncata terminatur emarginaturâ, hinc, inde rotundatâ, brevi.

Aquifolium Indicum: Rumph. Amb. l. II. c. 48. t. 71. f. 1. Myracanthus Indicus. Bont. Jav. l. 6. c. 55.

Virtus: radicis. Calefaciens, Attenuans, Diuretica. Bontius asserit multum prodesse in Paralyti, Asthmate, Colicâ, & expectoratione falsa petuitæ: quas virtutes extollere non audeo experientiâ destitutus.

GENUS XXI. GMELINA.

Char. Gen. *Cal.* sub-4-dentatus. *Cor.* 4-fida, Campanulata. *Antheræ* bipartitæ; 2 simplices. *Drupa* nucleo 2-loculari. Lin. sy. pl. G. 821.

Sp. 1. GMELINA ASIATICA? ex Cay Gang tu hú. Lin. sp. 1.

Differ. spec. *Gmel.* *Caule* arboreo: *aculeis*, & *foliis* oppositis: *racemo* simplici, terminali.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, 15 pedes alta: *ramis* expansis: *aculeis* oppositis, longis, rectis. *Folia* ovata, integerrima, glabra, opposita, petiolata, parva. *Flos* luteus, racemo simplici, terminali, amentiformi: *squamis* magnis, ovatis, concavis, integerrimis, rubris, flores singulos protegentibus. *Perianthium* proprium ovatum, carnosum, 2-fidum, laciniis obtusis. *Corolla* ringens, tubo tenui, longiusculo: limbo inflato-rotundo, lateraliter ringente: *labio* superiore fornicato, integro: inferiore 3-fido. *Stamina* 4, Didynamica, corollâ breviora. *Drupa* mediocris, subovalis, carnosa, lutea, glabra, non edulis: *nuce* ossâ, oblongâ, inæquali, biloculari.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Radix Deiparæ spuria, Lowara. Rumph. Amb. l. 2. c. 48. pag. 127. tab. 40.

Observ. Quamvis in figurâ Rumphianâ folia sint 3-loba, in nostrâ vero integerrima, non judicavi diversam speciem decernere, cum pleraque alia convenient, imprimis corollæ forma personata. Pro hoc genere, & specie a Celeb. Lin. citatur *Jambosa* sylvestris parvifolia, (Rumph. 1. pag. 129. tab. 40.), quæ procul-dubio *Eugeniæ* species est, nullatenus *Gmelinæ*.

Virtus. Calefaciens, Resolvens. Valent in doloribus articulorum, & affectibus nervorum radix internè sumpta, folia externè applicata.

GENUS XXII. LANTANA.

Char. Gen. *Cal.* obsolete 4-dentatus. *Stigma* uncinato-refractum. *Drupa* nucleo 2-loculari. Lin. sy. pl. G. 824.

Sp. 1. LANTANA RACEMOSA. ex Cay Tlai.

Differ. spec. *Lant.* *foliis* oppositis, sub-rotundis: *caule* arboreo inermi: *racemis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, *ramis* patentibus inermibus. *Folia* sub-rotunda, acuminata, integerrima, plana, glabra, dura, obscurovi-

ridia, subtus albicantia, opposita, petiolis longis, basi glandulosis. *Flos* albus, magnus, racemis compositis, nudis, vastis, terminalibus. *Cal.* sub-truncatus, denticulis 4-5, minimis. *Corolla* campanulata, 5-fida, sub-æqualis. *Drupa* carnosa, turbinata, compressa, apice retusa: *nuce* 2-loculari. *Stamina* Didynamica. De stigmate (an uncinatum?) non amplius recorder.

Habitat in sylvis Cochinchinæ: ubi ejus lignum cæditur pro ædificiis;

GENUS XXIII. BARLERIA.

Char. Gener. *Cal.* 4-partitus. *Stamina* 2 longè minora. *Caps.* 4-angularis, 2-locularis? 2-valvis, elastica, absque unguibus. *Sem.* 2. *Lin. fy. pl. G.* 848.

† Sp. I. BARLERIA PROCUMBENS. β Κάμ γρά τσὺ.

Differ. Spec. *Barl. inermis*: *foliis* lanceolatis, crenatis, hispidis: *capitulis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, inermis, procumbens, multiplex, tortuosus, hispidus. *Folia* lato-lanceolata, crenata, pilosa, opposita. *Flos* luteus, *capitulis* terminalibus: *bracteis* acuminatis ciliatis. *Calycis* lacinie 4, subulatae, pilosae. *Stamina* 2 valde minora. *Caps.* oblonga, angulata, 2-locularis, 2-sperma: *seminibus* orbiculatis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† GENUS XXIV. CAMPSIS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium oblongum, 5-gonum, semiquinquefidum: laciniiis acuminatis, erectis, sub-æqualibus.

Cor. Infundibuliformis: tubo calyci æquali: limbo magno, patente; 5-fido, laciniiis rotundatis, planis, æqualibus.

Stam. Filamenta 4 (quorum 2 breviora) subulata, mutuo incurva; medio tubo infidentia. *Antheræ* 2-loculares: lobis divaricatis.

Pist. Germen oblongum. *Stylus* filiformis, longior staminibus. *Stigma* spatulatum, 2-fidum, hians.

Peric. Capsula longa, 4-gona, 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

Sem. Sub-rotunda, multa.

Nom. (Καμπύσι curvatio) ab staminibus mutuo incurvatis.

Char. Gener. *Cal.* 5-gonus, 5-fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida; *Sti-*

Stamina mutuo inflexa. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

Sp. 1. CAMPSIS ADREPENS. β Lién siéu.

Differ. spec. Camp. *foliis* 2-pinnatis: *corymbo* racemoso.

Hab. *Caulis* fruticosus, inermis, scandens, radiculis lateralibus arborum truncis adrepens. *Folia* 2-pinata, *foliolis* ovato-lanceolatis, serratis, glabris. *Flos* coccineus, magnus, racemis ordinatè compositis, terminalibus.

Habitat in sylvis prope Cantonem Sinarum.

GENUS XXV. DIGITALIS.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *Caps.* ovata, 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 816.

† Sp. 1. DIGITALIS COCHINCHINENSIS. α Cay Bô loung.

Differ. spec. Dig. *foliis* lanceolatis, asperis: *floribus* solitariis, axillaribus: *calycibus* acutis: *corollis* obtusis, apice emarginatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, sub-erectus. *Folia* lanceolata, integerrima, aspera, opposita. *Flos* albo-violaceus, sessilis, axillaris, solitarius: *calycibus* 5-fidis, acutis. *Corolla* campanulata, subtus ventricosa, 5-fida, laciniis obtusis, supremâ emarginatâ. *Capsula* ovata, acuta, 2-locularis.

Habitat in agris, & hortis Cochinchinæ inculta.

† Sp. 2. DIGITALIS SINENSIS. β Tsù hōa yong.

Differ. spec. Dig. *foliis* ovatis, utrinque pilosis: *floribus* solitariis axillaribus: *calycis* laciniis subulatis: *corollis* obrutis, apice integris.

Hab., & notæ. *Caulis* cespitosus, erectus, 1-pedalis, teres, glaber. *Folia* ovata, acuta, serrata, utrinque pilosa, opposita, petiolis brevibus. *Flos* fusco-purpureus, axillaris, solitarius. *Calycis* laciniæ 5, subulatæ erectæ, suprema maior, aliquando 2-fida. *Corolla* campanulata; ventricosa, 4-fida, laciniis obtusis, summâ maiore, integrâ. *Stamina* Didynamica. *Stigma* cochleariforme. *Capsula* ovato-conica, 2-fidula, 2-locularis, polysperma.

GENUS XXVI. BIGNONIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, subtus ventricosa, 5-fida. *Siliqua* bilocularis. *Sem.* membranaceo-alata. Lin. G. 817.

Sp. 1. BIGNONIA INDICA. *α* Cây Đói muong: Cây do do.

Differ. spec. Bign. *foliis* bipinnatis: *foliolis* integerrimis, ovatis, acuminatis. Lin. sp. 16.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis ascendentibus. *Folia* bipinnata; foliolis ovatis, acutis, integerrimis, glabris, oppositis. *Flos* magnus, ruber, racemis erectis, terminalibus. *Calyx* spatha lunata; crassa, colorata, lanosa. *Corolla* 1-petala, ringens: tubo magno, curvo, ventricoso: *labio* superiore truncato: *inferiore* longiore, 3-partito, laciniis ovatis, undulatis, sub-æqualibus. *Filamenta* 4; subulata, quorum 2 longiora, basi tubi corollæ infidentia. *Antheræ* binæ in quolibet filamento, oblongæ, biloculares, magnæ, pendulæ. *Germen* oblongum, sub-4-gonum. *Stylus* subulatus, longior staminibus. *Stigma* spathulatum. *Pericarpium* siliqua longissima, compressa, sub-curva, lanosa, 2-valvis, 4-locularis, polysperma: dissepimento rectangulo. *Semina* plurima compressa, biloba: lobis orbiculatis, invicem coalitis: alâ membranaceâ lateraliter protensâ: perstrata varia in quolibet loculo disposita, nec imbricata.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, imprimis prope flumina. Burm. Ind. pag. 131. Pajanelli. Rheed. Malab. 1. pag. 79. tab. 45.

Varietas occurrit in Africâ prope Mozambiccum, *caule* arboreo, parvo, *foliis* similiter bipinnatis, *pedunculis* polyfloris, terminalibus: *siliquâ* glabrâ, curvâ, 1-pedali, compressâ: *seminibus* oblongis, 2-lobis, per tres ordines dispositis in quolibet loculo.

† Sp. 2. BIGNONIA PENTANDRA. Cây Nguc ngnac.

Differ. spec. Bign. *foliis* bipinnatis: *staminibus* pentandris: *calyce* caroso, colorato, 5-dentato.

Differ. spec. *Arbor* mediocris, ramis ascendentibus. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, glabra, 2-pinnata cum impari. *Flos* magnus, ruber, racemis erectis, terminalibus. *Calyx* tubulosus, 5-gonus, obsolete 5-dentatus, carnosus, coloratus, persistens. *Corolla* monopetala, ringens, tubo crasso, æquali, brevi: *labio* superiore concavo, 2-fido: *inferiore* 3-fido: laciniis omnibus ovatis, crispis; sub-æqualibus. *Filamenta* 5 inæqualia, medio tubo infidentia: *Antheris* 10, oblongis, pendulis, æqualibus, binis in quolibet filamento. *Germen* oblongum, obtusè 4-gonum. *Stylus* subulatus, longior staminibus. *Stigma* spathulatum. *Siliqua* 2-pedalis, curva, utrinque attenuata, 2-locularis, 2-valvis, polysperma. *Semina* oblonga, compressa, 2-loba, alata utrinque membranâ tenui.

Habitat prope flumina in Cochinchinâ.

† Sp. 3. BIGNONIA LONGISSIMA. α Cay Quao.

Differ. spec. Bign. *foliis* alternis : *floribus* solitariis, longissimis : *Calyce* nullo.

Hab., & notæ. *Arbor* parva, 9 pedes alta, *ramis* patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, alterna. *Flos* albus, magnus, solitarius, terminalis. *Cal.* nullus. *Corolla* infundibuliformis, tubo tenui, longissimo : limbo amplo, 5-fido, laciniis ovatis, crispis, sub-æqualibus, incisurâ supremâ breviorē. *Filamenta* 4, quorum 2 breviora, ori tubi inserta. *Antheræ* oblongæ, 2-loculares, binæ in quolibet filamentō, ipsi normales, horizontaliter porrectæ. *Stylus* filiformis, corollæ sub-æqualis. *Stigma* spatulatum. *Siliqua* longa, compressa, curvato-unciformis, 2-valvis : dissepimento longitudinali, cruciformi in 4 loculos divisa. *Semina* plurima compressa, oblonga, 2-loba, in diversâ strata ordinata.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ.

Observ. Lignum Equinum (Rumph. Amb. l. 4. c. 40. t. 46) Linnæo Juniori dictum Bignonia Spathacea (sup. pl. p. 283) satis cum nostrâ convenit longitudine, & formâ corollæ : non autem calyce spathaceo, & foliis pinnatis. Omnes tres species Asiaticæ, quas modo descripsimus (si siliquam cum seminibus excipias) aptari nequeunt Characteri Generico Bignoniæ a Linnæo explantis Americanis conflato : imo etiam siliqua non semper 2-locularis invenitur in Asiaticis.

GENUS XXVII. RUELLIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* sub-ccampanulata. Stamina per paria approximata. *Caps.* dentibus elasticis diffiliens. Lin. fy. pl. G. 847.

Sp. 1. RUELLIA ANTIPODA. α Rau Chon vit.

Differ. spec. Ru. *Foliis* mucronato-ferratis : *caule* repente : *floribus*, sub-spicatis, terminalibus, quinis, ternis ve. Lin. sp. 12.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 5-pollicaris, teres, repens, ramis diffusis. *Folia* ovato-lanceolata, ferrata, opposita, glabra, sessilia. *Flos* albo-violaceus, terminalis, pedunculis polyfloris. *Calyx* 5-fidus, acutus, erectus, permanens. *Corolla* ringens, 5-fida. *Stamina* per paria curvaturâ approximata. *Capsula* fubulata, teres, longa, 2-localaris, polysperma, elasticè diffiliens.

Habitat spontanea in pratis, & hortis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 134. Crusta ollæ maior. Rumph. Amb. l. 9. c. 72. tab. 170. fig. 2. Notandum Rumphium ibi plantam descripsisse pedun-

dunculus polyfloris, subterminalibus, nostris magis conformem: sed in figurâ eam delineasse flore solitario, axillari, quod potius ad Ruelliam Ciliarem referendum est.

Sp. 2. RUELLIA CILIARIS. a Rau thom dat.

Differ. spec. Ru. *foliis* dentatis, ciliatis: *floribus* oppositis. Lin. sp 7.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 8-pollicaris, angulatus, sulcatus, ramosus, diffusus, repens. *Folia* ovata, dentata, opposita, subpetiolata. *Flos* albo-violaceus, solitarius, oppositus, axillaris, pedunculis longis. *Calyx* oblongus, angulatus, ciliatus, 5-partitus, persistens. *Corolla* ringens, labio superiore brevior, 2-fido: inferiorum 3-fido. *Stamina* Didynamica, approximata: rudimentum duorum filamentorum sterilium inter stamina longiora assurgentium. *Capsula* ovata, 2-locularis, polysperma, apice elastice distiliens.

Ruellia Persica? Burm. Ind. pag. 135. tab. 42. fig. 1. Est ea figura (quamvis a Linnæo Citata) nullatenus cum Linnæanâ descriptione, aut cum nostrâ convenit.
 Habitat in agris Cochinchinæ spontanea.

† GENUS XXVIII. DICEROS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-partitum: laciniis subulatis, villosis, erectis, subæqualibus.

Cor. Campanulata, 4-fida: tubo intus piloso: laciniis limbi cordatis, unâ maiore.

Stam. Filamenta 4 (quorum 2 longiora) subulata, pilosa, tubo inhaerentia. Antheræ profundè 2-fidæ, divaricatæ, 2-cornes.

Pist. Germen subulatum, breve, 4-sulcum. Stylus tubo æqualis. Stigma Cochleariforme, inflexum.

Peric. Capsula, sub-ovata, 2-locularis, 2-valvis.

Sem. Plurima, rotunda, minima.

Nom. (Δίκερος bicornis) ob antheras bicornes.

Char. Gener. Cal. 5-partitus. Cor. Campanulata, 4-fida, laciniis obcordatis, unâ maiore. Antheræ divaricatæ. Caps. 2-locularis.

† Sp. 1. DICEROS COCHINCHINENSIS. a Rau (ngu)

Differ. spec. Dic. *foliis* stellatis, carnosis: *floribus* solitariis, axillari-

Hab. *Radix* perennis, repens. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, subere-

ctus, teres, villosus. *Folia* stellata, terna, ovato-lanceolata, serrata,

382 DIDYNAMIA. ANGIOSPERMIA.

ta, carnosa, glabra. *Flos* albo-violaceus, solitarius, axillaris, pedunculis villosis.

Habitat loca humida in Cochinchina.

Usus. Esculentus in acetariis.

GENUS XXIX. SESAMUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata 5-fida: lobo infimo maiore. *Rudimentum* filamenti quinti. *Stigma* lanceolatum. *Caps.* 4-locularis. Lin. fy. pl. G. 845.

Sp. 1. SESAMUM ORIENTALE. d. Cay Me. 2 Ma. Chi.

Differ. spec. *Ses. foliis* ovato-oblongis, integris. Lin. sp. 1.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, erectus, 3-pedalis, 4-gonus, 4-fulcatus. *Folia* ovato-oblonga, integra, dentata, pilosa, venosa, petiolata, opposita. *Flos* albus, axillaris, solitarius, peduncularis. *Calyx* 5-partitus, erectus. *Corolla* campanulata, inæqualiter 5-fida. *Capsula* oblonga, 4-gona, 4-fulca, 4-locularis, polysperma: *seminibus* plurimis, compressis, acutiusculis, luteis, nitidis. *Stamina* Didynamica, sine aliquo rudimento filamenti quinti. *Stigma* 2-fidum reflexum. Ad basim cujuslibet pedunculi floris prodeunt ex utraque axilla singulæ bractæ lineares, breves, cum singulis glandulis luteis, 5-fidis, quæ flosculi cujusdam minimi speciem ferant.

Habitat affatim cultum in Cochinchina, & China.

Thunb. Japon. pag. 254. Digitalis Orientalis sesamum dicta. Burm. Zeyl. pag. 87. tab. 38. fig. 1

Virtus: præcipue seminum, & olei expressi. Resolvens, Emolliens. Prodest in convulsionibus, si folia Absynthii cum illo contendantur, & calide fricentur artus convulsi. Usus esculentus in condendis cibis.

GENUS XXX. CHELONE.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter superiora stamina. *Caps.* 2-locularis. Lin. fy. pl. G. 806.

Sp. 1. CHELONE OBLIQUA.

Differ. spec. *Chel. foliis* lanceolatis, petiolatis, serratis, oppositis. Lin. sp. 2.

Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, erectus: ramis patentibus. *Folia* lanceolata, serrata, glabra, rugosa, petiolata, opposita. *Flos* rubro-purpureus, subterminalis, 2-3-natus. *Cal.* 5-partitus.

Corolla personata, inflata, sub-clausa, 5-fida, laciniis, subæqualibus, emarginatis. *Filamenta* 4, Didynamica. *Rudimentum* quinti non erat. *Capsula* 2-locularis, 2-sperma.

Habitat Agrestis in Cochinchinâ.

Mill. ic. 62. tab. 93.

GENUS XXXI. ANTIRRHINUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* basis deorsum prominens, nectarifera. *Caps.* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 808.

Sp. 1. ANTIRRHINUM SPURIUM.

Differ. spec. Ant. *foliis* ovatis, alternis: *caulibus* procumbentibus. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, procumbens, pilosus: *ramis* multis, diffusis. *Folia* ovata, cordata, tomentosa, infima opposita, superiora alterna. *Flos* luteus, solitarius, pedunculis axillaribus. *Corolla* nectario calcarato, incurvo: *labio* superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *fauce* clausa.

Habitat inculcum Cantone sinarum.

Antirrhinum caule procumbente, foliis villosis, ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis. Hall. Helv. n. 341.

Sp. ANTIRRHINUM LINARIA. & Søy kúc hoã.

Differ. spec. Ant. *foliis* lanceolato-linearibus, confertis: *caule* erecto: *spicis* terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. Lin. sp. 31.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, duriusculus, erectus, sesquipedalis, simplex, teres: *ramis* erectis, paucis. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, sparsa, confertaque. *Flos* imbricatus, spicis longis, terminalibus, colore dilutè luteo, croceoque variatus. *Calyx* 5-phyllus, acutus: *foliolis* binis inferioribus divaricatis, *corolla* calcar subulatum prementibus. *Corolla* labio superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *fauce* turgida, clausa. *Stamina* 4, sub-petaliformia, exotica, tortuosa, quorum 2 breviora. *Capsula* subrotunda, apice 2-loba, bilocularis, polysperma, sæpius abortiens.

Habitat Cantone Sinarum, cultum ob speciem floris.

Antirrhinum foliis linearibus, sparsis. Hort. Cliff. pag. 325. Antirrhinum foliis linearibus, adscendentibus, congestis: caule erecto, spicato. Hall. Helv. n. 336.

Sp. 3. ANTIRRHINUM MOLLE. Rau Chiêo loang.

Differ. spec. Ant. *corollis* ecaudatis: *foliis* oppositis ovatis, tomentosis: *caulibus* procumbentibus. Lin. sp. 40.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, procumbens, 2-pedalis, 4-fidus, pilosus, ramulosus. *Folia* ovata, integerrima, parva, utrinque villosissima, opposita. *Flos* purpureus, sub-terminalis, verticillatus: *labio* corollæ superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *ristu* clauso: *caudâ* nullâ. *Capsula* oblonga, 2-locularis, *seminibus* lenticulatis.

Habitat spontaneum in pratis Cochinchinæ.

Antirrhinum Hispanicum villosum, origani foliis glutinoso. Tourn. Inst. pag. 168.

† Sp. 4. ANTIRRHINUM PORCINUM. α Rau. Chîeo heo.

Differ. spec. Ant. *floribus* ecandatis, verticillatis: *foliis* lanceolatis, oppositis, glabris: *caulibus* erectis.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, annuus, sub-multiplex, diffusus. *Folia* lanceolata, sub-serrata, glabra, viscosa, sessilia, opposita. *Flos* albo-purpureus, axillaris, verticillatus, multus: *calycæ* 5-partito, longiusculo, laciniis subulatis, erectis, pilosis. *Corolla* 5-fida, parum gibba, ecaudata, *ristu* patente, calyce brevior. *Capsula*, 2-locularis, polysperma, apice dehiscenti.

Habitat loca humida Cochinchinæ: ubi colligitur pro nutrimento suum, ex quo vernaculum nomen Porcinum.

† Sp. 5. ANTIRRHINUM AQUATICUM. α Rau. Chîeo nîoc.

Differ. spec. Ant. *foliis* verticillatis: *floribus* solitariis: *corollis* rotundè inflatis.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, glaber. *Folia* lanceolato-linearia, verticillata, sub-quaterna, integerrima, glabra, sessilia. *Flos* purpureus, axillaris, solitarius. *Calycæ* 5-partitus. *Corolla* palato aperto, rotundè inflata, personata, labio superiore 2-fido, inferiore 3-fido. *Capsula* oblonga, 2-locularis, polysperma.

Habitat in paludibus Cochinchinæ.

G E N U S . XXXII. C O L U M N E A .

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* labium superius fornicatum, integrum: supra basim gibba. *Anthera* connexa. *Capsula* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 856.

† Sp. 1. COLUMNEA STELLATA. α Hoa Kách.

Differ. spec. Col. *foliis* stellatis: *floribus* solitariis: *caule* repente.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, repens, teres, gracilis, albicans: *ramis* sub-erectis, 4-pollicaribus, tenerrimis. *Folia* ovata, 3 lineas longa, serrata, stellata terna, pallidè virentia, odo-

rifera, petiolata. *Flos* albus, rubro virgatus, hirsutus, solitarius, axillaris, pedunculatus. *Cal.* 5-partitus, laciniis subulatis, erectis, æqualibus. *Corolla* ringens, tubo longiusculo, vix gibbo: labio superiore fornicato, 3-fido: inferiore 2-fido. *Stamina* Didynamica, per paria invicem incurvata: antheris ovatis, connexis, difficulter separabilibus. *Capsula* subulata, 2-locularis, polysperma. Omnia, præter capsulam, pilosa. *Planta* aquatica, quæ, deficiente humore, statim perit: odore, & aspectu amænissima: mundo muliebri conveniens, & usitata.

Habitat in multis locis Cochinchinæ: colitur in vasis fictilibus, & ligneis aquâ plenis, substrato luto.

Virtus. Emolliens, Refrigerans, Humectans.

GENUS XXXIII. MAZUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, magnum, 5-gonum, 5-fidum: laciniis lanceolatis, patentibus, sub-æqualibus, persistentibus.

Cor. Ringens, labio superiore acuminato, sub-fornicato, leviter 2-fido: inferiore longiore, 3-fido, laciniis rotundatis, inflexis: faux exterius bifurcata, interius consista papillis pedunculatis.

Stam. Filamenta 4 (quorum duo longiora) per paria invicem inflexa. *Antheræ* oblongæ, connexæ.

Pist. Germen sub-rotundum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus longioribus. *Stigma* spathulatum, 2-fidum, hians.

Peric. Capsula sub-rotunda, compressa, 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

Sem. Multa, ovata, minuscule.

Nom. (Μαζός papilla) a papillis pedunculatis, quæ faucem obstruunt.

Char. Gener. Cal. campanulatus. *Cor.* ringens, fauce papillis obstructa. *Antheræ* connexæ. *Capsl.* 2-locularis.

† Sp. 1. MAZUS RUGOSUS. α Rau dâng lóng lá.

Differ. spec. Maz. *foliis* ovatis rugosis: *spica* laxa, terminali.

Hab. Caulis herbaceus, annuus, sub-erectus, semipedalis, ramosus.

Folia ovata, serrata, rugosa, opposita. *Flos* albo-violaceus, spicâ longâ, laxâ, pedunculis longiusculis.

Habitat in agris Cochinchinæ.

GENUS XXXIV. MANVLEA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* limbo 5-partito subulato : laciniis superioribus 4 magis connexis. *Capsf.* 2-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 830.

† Sp. 1. MANVLEA INDIANA. α Non tran Nam.

Differ. Ipec. Man. *foliis* ovatis, integerrimis, oppositis : *flor*e capitato.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, durus, villosus, simplex, ramis ascendentibus. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, ciliata, incana, opposita, sessilia. *Flos* cæruleus, capitulis sub-rotundis, bracteis setosis, flosculis intermixtis. *Calyx* 5-partitus, acutus, villis hispidus, sub-æqualis. *Corollæ* limbus 5-partitus, laciniis acutis, 4 superioribus magis connexis. *Stamina* Didynamica, *antheris* connexis. *Capsula* acuminata, 2-locularis, 2-valvis, polysperma. Planta odorata saturiciæ odore.

Habitat prope maris litora arenosa in Cochinchinâ.

GENUS XXXV. MARTYNIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus *Cor.* ringens. *Capsf.* lignosa, corticata, rostro hamato, 5-locularis, 2-valvis. Lin. sy. pl. G. 811.

† Sp. 1. MARTYNIA ZANGUEBARIA. γ Biri viri.

Differ. spec. Mart. *foliis* pinnati-fidis : *flor*e axillari solitario : *caule* procumbente.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, teres, procumbens, ramosus, 8-pedalis. *Folia* oblonga, pinnato-incisa, pilosa, opposita, petiolata. *Flos* dilute purpureus, axillaris, solitarius. *Calyx* 5-phyllus, foliolis lanceolaris, pilosis, expansis, sub-æqualibus, deciduiis. *Corolla* ringens, tubo magno, sub-rotundo-gibboso : *limbo* brevi, labio superiore 3-fido, obtuso, lacinia mediâ emarginatâ : *labio* inferiore ovato, integro, longiore. *Filamenta* 4, Didynamica, subulata, incurva, omnia limbo breviora, basi corollæ insidentia. *Antheræ* oblongæ, 2-loculares, incumbentes. *Germen* superum, sub-rotundum, pilis densis ex corollæ basi assurgentibus occultum. *Stylus* filiformis, longior staminibus. *Stigma* lanceolatum, 2-fidum, erectum. *Pericarpium* capsula lignosa, sub-ovata, compressâ, utrinque bifidulcata, 2-rostris, 4-locularis, 1-sperma, 2-valvis : rostris recurvis : cortice coriaceo, tenui.

Habitat in litoribus Zanguebar Africae Orientalis.

Obſerv. Convenit cum Martyniâ Annuâ (Reliq. Houſt. pag. 5. tab. 10.) loculis 4, monoſpermis, & formâ drupæ; cur enim capsulam potius dicemus, quam drupam? Labia etiam corollæ convenire poſſunt, ſi duas lacinias laterales labio ſuperiori adjudicemus, non inferiori: ut Houſtonus fecit: fiſſura autem ſuprema in plantâ Africanâ brevior eſt, & pro emarginaturâ cenſeri debet: tubus brevior, ſub-globoſus.

GENUS XXXVI. CORNUTIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus. *Stamina* Corollâ longiora. *Stylus* longiſſimus. *Bacca* 1-ſperma. Lin. ſy. pl. G. 825.

+ Sp. CORNUTIA QUINATA. A ū sī kām.

Differ. ſpec. Corn. *foliis* 5-natis, lanceolato-ovatis: *ſlore* racemoso. *Hab.*, & notæ. *Arbor* mediocris: *ramis* patentibus, teretibus. *Folia* 5-nata, lanceolato-ovata, acuminata, integerrima glabrâ: *petiolo* communi longo. *Flos* luteo-viridis, racemis terminalibus. *Calyx* leviter 5-dentatus. *Corolla* ſub-infundibuliformis, ringens: *labio* ſuperiore 3-fido: inferiore 2-fido, breviora. *Stamina* Didynamica, corollâ longiora. *Stylus* longior corollâ, & ſtaminibus, non tamen longiſſimus. *Stigma* 2-fidum, reflexum. *Bacca* ſubrotunda, gibboſa, Carnoſa, 1-ſperma.

Habitat in ſylvis prope Cantonem ſinarum.

GENUS XXXVII. CLERODENDRUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Cor.* tubo ſiliiformi: limbo 5-partito, æquali. *Stamina* longiſſima intra lacinias maximè hiantes. *Bacca* 1-ſperma. Lin. ſy pl. G. 852.

Sp. 1. CLERODENDRUM INFORTUNATUM. A Fung mī chū.

Differ. ſpec. Cler. *foliis* cordatis tomentosis. Lin. ſp. 1. *Hab.*, & notæ. *Caulis* fruticoſus, erectus, 7-pedalis: *ramis* 4-gonis, 4-fulcatis. *Folia* magna, cordata, lato-ovata, acuminata, ſub-crenata; piloſa, rugoſa, oppoſita, petiolis longis. *Flos* terminalis Corymbo racemoso, vaſto. *Calyx*, *corolla*, *ſtamina*, *ſtylus*, *pedunculi* omnia coloris coccinei rutili. *Calyx* 5-fidus, campanulatus. *Corolla* tubo longo, tenui: limbo 5-fido, ſubæquali, rotundato: *ſtamina* longiſſima, per fiſſuram ſupremam Corollæ aſcendentia: *antheris* nutantibus, baſi emarginatis. *Stylus* longus: *stigmatē* acuto, bifido. *Bacca* 1-ſperma.

Habitat Cantone. Sinarum.

Burm.

GENUS XXXVIII. VOLKAMERIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, *Cor.* laciniis secundis. *Bacca* 2 sperma.
Sem. 2-locularia. Lin. sy. pl. G. 851.

Sp. 1. VOLKAMERIA INERMIS. β Sào fù mìn. Lin. sp. 2.

Differ. spec. Volk. *ramis* inermibus: *foliis* lanceolatis integerrimis: *floribus* sub-ternis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 5-pedalis, teres, inermis, ramosissimus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, nitida, opposita, petiolata. *Flos* albus, axillaris, pedunculis sub-trifloris. *Calyx* albus, acutè 5-fidus, persistens. *Corolla* tubus tenuis, longissimus, limbus 5-fidus, laciniis ad latera divaricatis. *Stamina* 4, purpurea, corollâ multo longiora. *Bacca* supera, 4-sulca, *seminibus* duobus, bilocularibus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Jasminum Litoreum. Rumph. Amb. l. 7, cap. 47. tab. 46.

† Sp. 2. VOLKAMERIA PUMILA. α Sào táng lùng.

Differ. sp. Volk. *foliis* lanceolatis, sub-integerrimis, tomentosis: *pedunculis* sub-sexfloris, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 1-pedalis, erectus, teres, inermis, simplex, ramosus. *Folia* lanceolata, sub-integerrima, tomentosa, magna, opposita, petiolata. *Flos* ruber, pedunculis 5-6-floris, axillaribus. *Calyx* magnus, inflatus, acutè 5-fidus, persistens. *Corolla* 5-fida, longa, sub-æqualis. *Stamina* Didynamica, corollâ longiora. *Bacca* sub-rotunda, 4-sulca, exsucca, 2-locularis, 1-sperma, seminibus 2-locularibus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 3. VOLKAMERIA PETASITES. α Cây Bông roi.

Differ. spec. Volk. *foliis* ovatis, acuminatis, rugosis: *racemis* laxis, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus: *ramis* diffusis, brachiatis, ramulis sub-tetragonis, rubentibus. *Folia* ovata, acuminata, sub-ferrata, rugosa, glabra: *petiolis* longis, oppositis. *Flos* terminalis, racemis laxis, sub-divisis: *calyce*, & *pedunculis* fuscorubris. *Calyx* 5-gonus, inflatus, magnus, 5-partitus, laciniis acutis, persistens. *Corolla* viridi-lutea, monopetala: tubo longo, tenui: limbo 5-fido, laciniis ovatis, concavis, sub-æqualibus. *Stamina* 4, Didynamica, tenuia, brevía, fauci corollæ inhaerentia.

antheris ovatis, magnis, nutantibus. *Germen* sub-rotundum, superum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus. *Stigma* acutum, bifidum. *Bacca* sub-rotunda, 4-sulca, 2-locularis, 1-sperma: *Semine* bilobo, biloculari, duriusculo.

Habitat in dæmetis Cochinchinæ.

Parasites Agrestis. Rumph. Amb. 1. 6. cap. 54. tab. 49.

Observ. Hanc plantam Linnæus adjunxit Clerodendro Infortunato, procul-dubio fructu non viso. Ego sæpe observavi in vivis fruticibus baccam nullatenus 1-spermam, ut in Clerodendro, sed quasi 4-fidam, bilocularem scilicet, seminibus 1-spermis, bilobis, quæ speciem quatuor seminum repræsentat, prout bene descripsit, & pinxit sagacissimus Rumphius. Quod vero folia ab ipso exponantur cordata, diversitati soli tribuendum judico, cum in aliis etiam plantis non rarò accidat similis variatio.

† Sp. 4. VOLKAMERIA ANGULATA. Nu trich thao: Cây báy.

Differ. spec. Volk. *foliis* cordatis, angulatis: *corymbo* racemoso, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, simplex, erectus, 5-pedalis, inermis, teres: *ramis* reclinatis, sub-tetragonis. *Folia* magna, cordata, 5-angulata, denticulata, glabra, opposita, petiolis longis. *Flos* terminalis, in aliquibus albus, in plurimis coccineus: *racemo* corymbose, vasto, vel, si velis, paniculâ pedunculis ordinatis. *Calyx* 5-fidus, laciniis acutis, patentibus, persistens. *Corolla* 1-petala, tubo longo, tenui: limbo 5-fido, sub-æquali, laciniis brevibus, rotundatis, supremis divaricatis, amplectentibus *Stamina* longa, ascendentia. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigma* acutum, 2-fidum. *Bacca* exsucca, sub-4-gona, apice 4-fida, 2-locularis, 1-sperma: *seminibus* 2-lobis, 2-ocularibus, duritie drupaceâ.

Habitat ubique in collibus, & hortis minus cultis in Cochinchinâ.

Observ. Suspicio hanc esse, quæ a Linnæo dicitur Clerodendrum Paniculatum, quæque, observato fructu, Clerodendrum dici nequit: nec etiam Volkameria Multiflora Burmanni, (Ind. pag. 137. tab. 45. fig. 1.) quæ licet vera Volkameria sit, non est Paniculata, sed Triflora, axillaris. Non satis capio, quid Linnæus velit intelligi per notam corollæ laciniis secundis. Si per has indicantur laciniæ laciniatæ, nullas tales invenimus in nostris speciebus Volkameriæ, nec etiam vidimus in figuris Auctorum, quos habemus.

GENUS XXXIX. VITEX.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 6-fidus. *Bacca* 4-sperma.
Lin. sy. pl. G. 853.

Ddd

Sp. 1.

Sp. 1. VITEX TRIFOLIA. α Thuộc ôn: Quan âm biền: Mạn Kinh.

Differ. spec. Vit. *foliis* ternatis, quinatisque integerrimis: *paniculis* dichotomis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, ramosus, teres, 8-pedalis, digitum crassus, procumbens, aliquando repens. *Folia* ternata, rarius quinata: foliolis ovatis, integerrimis, undulatis, superius obscurevirentibus, subtus cinereo-incanis, mollibus: *petiolis* communibus longis, oppositis. *Flos* violaceus, terminalis: *racemis* dichotomis. *Calyx* 5-dentatus. *Corolla* ringens: labio superiore 3-fido, inferiore 2-fido, laciniis obtusis. *Bacca* parva, globosa, dura, glabra, nigra, (Piperis similis) 4-sperma.

Habitat frequentissima ad maris litora, per arenam repens in Cochinchinâ, sicut etiam in Chinâ.

Lagodium Vulgare. Rumph. Amb. l. 6. c. 21. tab. 18. Vitis Trifolia, Indica, Minor. Pluken. Almag. 390. tab. 206. fig. 5. Negundo Fœminâ. A Costa. Arom. c. 38. apud Clus. Exot. pag. 280.

Virtus: præcipuè fructus. Calefaciens, Discutiens, Nervina, Cephalica, Emmenagoga. Prodest in Paralyfi, artuum debilitate, & doloribus. Quod facilliter probarunt Gracias, Acofta, Rumphius, & Bontius etiam in semet-ipsò, præter Medicos Indianos, apud quos in magno est usu tam interno, quam externo. Sapor plantæ amaricans. Odor gravis, intensus, sub-aromaticus.

Sp. 2. VITEX NEGUNDO. α Thuộc ôn rừng. β Mên Kìm.

Differ. spec. Vit. *foliis* quinatis, ternatisque, serratis: *floribus* racemoso-paniculatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, tortuosus, brachium crassus, *ramis* expansis. *Folia* lanceolata, quinata, ternataque, plerumque integerrima, aliquando serrata, plana, venosa, fusco-cinerea, petiolis oppositis. *Flos* purpurascens, racemis laxis, terminalibus, erectis. *Calyx*, *corolla*, & *fructus* a præcedenti specie non differunt. Similis etiam sapor, & odor: virtus eadem, sed minus efficax.

Habitat in locis mediterraneis sylvestribus Cochinchinæ, & Chinæ.

Lagodium Litoreum. Rumph. Amb. l. 6. cap. 22. tab. 19. Bemnoffi. Rheed. Malab. 2. pag. 15. tab. 11. Negundo arbor mas. Bauh. h. 1. pag. 189.

† Sp. 3. VITEX SPICATA. α Cây Ngủ tráo. β Ủ chũ Kìm.

Differ. spec. Vit. *foliis* quinatis, crenatis: *spicis* linearibus, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 8-pedalis, crassus: *radices* sæpe cespitosa. *Folia* 5-nata, rarò 3-nata, lanceolata, crenata, aliqua

aliqua integerrima, latè virentia, tomentosa, rugosa, graveolentia; opposita, petiolis longis. Flos albo-violaceus, spicis longis, linearibus, sæpe congestis, terminalibus: involucellis partialibus subulatis, polyfloris. Calyx minimus, 5-fidus, acutus, persistens. Corolla 1-petala, tubo brevi, globoso: limbo patente, 5-fido, laciniis obtulis, 4 superioribus, sub-æqualibus, infimâ maiore. Filamenta 4, Didynamica, laciniâ inferiori corollæ breviora, superioribus longiora, tubo prope basim insidentia. Stigma 2-fidum, reflexum. Bacca sub-rotunda, fusca, Pipere minor, 4-sperma.

Habitat inculca, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus. Calefaciens, Resolvens, Nervina, Anodyna. Prodest in Paralyfi, Hemiplegia, Tremore, & contractione membrorum, eorum debilitate, doloribus yagis. Usus frequentior foliorum, externus.

Observ. Vitex Pinnata Linnæi (sy. pl. sp. 4) ex Bumanno (Ind. pag. 138. tab. 43. fig. 2.) Malaicè dicta Tsjulang, & vocata Camunium sinense a Rumphio (Amb. l. 7. c. 15. pag. 28. tab. 18. fig. 1. ex Auctuario) nullatenus ad hoc Genus, aut Classem pertinet: sed ad Pentandriam Digyniam, ubi videri potest, a nobis indicata nomine Aglaia Odorata.

† GENUS XL. TRIPINNA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium Cyathiforme, 5-crenatum, persistens.

Cor. Monopetala, sub-campanulata, patens: tubo calycem superante: limbo 5-fido: laciniis ovatis, undulatis, villosis, summâ maiore.

Stam. Filamenta 4 (quorum duo longiora) corollæ sub-æqualia. Antheræ bicornes, incumbentes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus æqualis staminibus. Stigma acutum, bifidum.

Peric. Bacca ovata, carnosa, 1 locularis, polysperma.

Sam. Oblonga, compressa, pauca.

Nom. Tripinnam vocavi a foliis tripinnatis.

Char. Gener. Cal. Cyathiformis, 5-crenatus. Cor. sub-campanulata, 5-fida: summâ maiore. Bacca 1-locularis, polysperma.

† Sp. 1. TRIPINNA TRIPINNATA. ex Cay Den.

Differ. Spec. Trip. foliis 3-pinnatis: foliolis ovatis, acuminatis: racemis terminalibus.

Hab. Arbor magna, ramis patentibus. Folia tripinnata cum impari maiore: foliolis ovatis, acuminatis, integerrimis, glabris. Flos luteo-ruber: corymbis racemosis, terminalibus.

Habitat in sylvis montanis, Cochinchina.

† GENUS XLI. SEPTAS.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium septem-partitum: laciniis profundis, erectis, 4 oppositis subulatis, 3 alternis ovatis, acutis, maioribus.
 Cor. Infundibuliformis, tubo brevi: limbo 5-partito, laciniis oblongo-ovatis, subæqualibus.
 Stam. Filamenta 4 (quorum 2 longiora) subulata, erecta, corollâ breviora. Antheræ incumbentes.
 Pist. Germen oblongo-acutum. Stylus sub æqualis staminibus. Stigma obtusum, emarginatum.
 Peric. Capsula oblonga, acuta, 2-locularis, polysperma.
 Sem. Subrotunda, plurima.
 Nom. Septas a septenario numero laciniarum calycis.
 Char: Gener. Calyx 7-partitus: laciniis 4 oppositis subulatis: 3 alternis ovatis. Cor. infundib; 5-partita. Caps. 2-locularis.

† Sp. I. SEPTAS REPENS. β. Pá tsí hién.

Differ. spec. Sept. Caule repente: foliis oblongo-ovatis: floribus solitariis.

Hab. Herba humilis, annua, caule ramoso, repente. Folia oblongo-ovata, integerrima, sessilia, opposita. Flos albus, solitarius, axillaris: peduncululis longis.

Habitat in suburbis Cantonensibus apud Sinas.

† GENUS XLII. PICRIA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium 4-phyllum, deciduum: foliolis 2. ovatis, planis, corollâ longioribus: binis aliis alternis linearibus, brevioribus.
 Cor. Tubulosa, ringens: tubo in medio constricto: labio superiore spatulato, emarginato: inferiore ampliore, 3-fido, laciniis rotundatis, æqualibus.
 Stam. Filamenta 4, quorum 2 longiora erecta, seorsim vaginata tubulis papillofis: antheris 1-locularibus, curvis, invicem distantibus. Duo alia breviora inflexa, antheris 2-locularibus, connexis.
 Pist. Germen ovatum. Stylus corollæ æqualis. Stigmata 2, lanceolata, erecta.
 Peric. Bacca ovata, infera, 2-locularis, polysperma.

Sem.

Sem. subrotunda plurima.

Nom. (*Πικρία amaritudo*) ob insignem plantæ amaritatem.

Char. Gener. Cal. 4-phyllus. Cor. ringens. Bacca 2-locularis.

Spec. 1. PICRIA. FEL. TERRÆ. a Cay. mat. dat. β. . .

Differ. spec. Pic. foliis ovatis, serratis: floribus confertis.

Hab. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, erectus, multiplex; 4-gonus, ramosus. *Folia* ovata, serrata, aspera, glabra, opposita. *Flos* albo-ruber, congestus, peduncularis, axillaris, & terminalis.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Virt: Foliorum. Aperiens, Pellens, sudorifica, Diuretica, Emmenogoga. Ufus in Hydrope incipiente, Febribus intermittibus, menibus, & lochiis suppressis, doloribus colicis, & iliatis.

CLASSIS XV.
TETRADYNAMIA.

SICULOSÆ

1. LEPIDIUM.

Silicula cordata : *valvulis* acutè carinatis.

2. THLASPI.

Silicula obcordata : *valvulis* marginato-carinatis.

SILIQUOSÆ.

3. RAPHANUS.

Siliqua articulata : *cal.* connivens.

4. BRASSICA.

Glandula 2 intra *stamina* breviora : 2 extra *stamina* longiora : *cal.* connivens.

5. RICOTIA.

Siliqua unilocularis : *cal.* connivens.

6. CLEOME.

Siliqua dehiscens, unilocul. *Cal.* hians.

7. CARDAMINE.

Siliqua dehiscens : *valvulis* revolutis.

8. SINAPIS.

Siliqua dehiscens. *Cal.* horizontaliter patens.

9. SISYMBRIUM.

Siliqua dehiscens : *valvis* rectiusculis. *Cal.* patulus.

SILICULOSÆ.

GENUS I. LEPIDIUM.

Char. Gener. *Silicula* emarginata, cordata, polysperma: *valvulis* carinatis, dissepimento contrariis. Lin. sy. pl. G. 865.

Sp. 1. LEPIDIUM PETRÆUM. β Τιμή η. α Dinh lich.

Differ. spec. Lep. *foliis* pinnatis, integerrimis: *peralis* emarginatis, calyce minoribus. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 8-pollicaris, teres, rectus. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, parva, pinnata. *Flos* dilute luteus, spicis simplicibus, erectis, longis, terminalibus. *Stamina* Tetradynamica. *Silicula* ovata, emarginata, compressa, 2-locularis, polysperma. Sapor græte amarus, & ardens. Odor lenis.

Habitat agreste in Chinâ.

Nasturtium foliis pinnatis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. Hall. Helv. n. 515. Nasturtium Pumilum, Vernum. Bauh. Pin. pag. 105. n. 8.

Virt. Diuretica, Antiscorbutica. Prodest in Hydrope, & Tussi inveteratâ. Phlegma viscosum dissolvit. Usus primarius feminum.

GENUS II. THLASPI.

Char. Gener. *Siliqua* emarginata, obcordata, polysperma: *valvulis* navicularibus, marginato-carinatis. Liu. sy. pl. G. 866.

Sp. 1. THLASPI BURSA PASTORIS. α Hán san tsào.

Differ. spec. Th. *siliculis* obcordatis: *foliis* radicalibus pinnati-fidis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 1-pedalis, glaber, multiplex: *radice* divisâ, albissimâ. *Folia* radicalia pinnati-fida: *caulina* sagittato-linearia, suprema integerrima, mediâ denticulato-repanda: omnia tomentosa: coloris obscuro-viridis. *Flos* albus, racemis erectis. *Silicula* obcordata, sub-trigono-æquilatera, sursum emarginata, *valvis* carinatis, 2-locularis: *feminibus* multis, sub-reniformibus.

Habitat incultum in Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 259. Nasturtium siliquis triangularibus. Hafl. Helvet. pag. 514.

Virtus: totius herbæ in decocto. Refrigerans, Adstringens. Valet contra sputum sanguinis, Dysenteriam, & Mensium fluxum immodicum.

SILIQUOSA.

GENUS III. RAPHANUS.

Char. Gener. *Cal.* clausus. *Siliqua* torosa, sub-articulata; teres. *Glandula* mellifera 2 inter stamina breviora; & pistillum: totidem inter stamina longiora, & calycem. Lin. sy. pl. G. 886.

Sp. I. RAPHANUS SATIVUS. Tsai fu Kên. La bac. Cai cui. Differ. spec. Raph. *siliquis* teretibus, torosis, bilocularibus. Lin.

Hab. & notæ. *Radix* oblongo-turbinata, indivisa, carnosa, alba, magna. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, teres. *Folia* oblongo-ovata, incisa, serrata, magna. *Flos* albo-purpureus, spicis longis, terminalibus: glandulis duabus inter stamina breviora, & pistillum. *Glandulas* vero alias inter stamina longiora, & calycem non inveniunt in plantâ Cochinchinensi. *Siliqua* longa, teres, acuminata, torosa, 2-locularis, sub-articulata, sub-3-locularis, seminibus multis, subrotundis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & in Chinâ. Thunb. Jap. pag. 263. Burm. Ind. pag. 140. Virtus: feminum. Pellens, Resolvens, Diuretica, Eccoprotica. Radix esculenta, sapore acris, juvat in Ischuria, Asthmate, Raucedine.

GENUS IV. BRASSICA.

Char. Gener. *Cal.* erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora, & pistillum: interque longiora, & calycem. Lin. sy. pl. G. 884.

Sp. I. BRASSICA OLERACEA. Cal. rō. ta. Differ. spec. Brass. *radice* caulescente, tereti, carnosa. Lin. sp. I. Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, biennis, 2-pedalis, erectus, crassifolius, teres. *Folia* sub-rotunda, concava, magna, glabra: petiolis canaliculatis, carnosis. *Flos* luteus, terminalis. *Siliqua*, seminibus globosis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: dubito an indigena? In utroque regno folia sæpe in globum connivent, licet non tam densum, ut in Europâ. Raro florêt. Hortus Cliffort. pag. 338. Brassica alba, vel viridis. Bauh. Pin. pag.

Sp. 2. BRASSICA CHINENSIS. α Cai rô Annam, β Châi lân tsi. Differ. spec. Bras. *foliis* ovalibus, subintegerrimis, floralibus amplexicaulibus lanceolatis: *calycibus* ungue petalorum longioribus. Lin. sp. 8.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, ad 5 pedes, & ultra sæpe assurgens: *radice* caulescente, tereti, duriuscula. *Folia* sub-ovalia, subintegerrima, rugosissima: parva, sub-plana, petiolis longis, subteretibus. *Flos* albus, terminalis, spicis laxis.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 140.

GENUS V. RICOTIA.

Char. Gener. *Siliqua* unilocularis, oblonga, compressa: *valvulis* planis. Lin. sy. pl. G. 874.

† Sp. 1. RICOTIA CANTONIENSIS. β . . .

Differ. spec. Ric. *foliis* oblongis, pinnato-incis: *flore* solitario.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 10-pollicaris, erectus, multiplex; sulcatus, glaber. *Folia* oblonga, pinnato-incisa, parva, glabra, sessilia. *Flos* luteus; solitarius: *calyce* 4-phylo, sub-patente: *corollâ* 4-petalâ, cruciformi, obcordatâ, patente. *Stamina* Tetradynamica. *Siliqua* oblonga, compressa, tenuis, subfessilis: axillaribus, obliqua, 1-locularis, 2-valvis: feminibus multis, ovatis.

Habitat inculta Cantone sinarum.

GENUS VI. CLEOME.

Char. Gener. *Glandule* nectariferæ 3, ad singulum sinum calycis singulæ, excepto infimo. *Petala* omnia ascendentia. *Siliqua* unilocularis, bivalvis. Lin. sy. pl. G. 890.

Sp. 1. CLEOME PENTAPHYLLA. α Mân mân tsi.

Differ. spec. Cle. *floribus* Gynandris: *foliis* quinatis: *caule* inermi. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, inermis, erectus, simplex, 2-pedalis, teres, fusco-ruber: *ramis* diffusis. *Folia* quinaria, petiolo communi longo: *foliolis* ovalibus, tomentosis, sessilibus, supremo maiori. *Flos* albicans, spicâ longâ, erectâ, terminali: *bracteis* 3-phyllis flores distinguentibus. *Calyx* inferus, 4-phyllus, foliolis oblongis, erectis, deciduis. *Corolla* petala 4, rotundata, inæqualia, patentia: unguibus longis, filiformibus. *Filamenta* 6,

Ecc

lon-

398 L E T R A D Y N A M I A . S I L I Q U E O S A .

longa, filiformia, æqualia, patentia, receptaculo filiformi, longo, in medio intumescenti infidentia: *antheris* oblongis, stantibus. *Ger-men* oblongum, apici ipsius receptaculi elongati inhaerens: a basi staminum distans. *Stylus* nullus. *Stigma* lenticulare, retusum. *Pericarpium* siliqua 3-pollicaris, subulato-teres, rugosa, 1-locularis, 2-valvis: *seminibus* plurimis, reniformibus, rugosis, 6 ordinibus stratis: insitens *pedunculo*, sive receptaculo longo, florifero, stamini-fero, fructifero.

Habitat inculta agros, & hortos Cochinchinæ.

Laganfa Rubra. Rumph. Amb. l. 8. c. 66. t. 96. fig. 2. Sinapistrum Indicum Pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum. Burm. Zeyl. pag. 216.

Sp. 2. CLEOME ICOSANDRA. α. Mãn mãn tláng.

Differ. spec. Cle. *floribus* Icosi-tetrandis: *foliis* quinatis. Lin. sp. 6. Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, teres, inermis, striatus, pilosus: *ramis* ascendentibus. *Folia* quinata, lanceolata, aspera, petiolo communi longo, proprio nullo. *Flos* luteus, axillaris solitarius. Omnia, præter petala, & stamina, confita papillis viscosis. *Calyx* campanulatus, 4-phyllus, foliolis lanceolatis, deciduis. *Corolla* campanulata, patens, petala 4, ovato-oblonga, sub-æqualia, calyce longiora. *Filamenta* 18-22, subulata, brevia, æqualia, receptaculo planiusculo inserta: *antheris* subulatis, recurvis. *Germen* superum, oblongum. *Stylus* crassus, brevis. *Stigma* obtusum. *Pericarpium* siliqua longa teres, subulata, tenuis, obliquè striata, 1-locularis, polysperma: *seminibus* reniformibus.

Habitat inculta in hortis, & agris Cochinchinæ.

Laganfa Alba. Rumph. Amb. l. 8. c. 66. tab. 96. fig. 3. Sinapistrum Zeylanicum Pentaphyllum viscosum, flore flavo. Burm. Zeyl. pag. 215. tab. 99.

Observ. In ambabus his speciebus Cleomes vix Cleomen ipsam agnosco. Stamina nullatenus sunt Tetradynamica: glandulas ad sinus calycis non notavi: nec petala ascendentia. Siliqua sola cohæret.

G E N U S VII. C A R D A M I N E .

Char. Gener. *siliqua* elasticè dissiliens, valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* subhians. Lin. fy. pl. G. 876.

Sp. 1. CARDAMINE CHELIDONIA. β . . .

Differ. spec. Card. *foliis* pinnatis: foliolis quinis, incisus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ: *Caulis* herbaceus, 8-pollicaris: *ramis* multis ascenden-

dentibus. *Folia* pinnata, foliolis septenis, lanceolatis, incisus, glabris. *Flos* albus, spicis simplicibus, terminalibus. *Calyx* 4-phyllus, foliolis oblongis, curvis, sub-hiantibus. *Corolla* 4-petala, campanulata, patens. *Siliqua* longiufcula, teres, 2-locularis, valvis revolutis dehiscens: seminibus ovatis. *Stigma* obtusum, integrum, sessile.

Habitat inculta Cantone Sinarum.

Cardamine glabra, Clelidonii folio. Pall. it. 3. pag. 34. Mill. Dict. n. 10.

GENUS VIII. SINAPIS.

Char. Gener. *Cal.* patens. *Cor.* unguis recti. *Glandula* interstamina breviora, & pistillum, interque longiora, & calycem. Lin. fy. pl. G. 885.

Sp. 1. SINAPIS CHINENSIS. β Kái tsái. α Cai cu: Cai sen: Cai mo.

Differ. spec. Sin. *Siliquis* lævibus, sub-articulatis, patulis: *foliis* lyrato-runcinatis, sub-hirsutus. Lin. sp. 8.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, 3-pedalis, crassus, striatus, ramosus. *Folia radicalia* magna, oblongo-ovalia, lyrato-runcinata, rugosa, pilis raris, sæpe nullis: *petiolis* sub-teretibus, caniculatis, brevibus, carnosis. *Folia caulina* cordato-conica, amplexicaulia, subferrata, alterna, glabra, auriculis rotundatis. *Flos* terminalis luteus, spicis longis, simplicibus. *Siliqua* patulæ, læves, torosoturgidæ, 2-loculares: *seminibus* globosis, fuscis.

Habitat latissime culta in Chinâ, & in Cochinchinâ.

Observ. Duæ hujus varietates inveniuntur in Cochinchinâ dictæ *cai sen*, *cai mo*, quæ folia habent integra nec lyrata, multo sapidiores, & teneriores pro cibo. Hujus quoque varietas est *Sinapis Juncea* (Linnæi sp. 9.): sicut etiam *Sinapis Cernua*. Thunb. Japon. pag. 261.

Sinapi Indicum maximum, lactucæ folio. Herm. Par. pag. & tab. 230.

Virtus: seminum. Incidens, Stimulans. Valet præcipuè in morbis ex pituitâ crassâ oriundis. Externè pro Sinapismis.

Sp. 2. SINAPIS BRASSICATA. β Pê Kái. α Cai bach thoi.

Differ. spec. Sin. *foliis* ob-ovatis, denticulatis, lævibus. Lin. sp. 3.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, glaber, simplex, lævis, teres, albus. *Folia radicalia* ob-ovata, plana, glabra, obcuro-viridia, nitida denticulata: *petiolis* longis, curvis, albissimis: caulina

400 TETRADYNAMIA. SILIQUOIS A.

lina sub-lanceolata, sessilia, amplexicaulia. *Flos* flavus, *calyce* concolore, erecto: spicis simplicibus, longis, terminalibus. *Siliquæ* sub-teretes, patulæ, pedunculatæ, 2-loculares.

Habitat copiosè culta in Chinâ, & Cochinchinâ.

† Sp. 3. SINAPIS PEKINENSIS. β Pê tsai. α Cai bén.

Differ. spec. Sin. *foliis* turbinato-ovatis, integris, crispis: *petiolis* sub-planis, latis: *siliquis* glabris, planiusculis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, crassus, teres, glaber. *Folia* radicalia turbinato-ovata, integra, serrato-runcinata, crispata, glabra, flavescentia, tenerrima: *petiolis* sub-planis, latissimis, albis, sulcatis, semiamplexicaulibus: *caulina* conica, sessilia integerrima. *Spicæ* solitariae, longissimæ, patentes. *Calycis* foliola 4, oblonga, obrusa, erecta, lutea. *Corolla* similiter lutea, 4-petala, patens. *Siliquæ* lineares, compressæ, glabræ, 2-loculares: *feminibus* globosis, rufis.

Habitat Pekini culta, ubi omnium optima. In Cochinchinâ altius crescit, inferior qualitate. In Lusitaniâ satam, & plantatam servo, sed quotannis in peius degenerantem.

Observ. Attendens ad varietates Brassicæ Oleracæ in Europâ cultas, & facie inter se valde differentes dubitare cæpi, num omnes istæ sinapis plantæ dici etiam debeant varietates, non diversæ species?

Virtus. Fere eadem, quæ præcedentium, sed debilior.

GENUS IX. SISYMBRIUM.

Char. Gener. *Siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *Cal.* patens. *Cor.* patens. Lin. fy. pl. G. 877.

† Sp. 1. SISYMBRIUM APETALUM. α Cai hoang.

Differ. spec. Sin. *foliis* pinnati-fidis, tomentosis: *floribus* apetalis.

Hab., & notæ. *Radix* sub-fusiformis, alba. *Caulis* annuus, 8-pollicularis, multiplex, sulcatus, lævis. *Folia* ad basim hastata, superius pinnati-fida, tomentosa, magna, pauca. *Calyx* 4-phyllus, foliolis laxis, sub-patentibus, stamina superantibus. *Petala* nulla. *Siliquæ* longiusculæ, tenues, teretes, declinatæ, 2-loculares: valvulis relictis, dissepimento paulo brevioribus: *feminibus* multis. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum, integrum.

Habitat spontaneum in hortis, & locis humidis Cochinchinæ.

401
 CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA

1. TAMARINDUS. Monogyna. Legum. pulposum. Filam. in platum coalita.

TETRANDRIA.

- † 2. STEMONA. Monogyna. Bacca polysperma. Petala 4. Antherae laterales.

PENTANDRIA.

- † 3. ZALA. Monogyna. Folliculus polyspermus. Petalum lingulatum. Filam. fasciculata.
 † 4. MEDUSA. Monogyna. Caps. 1-locularis, 3-valvis. Petala 5.
 5. MELOCHIA. Pentagyna. Caps. 5-locularis, 1-sperma.

HEXANDRIA.

- † 6. PIMELA. Monogyna. Drupa nuce loculari. Petala 3.

DODECANDRIA.

7. PENTAPETES. Monogyna. Caps. 5-locularis, polysperma. Petala 5, patentia.

POLYANDRIA.

* Calyce simplici.

- † 8. METEORUS. Monogyna. Drupa 1-sperma. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida.
 9. CAMELLIA. Monogyna. Drupa 4-locularis. Cal. imbricatus.

- † 10. CORDYLA. Monogyna. *Bacca* 1-locularis, clavata. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 6.
- † 11. OPHELUS. Monogyna. *Bacca* 12-locularis, lignosa. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala.
12. SIDA. Monogyna. *Caps.* locularis. *Cal.* angulatus.
13. BOMBAX. Monogyna. *Caps.* 5-locularis, polysperma. *Sem.* lanata.
- ** *Calyce duplici.*
14. GOSSYPIUM. Monogyna. *Caps.* 3-4-locularis, polysperma. *Sem.* lanata. *Cal.* exterior 3-fidus.
15. URENA. Monogyna. *Arilli* 5, 1-spermi muricati. *Cal.* exterior 5-fidus.
16. HIBISCUS. Pentagyna. *Cap.* 5-locularis, polysperma. *Cal.* exterior polyphyllus.
17. ALCEA. Polygyna. *Arilli* 1-spermi, plures. *Cal.* exterior 6-fidus.
18. MALVA. Polygyna. *Arilli* 1-spermi plures. *Cal.* exterior 3-phyllus

TRIANDRIA.

GENUS I. TAMARINDUS.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* 4-partitus. *Petala* 3. *Nectarium* setis 2, brevibus sub filamentis. *Legumen* pulposum. *Lin. sy pl. G.* 50. *Cl.* 3.

Sp. I. TAMARINDUS INDICA. a Cay Me.

Differ. spec. Tam. *foliis* pinnatis, plurimi-jugis: *pedunculis* polyfloris, lateralibus.

Hab., & nota. *Arbor* magna, cortice scabro, fusco: ramis patentibus. *Folia* pinnata, pluri-juga, alterna, nunc cum impari, nunc sine. *Foliola* minuta, ovato-oblonga, integerrima, glabra, sessilia, luce patentia, nocte imbricata. *Flos* racemulis parvis, lateralibus, pedunculo communi longo, erecto. *Calyx* campanulatus, pallidus, limbo magno, patente, 4-partito, laciniis lanceolatis, concavis, inæqualibus. *Corolla* lutea, venis rubris virgata, petala 3, ovato-lanceolata, concava, inæqualia, patentia, calyce longiora. *Filamenta* 3, filiformia, ascendencia, corollâ longiora; a basi usque ad medium lateraliter coalita in laminam planam, superius libera: setis binis ad apicem lamellæ, utrinque adherentibus. *Nectarium* nullum. *Stylus* tubulatus, in medio dilatatus, longior staminibus, cum illis ascendens. *Stigma* crassiusculum. *Pericarpium* legumen semipedale, crassum, subcurvum, compressum subruberosum, 1-loculare: seminibus paucis, circumdatis pulpâ fuscâ, succosâ, acidâ, inodorâ.

Habitat culta in hortis Cochinchina.

Tamarindus. Rump. *Amb.* l. 2. c. 32. t. 23. *Bont. Jav.* l. 6. c. 4. fig. ibi. *Garc. Arom.* l. 1. c. 28.

Virtus: pulpæ leguminum. Refrigerans, Incidens, Eccoprotica. Prodest in febris calidis, & putridis: in Tenesmo: in plerisque morbis biliosis. Medici indigenæ decoctum corticis propinant pueris variolis confluentibus laborantibus, sæpe felici exitu.

Usus. In Indiis condimentum est universale, grausissimum, & salubre.

Observ. A classe Triandriâ ad Monadelphiam transuli hoc Genus non solum propriâ observatione fretus, sed etiam ab ipso Linnæo monitus filamenta habere infernè connata, seu Monadelphia. *Gen. pl. edit.* 6. p. 23. g. 46. Similiter *sy. pl. v.* 1. p. 92. *Gen.* 50. Idem monuit Scopoli. *Introd. Hist. Nat.* pag. 296.

TETRANDRIA.

† GENUS II. STEMONA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Petala 4, infera, subulata, erecta, incurva, æqualia, magna: binis exterioribus bina alia interiora ex obliquo tegentibus.

Stam. Filamenta 4, petalis similia, lato-subulata, incurva, corollâ paulo breviora: lacinia verticali, cruciformi supra basim versus centrum invicem connexa, receptaculo insidentia. Antheræ lineares, biloculares, magnæ, a medio singuli filamenti ad apicem usque lateraliter adhærentes.

Pist. Germen compresso-rotundum. Stylus nullus. stigma hiatus germinis apice emarginati, suppositum lacinia verticali stamina connectenti.

Peric. Baccâ sphæroidea, 1-locularis, polysperma.

Sem. Multa, longiuscula, simplici ordine strata.

Nom. (ΣΤΗΜΩΝ stamen) ab staminibus notabili formâ connexis.

Char. Gener. Monogyna. Cal. o. Petala 4, erecta. Anthera laterales. Baccâ 1-locularis, polysperma.

† Sp. 1. STEMONA TUBEROSA. & Cay Bach bó A Pě pũ tsào.

Differ. spec. Stem. Caulis scandente: foliis septemnerviis: floribus solitariis, axillaribus.

Hab: caulis fruticosus, scandens, longus, tenuis, inermis, acirrhus: radice tuberosâ, fasciculata, tuberibus longis, teretibus, utrinque attenuatis, albicantibus, edulibus. Folia ovata, acuminata, integerrima, glabra, septemnervia, opposita. Flores luteo-ruber, solitarii, axillaris pedunculis longis. Baccâ mediocris, mollis, rubra.

Habitat inculta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virus: radicis. Incidens, Refrigerans, Demulcens. Utilis in morbis pulmonum, phthisi, atiquâ tussi.

Ubiũ Polypoides. Rumph. Amb. 1. 9. c. 16. tab. 129.

PENTANDRIA.

† GENUS III. ZALA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Monopetala, lingulata: tubo globoso, parvo: limbo inferius constricto, superius expanso, sub-rotundo, acuminato, integerrimo, margine parum reflexo: nectario 2-phylo, corollæ adnato, foliolo politico maiore.

Stam. Filamenta 5-8, filiformia, inæqualia, in fasciculum coalita, nectario inclusa, limbo corollæ breviora. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen superum, oblongum, apice planiusculum, tubo corollæ inclusum, a nectario, & staminibus separatum. Stylus sub-nullus. Stigma longiusculum, obtusè hians versus stamina inclinatam.

Peric. Folliculus oblongus, gibbus, apice obtusus, 1-locularis, polyspermus.

Sem. Oblonga, minuscula, pauca.

Nom. (*Zala fluctuatio*) Planta in aquâ fluctuans.

Char. Gener. Monogyna. Cal. o. Cor. 1-petala, lingulata. Stam. in fasciculum coalita. Caps. 1-locularis.

Sp. 1. ZALA ASIATICA. α Beò phù Binh. β Fêu pêng.

Differ. spec. *Zal. radice fluctuante: foliis turbinatis, obtusis: floribus radicalibus, solitariis.*

Hab. *Planta* annua, sub-acaulis. *Folia* turbinato-triangularia, 2-pollinaria, 5-nervia, crassa, integerrima, utrinque pilosa, sessilia, conferta: infidentia *radicibus* capillaribus, fascicularibus, longis, supra aquam repentibus, a terrâ distantibus. *Flos* albo-viridis, sub-sessilis, parvus, solitarius, radicalis.

Habitat fluctuans in fluminibus lenti cursus in Cochinchinâ, & Chinâ. *Plantago* Aquatica, Rumph. Amb. l. 11. c. 53. tab. 74. fig. 2. Bont. Jav. l. 6. c. 38. pag. 129. *Nymphæa minima* Maderaspetana, Pluken. Alm. pag. 266. Phyt. tab. 207. fig. 6. Tam hæc, quam Rumphiana icones bonæ sunt: Rumphiana quidem naturali magnitudine.

Observ. Apud Auctores hic citatos nulla floris delineato, aut descriptio. Linnæus (sy. pl. vol. 4. pag. 62. g. 1112.) plantam istam adscribit Classi Gynandriæ, vocatque Pistiam stratiotem: attamen in genuè fatetur flores siccos, quos vidit, non satis ipsi fecisse, li-

remque ad autoptas remittit. Si in Indlâ tantum nata esset, mutata classe, nomen a *Linnæo* impositum servassem: sed, quoniam Pistias Africanas, & Americanas non observavi, has aliis observandas relinquo sub antiquo nomine. Asiaticam a me rite examinatam diverso caractere, & nomine indicandam censui, ne nota cum ignotis confundantur.

Virtus: totius herbæ. Attenuans, Pellens, Sudorifica, Diuretica, Abstergens. Valet præcipuè in scabie, imo etiam in Leprâ tam externe quam interne sumpta.

† GENUS IV. MEDUSA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-phyllum, inferum, persistens: foliolis ovatis, pilosis, incurvis, patentibus.

Cor. Petala 5, ovato-oblonga, curva, inflexa, denuò ad apicem reflexa, calyce longiora.

Stam. Filamenta 5, filiformia, basi in tubum coalita, corollæ æqualia. Antheræ incumbentes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus subulatus; pilosus, æqualis staminibus. Stigma simplex.

Peric. Capsula ovata, 3-loba, tecta villis multis, longis, flexuosis, pilosis, 1-locularis, 3-valvis, 6-sperma.

Sem. Sub-rotunda.

Nom. a villis *Capsulæ* longis, flexuosis, angues capitis Medusæ representantibus.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valvis, 6-sperma.

† Sp. 1. MEDUSA ANGUIFERA. α Cây Chôm chôm đât.

Differ. spec. Med. *foliis* ovato-oblongis, ferratis: *pedunculis* paucifloris.

Hab. *Arbor* mediocris, ramis ascendentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, ferrata, glabra, alterna. *Flos* ruber, pedunculis paucifloris. *Capsula* in 3 lobos dehiscit, horizontaliter expansos, tectos villis longis, flexuosis, pilosis, multis.

GENUS V. MELOCHIA.

Char. Gener. Pentagyna. Caps. 5-locularis, 1-sperma. Lin. fy. pl. G.

894.

Sp. 1.

Sp. I. MELOCHIA CORCHORIFOLIA. α. Cây báy giéi.

Differ. spec. Mel. *floribus* capitatis sessilibus: *capsulis*, sub-rotundis: *foliis* sub-cordatis, sub-lobatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, binos cum dimidio pedes longus, sub-erectus, teres, *ramis* diffusis. *Folia* sub-cordata, sub-angulata, serrata, plicata, glabra, alterna. *Flos* terminalis, capitulis sub-sessilibus: *calyce* duplici, exteriori 3-phylo, foliolis subulatis: interiore 5-dentato, ventricoso. *Corolla* albo-purpurea, 5-petala. *Stamina* 5, coalita. *Styli* 5. *Capsula* sub-rotundo-pentagona, 5-locularis, 1-sperma.

Habitat in agris Cochinchinæ, inculta.

Virtus. Emolliens, Lubricans, Maltæ æmula.

Melochia Corchori folio. Dill. Elth. pag. 221. tab. 176. fig. 217. Burm. Zeyl. pag. 156.

HEXANDRIA.

+ GENUS VI. PIMELA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 3-fidum, inferum: laciniis obtusis, brevibus, erectis.

Cor. Petala 3, ovato-oblonga, erecta, conniventia, crassa, calyce longiora. Nectarium lentiforme, carnosum, 6-crenatum.

Stam. Filamenta 6, subulata, basi in tubum coalita, corollâ breviora. Antheræ oblongæ, 2-loculares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum, nectario immersum. Stylus nullus. Stigma acutum, 2-fidum.

Peric. Drupa ovato-oblonga, carnosâ.

Sem. Nux oblonga, utrinque acuta, sub-hexagona, angulis alternis obtusioribus, 2-locularis.

Nom. (Πιμελὴν pinguedo) Genus hoc arborum oleo, & resinâ pinguisimum.

Char. Gen. Monogyna. Cal. 3-fidus. Petala 3. Drupa 1-3-locularis.

† Sp. I. PIMELA NIGRA. α. Cây Búi. β. Ô lăm.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, lævibus: *racemis* simplicibus, lateralibus: nuce 2-loculari.

Habitus. *Arbor* magna, *ramis* sub-patentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-5-juga, *petiolis* glabris, ad basim tumidis: *foliis* oblongis, acutis,

acutis, integerrimis, utrinque laevibus, nitidis, nigrescentibus. *Flos* albicans, racemis simplicibus, lateralibus. *Drupa* carnosa, oleosa, exterius glabra, nigro-carulea, interius rubescens: *nuce* durissimâ, plerumque biloculari: nucleo longiusculo, tereti.

Habitat in sylvis Cochinchinâ; & Chinâ.

Ufus. *Drupæ* muria conditæ frequenter apponuntur mensis, non minus sapidæ quam olivæ, sed stomacho graves. Nucleorum in Cochinchinâ nullus usus.

Canarium Nanarium? Rumph. Amb. l. 3. c. 3. tab. 49.

† Sp. 2. PIMELA ALBA. a Cay Ca na. B Pâ lám.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, sub-6-jugis, scabris: *racemis* confertis, subterminalibus: *nuce* 3-loculari.

Hab. & notæ. *Arbor* magna, ramis ascendentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-6-juga, inferiora minora, *petiolis* teretibus: *foliis* ovato-lanceolatis, semipedalibus, integerrimis, glabris, scabris, pallidis, petiolatis. *Flos* pallidus, racemis congestis, sub-terminalibus. *Calyx* tubulosus, 3-fidus. *Corolla*, petala 3, erecta, crassa. *Stamina* 6, connexa. *Stylus* filiformis, brevis: *stigmatibus* rotundo, integro. *Drupa* trigono-ovata, glabra, rugosa, viridi-lutea, austero-acida: *nuce* 3-loculari, sub-hexagonâ, utrinque acuminata: putamine crasso, durissimo.

Habitat in sylvis Cochinchinâ, & Chinâ.

Canarium finense: Canâ. Rumph. Amb. l. 3. c. 2. pag. 154. Arbor excelsa e Chinâ heic introducta: kandan. Thunb. Japon. pag. 368.

Ufus. *Drupæ* hujus arboris muria conditæ olivis Europæis similes sunt colore, & quodammodo etiam formâ, & sapore: sunt autem saluberrimæ, ita ut medici non eas denegent ægrotis, experientiâ docti digestionem, & appetentiam cibi promovere. Nuclei projiciuntur.

† Sp. 3. PIMELA OLEOSA. a Cay Deâu rai.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, sub-4-jugis: *pedunculis* lateralibus, polyfloris: *nuce* 1-loculari.

Hab. *Arbor* maxima, trunco altissimo, recto, ramis ascendentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-4-juga, aliquando plura, petiolis glabris, teretibus, nec tumescentibus: *foliis* oblongis, acuminatis, repandis, glabris, subsessilibus. *Flos* albus, pedunculis polyfloris, lateralibus. *Drupa* ovalis, parva: *nuce* 1-loculari, nucleo solitario. Plura dicere non valeo, quia licet arbores sæpe viderim, flores non examinavi.

Habitat frequens in sylvis Cochinchinâ, maximè versus Cambodiâ.

Nanarium Oleosum, Minjæ. Rumph. Amb. l. 3. c. 6. t. 54.

Ufus.

Ufus. Drupæ hujus arboris non sunt edules. Ex trunco supra basim excavato extrahitur abundanter oleum sub-flavum, viscidum, odorem, Copaiferæ Brasiliensis simile colore, odore, tenacitate, & aliquatenus etiam virtute penetrante, vulnerariâ, & resolvente. Operibus ligneis superillitum eleganter nitet, vel purum, vel cum vernice sinensi mixtum; eoque plus valet, quod cuicumque colori aptari possit absque hujus detrimento, quamvis duratione vernici sinensi cedat, ac vilius habeatur. Frequentior usus est in re navali. Picem. Indicam, vulgo *Damar*, & stupam ex cortice arundinis bambu cum hoc oleo: & pauca calce contundunt, fitque mixtura tenacissima, quâ navium rimas obturant, nullâ præcedente coctione; nam hoc oleum, etiam frigidum tenacissimè adhæret, & mixtione calcis condensatum cito indurescit, & naturam quasi lapideam induit, & servat, sine ullo nauseoso odore, quo pix Europæa navigantes adeo molestat. Lignum arboris est fusco-rufum, durum, & grave, ex quo secantur asseres, & tabulæ vastissimæ, quæ ædificandis navibus inserviunt, licet duratione mediocri. Arbor, quæ producit resinam *damar*, de quâ Rumphius agit, nascitur etiam copiosè in Cochinchinâ, sed flores ego non vidi, nec veros caractères ex descriptione Rumphianâ valeo deducere.

Observ. Canarium commune Linnæi (Mant. pag. 20. gen. 1281, & sy. pl. vol. 4. pag. 248. gen. 1214.) deductum fuit ex canario vulgari (Rumph. Amb. 1. 3. c. 1. tab. 47.): quod, licet fructificatione, & habitu Pimelæ nostræ sit simile, maximè vero differt Classe, Calyce, & Stamina Pentandris, nec Monadelphis. Ea arbor puto, quod non nascatur in Cochinchinâ, nec in Chinâ.

DODECANDRIA.

GENUS VII. PENTAPETES.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* 5-partitus. *Stam.* 20: horum 5 castrata, longa. *Caps.* 5-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 899.

Sp. 1. PENTAPETES PHOENICEA. α Hoa tị ngo . β . . .
 Differ. spec. Pent. *foliis* hastato-lanceolatis, serratis. Lin. sp. 1.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 5-pedalis, erectus; teres; rectus: *ramis* paucis, ascendentibus. *Folia* ad basim auriculato-hastata: inde subulata, ferrata; alterna, petiolis brevibus. *Flos* coccineus axillaris, solitarius, meridie expansus, vespere deciduus. *Calyx* inferus, 5-phyllus, patens, persistens: foliolis lanceolatis, incurvis, ciliato-pilosis, apice acuminato, reflexo. *Corolla* petala 5, obtusa, subæquilatera, rotato-patentissima. *Nectarium* tubulosum, 5-gonum, bre-

410 MONADELPHIA. POLYANDRIA.

breve, sustinens foliola 5, lanceolata, erecta, concolora. *Filamenta* 15, brevia, subulata, nectario insistentia, hujus foliolis breviora, cum illo decidua. *Antherae* sagittato-lineares, stantes. *Germen* ovatum. *Stylus* turbinato-linearis, 5-angulatus, petalis æqualis. *Stigma* simplex. *Capsula* ovata, 5-locularis, 5-valvis, polyisperma. *Semina* duplici ordine, versus centrum angulata, exterius convexa.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Flos Impius. Rumph. Amb. 1. 8. c. 71. tab. 100. Blattaria Zeylanica, flore amplo, coccineo. Commel. H. Amst. 1. pag. 11. tab. 6. Burm. Zeyl. pag. 47.

Observ. Foliola illa 5 nectarii improprie dicuntur filamenta castrata, cum diversâ formâ, magnitudine, & situ gaudeant. Corpus illud tubulosum, 5-gonum, cui stamina insident, tam ex propria observatione, quam ex descriptione Rumphianâ potius existimo dicendum nectarium, quam filamenta in orbem coalescentia.

POLYANDRIA.

† GENUS VIII. METEORUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum, superum : laciniis sub-rotundis, erectis, persistentibus.

Cor. Monopetala, hippocrateriformis : tubo brevi : limbo 4-fido, laciniis ovatis, parum reflexis.

Stamina. Filamenta ultra 30, filiformia, flexuosa, corollâ duplò longiora, omnia inferius coalita in tubum cylindricum, brevem cum illis ex corollâ deciduum. *Antherae* sub-rotundæ, minimæ.

Pist. *Germen* sub-rotundum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum.

Peric. *Drupa* Octogono-ovata, glabra, coriacea, 1-sperma, coronata. Sem. 1, rotundum, durum, solidum.

Nom. (Μετέωρος pendulus) a flore, & fructu racemis longissimis pendentibus.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. *Drupa*. 1-sperma, coronata.

† Sp. 1. METEORUS COCCINEUS, n. Rau Bung.

Differ. spec. Met. *foliis* ovato-oblongis, sub-ferratis : *racemis* simplicibus, longissimis, pendulis.

Hab. *Arbor* magna, *ramis* tortuosis, ascendentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuta, subserrata, glabra, sparsa, petiolata. *Flos* coccineus terminali-

MONADELPHIA POLYANDRIA. 411

minalis: racemis simplicibus, longissimis, pendulis: pedunculis propriis brevissimis. *Drupa* obtusè 8-gona, coriacea, glabra, fusca, lato-ovata, calycina: *semine* magno, sub-rotundo, corneo.

Habitat spontaneus in sylvis planis Cochinchinæ.

Butonica Terrestris? Rumph. Amb. l. 5. c. 30. tab. 116.

Observ. Butonicam Albam vocat Linnæus Eugeniæ Racemofam. Meteorus noster certè non est Eugenia; nam corolla 1-petala, tubulosa, & stamina in tubum connexa diversum genus repositum, sicut & classem.

Ufus. Foliis teneris utuntur frequenter indigenæ in acetariis. Lignum foco, non ædificiis aptum est. *Drupæ* profus inutilis.

GENUS IX. CAMELLIA.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* imbricatus, polyphyllus: *foliis* interioribus maioribus. Lin. sy. plant. G. 914.

† Sp. 1. CAMELLIA DRUPIFERA. æ Cay Deau 15.

Differ. Ipec. Cam. *foliis* ovato-oblongis, sub-crenatis: *floribus* 2-3f natis, terminalibus: *drupis* 4-locularibus.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* patentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, sub-crenata, glabra, dura, parva, alterna, petiolata. *Flos* albus, terminalis, pedunculis binis, aut ternis, monofloris. *Calyx* sub-rotundus, imbricatus, foliolis superioribus maioribus. *Corolla* petala 8, oblonga, emarginata. *Stamina* plurima, ad basim in tubum connexa. *Stylus* 4-fidus, æqualis staminibus. *Drupa* sub-rotunda: *nuce* sulcata, 4-loculari: nucleis sub-rotundis. Fructus Juglandi æqualis, nec multum diffimilis, non tamen esculentus.

Habitat inculca, cultaque in Cochinchinâ.

Ufus. Oleum ex nucleis expressum æstimatur ab indigenis ad capillos unguendos, & varia unguenta Medica, nam gratum spirat odorem, nec facilè rancore corrumpitur.

† GENUS X. CORDYLA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 4-fidum, inferum: *foliolis* acutis.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 34, subulata, longa, sub-inflexa, omnia basi in orbem coalita. *Antheræ* ovatæ, incumbentes.

Pist. Germen ovatum, acuminatum, pedicello longo infitens. *Stylus* tu-

subulatus, brevis. Stigma simplex.

Peric. Bacca ovata, acuminata, 1-locularis, polysperma, pedicellata.
Sem. Sex, ovata.

Nom. (Κορδολη clava) a Germine, & Baccâ in formam Clavæ pedicello longo impostis.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 4-fidus, Cor. 0. Bacca 1-locularis, pedicellata.

† Sp. I. CORDYLA AFRICANA. γ Mutondo.

Differ. spec. Cord. foliis alternatim pinnatis: pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab. Arbor magna, ramis patentibus. Folia alternatim pinnata: foliolis oblongis, emarginatis, glabris, parvis. Flos lateralis, apetalus: pedunculis polyfloris, solitariis: staminibus croceis, longis, pulchris. Bacca sesquipollicaris, esculenta.

Habitat ad oram Africæ Orientalem.

† GENUS XI. OPHELUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 5-fidum, inferum, magnum tubo brevi: lacinis acutis patentibus, apice reflexis.

Cor. Petala 5, ovata, crassa, deorsum reflexa, calyce longiora.

Stam. Filamenta 500 circiter, filiformia, infernè in tubum magnum coalita, supernè in capitulum hemisphæricum, vultum reflexa, corollâ parum breviora. Antheræ sub-rotundæ, parvæ.

Pist. Germen ovatum. Stylus filiformis, crassus, longior staminibus. Stigma polyfidum, laciniis subulatis, patentibus.

Peric. Bacca oblongo-ovata, maxima, 12-locularis, polysperma: cortice lignoso, æquali, lævi.

Sem. Plurima, angulata.

Nom (Ὀφέλος utilitas) ab usu æconomico fructus.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Bacca 12-locularis: cortice lignoso.

† Sp. I. OPHELUS SITULARIUS. γ Mulambeira.

Differ. spec. Oph. foliis sparsis, integerrimis: flore solitario, terminali.

Hab-

Hab. *Arbor* magna, trunco crassissimo, nec alto, apice diviso in multos simul ramos, diffusos, reclinatos. *Folia* oblonga, acuta, integerrima, glabra, petiolata, sparsa, congestaque. *Flos* albus, terminalis, solitarius, patentissimus, diametro corollæ 3-pollicari. *Bacca* longitudine 1-pedali, & amplius: cortice duro, nec admodum crasso, lævi, æqualissimo, fulco.

Habitat: agrestis ad litora Africæ Orientalis.

Usus. Apud indigenas œconomicus, ad hauriendam aquam, ad servandos liquores, semina, legumina, &c. in fructu illo cucurbitino.

Observ. *Lecythis Ollaria* Linnæi, & *Couroupita Guianensis* Aubletii cum hac plantâ Africanâ conveniunt bacca maximâ, lignosâ: sed fructu operculato, numero partium, & nectario lingulato multum differunt: nec minus differt *Crescentia*.

GENUS XII. SIDA.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* simplex, angulatus. *Stylus* multi-partitus. *Caps.* plures, 1-permæ. Lin. sy. pl. G. 902.

Sp. 1. SIDA ALNIFOLIA. α. Cây Báy đòng tiên.

Differ. spec. Sid. *foliis* orbiculatis, plicatis, ferratis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, ramis multis diffusis. *Folia* sub-rotunda, ferrata, plana, sulcata, obcuro-iridia, subtus tomentosa. *Flos* axillaris, solitarius, luteus: *calyce* 5-fido, angulato: *petalis* 5, obcordatis: *staminibus* plurimis coalitis. *Capsula* 10, monospermæ.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Malvinda stellata, alnifolia. Burm. Zeyl. pag. 150. Dell. Elth. pag. 215. tab. 172. fig. 211.

Virtus. *Folia* mucilagine abundant: virtutem *Malvæ* possident.

Sp. 2. SIDA VISCOSA. α. Cây Báy xôi.

Differ. spec. Sid. *foliis* cordatis, crenatis, tomentosis: *floribus* subsolitariis: *capsulis* septem-ocularibus; rotundis, depressis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, pilosus. *Folia* cordata, crenata, tomentosa, mollia, albicantia. *Flos* axillaris, solitarius, luteus. *Capsula* sub-rotunda, 10-locularis. Tota planta mucilagine viscosâ scatet.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Althæa populi folio villosa, leviter ferrata. Sloan. Jam. 98. pag. 222. tab. 139. fig. 4.

Sp. 3. SIDA CORDIFOLIA. *u.*

Differ. spec. Sid. *foliis* cordatis, subangulatis, serratis, villosis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, hispida. *Folia* cordata, acuta, serrata, pilosa. *Flos* luteus, polynatus, axillaris: *pedunculis* petiolos superantibus: *calycibus* angulatis, hirsutis: *capsulis* 6, monospermis.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Althæa Maderaspatana, sub-rotundo folio, molli, & hirsuto: multo stipulis, seminibus ad apicem crinitis. Pluk. Phyc. tab. 131. fig. 2.

Sp. 4. SIDA INDICA. *u.* Cây kôi xay.

Differ. spec. Sid. *foliis* cordatis, sublobatis, *stipulis* reflexis: *pedunculis* petiolo longioribus: *capsulis* multilocularibus, scabris, calyce longioribus. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 6-pedalis, erectus, teres, glaber, ramis obliquis. *Folia* cordata, sub-rotunda, sæpe sub-lobata, acuminata, crenata, magna, utrinque glabra, cinereo-glaucâ, petiolata, sparsa. *Flos* luteus, axillaris, parvus, pedunculo 1-flo-ro petiolis longiore: *calyce* simplici, glabro, capsulis brevioribus. *Capsula* sub-rotundæ, in orbem crenatæ, 16-loculares, 3-sper-mæ: loculis ad apicem acuminatis, reflexis.

Habitat inculca in hortis, & agris Cochinchinæ.

Abutilon Indicum foliis profunde crenatis. Burm. Zeyl. pag. 2. Althææ Theophrasti similis. Bauh. Pin. pag. 316. n. 9. Abutilon læve. Rumph. Amb. l. 6. c. 14. tab. 11.

Virtutem Malvæ censetur habere, nec immeritò.

† Sp. 5. SIDA SCOPARIA. *u.* Cây Báy chóí.

Differ. spec. Sid. *foliis* lanceolato-linearibus, serratis: *floribus* solitariis, axillaribus: *capsulis* 5-locularibus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres, inermis, ramis multis, rectis, ascendentibus, lentissimis, albicantibus. *Folia* lanceolato-linearia, serrata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* axillaris, solitarius, subsessilis, pallidè luteus, minutus. *Stipule* setaceæ. *Calyx* simplex, angulatus, 5-fidus. *Petala* 5, obtusissima. *Styli* 5. *Capsula* 5-locularis, glabra, loculis acutis, apice 2-fidis, 1-spermis. *Stamina* plerumque 10, connexa.

Habitat loca agrexia in Cochinchinâ.

Silagarium Longifolium. Rumph. Amb. l. 10. c. 32. pag. 45. tab. 18. fig. 2. Sida Acuta. Burm. Ind. pag. 147.

Usus : oeconomicus caulium ad colligandas scopas maiores longæ durationis : unde nomen vernaculum scoparia.

Virtus : radices , & foliorum . Emolliens , Resolvens , Anodyna . Externè valet ad quoscumque tumores resolvendos , vel maturandos , doloremque leniendum .

G E N U S XIII. B O M B A X .

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-fidus. Stam. 5. sive multa. Caps. lignosa , 5-locularis , 5-valvis. Sem. lanata. Recept. 5-gonum. Lin. sy. pl. G. 901.

Sp. I. BOMBAX PENTANDRUM. α Cay Gòn. β. Mồ miên hĩa : Uên xú.

Differ. spec. Bomb. floribus pentandris : foliis septenatis. Lin. sp. I. Hab. , & notæ. Arbor magna , trunco recto , aculeis brevibus , sparsis , paucis : ramis rectis , horizontalibus , stellatis : tribus , vel pluribus , ex eodem centro in orbem extensis , superioribus ordinibus in pyramidem decrescentibus. Folia digitata , septena , petiolis communibus longis , alternis : foliolis lanceolatis , integerrimis , glabris , petiolatis , inæqualibus. Flos pallidus , carnosus , racemis brevibus , terminalibus. Calyx tubulosus , inflatus , 5-fidus , laciniis rotundatis. Corolla petala 5 , ovata , concava , pilosa , sub-patentia. Filamenta 5 , connexa , subulata , corollæ æqualia. Antheræ magnæ , lineares , flexuosæ , aliquando 3 distinctæ , reniformes in quolibet filamentto. Stylus filiformis , æqualis staminibus. Stigma sub-rotundum , inæqualiter crenatum. Capsula oblonga , 5-pollicaris , obtusè 5-gona , 5-locularis , 5-valvis , basi dehiscens : cortice crasso , duro , fusco , rugoso. Semina plurima , sub-rotunda , involuta seorsim lanâ tenuissima , pallidâ , brevi , multâ.

Habitat agrestis in Cochinchinâ , & Chinâ , copiosus autem in Cambodiâ.

Eriophoros Javana. Rumph. Amb. I. T. c. 67. tab. 80. Arbor Lanigera , sive Gossampinus Plinii. Bont. Jav. I. 6. c. 24. fig. ibi.

Usus. Iltius arboris fructus tomentum omnium optimum , & idoneum præstat ad farciendas culcitas , pulvinaria , & similia , que , licet frequenter comprimantur , elasticitate naturali resiliunt , ne indurescant.

G E N U S XIV. G O S S Y P I U M .

Char. Gener. Monogyna. Cal. duplex : exterior 3-fidus. Caps. 4-locularis. Sem. lanâ obvoluta. Lin. sy. pl. G. 910.

Sp. I. GOSSYPIUM HERBACEUM. α Cay Boung. β Miên tũ.

Ggg ii

Differ.

- Differ. spec. Goss. *foliis* 5-lobis, subtus eglandulosis: *caule* herbaceo, lævi. Lin. sp. 1.
- Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, simplex, erectus; teres; sub-tomentosus: *ramis* brevibus, patentibus, trifariam alternis, axillaribus, indivisis. *Folia* sub-rotunda, 5-loba, integerrima, eglandulosa, venosa, alterna, petiolis longis, teretibus. *Flos* solitarius, magnus, axillaris, & terminalis. *Calyx* exterior trigonus, tripartitus, laciniis magnis, conicis, aliquando integerrimis læpius dentato-incisis. *Corolla* petala 5, patentia, calyce ampliora, coloris pallide-lutei, maculâ fusco-rubrà in fundo notata, obtusissima. *Stamina* multa in cylindrum coalita. *Stylus* æqualis staminibus: *figmatibus* 3-4, obrusis. *Capsula* ovata, acuminata, 3-4-gona, 3-4-locularis, polysperma. *Semina* sub-rotunda, pauca, lanâ tenui, albissimâ involuta, valvis tribus, vel quatuor erumpente.
- Colitur in totâ Cochinchinâ, Chinâ, & plerisque Asiæ locis non nimis frigidis.
- Thunb. Japon. pag. 271. Gossypium Capas. Rumb. Amb. l. 6. c. 15. tab. 12. Quæ figura, & descriptio partim cum nostrâ non coherent.
- Usus. Nullius plantæ universalior est utilitas, quam Gossypii. Hæc iadumenta præbet quatuor orbis partibus: maximè Asiæ incolis, minus Europæ. Ejus semina, quasi legumina sunt edulia, & salubria.
- Sp. 2. GOSSYPIUM ARBOREUM. γ . . .
- Differ. spec. Goss. *foliis* palmatis: *lobis* lanceolatis: *caule* fruticoso. Lin. sp. 2.
- Hab. & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis, crus crassus, cortice scabro; fusco: *ramis* diffusis, longis, tortuosis. *Folia* palmata, 3-5-loba, eglandulosa, glabra, sparsa, petiolata, lobis brevibus. *Flos* integrè luteus, terminalis, solitarius. *Calyx* exterior 3-phyllus, foliolis magnis, incisis, erectis: interior 5-crenatus. *Capsula* plerumque 3-gona, 3-valvis, 3-locularis, sub-ovata, acuminata, scabra. *Semina* multa, lanâ albâ obvoluta.
- Habitat in orâ Africa Orientali.
- Forsk. Ægypt. pag. 125. Gossypum Arborefcens. Alp. Exot. 38. tab. 38.
- Usus idem; qui præcedentis.

GENUS XV. URENA.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* duplex: exterior 5-fidus. *Caps.* 5-locularis, echinata, monosperma. Lin. sy. pl. G. 909.

Sp. 1. URENA LOBATA. α Cay Báy loung. A Sié thâu sô.

Differ.

Differ. spec. Ur. *foliis* angulatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, bipedalis, erectus, teres, pilosus, ramofus. *Folia* sub-rotunda, cordata, 3-lobata, serrata, pilosa, alterna, petiolis longis. *Flos* rubescens, axillaris, pedunculatus, 1-floris, 2-natis. *Caps.* echinata, 5-locularis, 1-sperma.

Habitat spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ.
Burm. Ind. pag. 149. Lappago Rumph. Amb. l. 10. c. 43. tab. 25. fig. 2. Aft. in Rumphianâ plantâ folia laciniata: in nostrâ lobata sunt.

Sp. 2. URENA SINUATA. α Cay Bâi intc. abanor-dai (Ure)

Differ. spec. Ur. *foliis* sinuato-palmatis sinibus obtusis. Lin. sp. 2.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 3-pedalis: ramis ascendentibus. *Folia* sinuato-palmata, sinibus obtusis, serrata, aspera, alterna, petiolata: poro glanduloso unico sub costâ intermedia. *Flos* coloris rosei, minutus, subsolitarius, axillaris: *calyce* utroque 5-fido: *arillis* 5, monospermis, ovatis, echinatis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus incisiss, flore solitario. Burm. Zeyl. pag. 150. tab. 69. fig. 2. Alceda floribus roseis, fructu lapaceo, 5-partito. foliis profunde laciniatis. Herm. Mus. Zeyl. pag. 63.

Sp. 3. URENA PROCUMBENS. α Cay Bâi Cát. (Ure)

Differ. spec. Ur. *foliis* oblongis, sinuatis, serratis, caule procumbente. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, procumbens, teres, rubescens, ramofus. *Folia* hastata, inæqualiter, & profunde serrata, aspera, alterna. *Flos* croceus, axillaris, congestus: *calyce* utroque 5-fido: *staminibus* 10: *stilo* unico. *Capsula* rotunda, echinata, 4-locularis, 1-sperma.

Habitat loca arenosa in Cochinchinâ, & Chinâ.

Urena Procumbens, foliis hastato-subcordatis indivisis, serratis, caule procumbente. Burm. Ind. pag. 150.

Sp. 4. URENA POLYFLORA. β Xie thau fô.

Differ. spec. Ur. *foliis* angulatis: *floribus* congestis: *calyce* polyfloris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 2-pedalis, ramis patentibus. *Folia* angulata, inæqualiter ornata, utrinque pilosa, alterna, petiolata. *Flos* croceus, axillaris, congestus: *calyce* utroque 5-fido: exteriore polyfloro: interiore laciniis linearibus. *Stylus* unicus: *stamina* Monadelphia. *Capsula* ovata, muricata, 5-locularis, monosperma. Petala 5, obtusa, basi sub-coacta.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 5. URENA MONOPETALA. α Cay Báy chieo.

Differ. spec. Ur. *foliis* ovato-lanceolatis, serratis: *corollis* monopetalis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus: 2-pedalis, erectus, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, integrâ, serrata, venosâ, tomentosa, alterna. *Flos* violaceus, axillaris, solitarius. *Calyx* exterior 5-phyllus, brevior. *Corolla* 5-petala, tubo calyci æquali: limbo patente, 5-partito, laciniâ superiore maiore, emarginata: *stamina* Monadelphia. *Capsula* sub-rotunda, muricata, 5-locularis, 1-sperma.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

G. E. N. U. S. XVI. HIBISCUS.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* duplex: exterior polyphyllus. *Caps.* 5-locularis, polysperma. *Lin. sy. pl. G. 911.*

Sp. 1. HIBISCUS POPULNEUS. α Cay Tla.

Differ. spec. Hib. *foliis* cordatis, integerrimis: caule arboreo, *calycum* exteriore truncato. *Lin. sp. 3.*

Hab., & notæ. *Caulis* Arboreus, 15-pedalis, ramis longis, expansis. *Folia* basi cordata, inde conica, integerrima, glabra, sparsa, petiolis longis. *Flos* magnus, pallidus, in senectute ruber, 5-petalus, patens. *Calyx* exterior in Cochinchinâ 3-phyllus, in Malabariâ integer, repandus: interior campanulatus, 5-dentatus. *Capsula* sphaeroidea, sesqui-pollicaris, 5-locularis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ. Etiam longâ serie plantatus in urbe Gallorum Pondichery, ubi jucundum umbraculum præbet viatoribus.

Novella Litorea. Rumph. Amb. l. 3. c. 31. tab. 74.

Sp. 2. HIBISCUS TILIACEUS. α Cay Tla lâm chieo.

Differ. spec. Hib. *foliis* cordatis, sub-rotundis, indivisis, acuminatis, crenatis: caule arboreo: *calyce* exteriore decem dentato. *Lin. sp. 4.*

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 12-pedalis, tortuosus: *cortice* canabino: *ramis* multis expansis. *Folia* cordata, sub-rotunda, acuminata, sub-crenata, sparsa, petiolis longis, teretibus. *Flos* magnus, sparsus, flavus, rubro-striatus: *calyce* exteriore 10-dentato, interiori 5-fido: *corollâ* 5-petalâ, obtusâ, patente. *Stamina* multa, Monadelphia. *Stylus* 5-fidus. *Capsula* ovata, rugosa, fusca, 5-locularis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, maximè ad ripas fluminum, & ma-

ris litora: similiter in Chinâ.
 Alcea Indica Sinarum, flore luteo, malvaceo. Pluken. Amalt. pag. 6.
 tab. 355. fig. 5. Novella Daun. Rumph. Amb. l. 3. c. 28. tab. 73.
 Virt. foliorum. Refrigerans, Laxans, Resolvens. Intus sumpta in decocto valent in ardore febrili, Dysuria. Externè in partu difficili, phlegmonibus, Cephalgiâ calidâ.
 Usus. Cortex inservit ad torquendos minores funes, nec tenda rôtia, texendas storeas, & quælibet liganda.

Sp. 3. HIBISCUS ROSA SINENSIS. α Houng Kân. α
 Differ. spec. Hib. *foliis* ovatis, acuminatis, ferratis, glabris: *caule* arboreo. Lin. sp. 6.

Hab. & notæ. *Caulis* arboreus; 9-pedalis: *cortice* scabro, fusco: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuminata, ferrata, glabra, nitida, obscure-viridia, petiolata, alterna. *Flos* nitidè coccineus, magnus, 4-pollicaris, simplex, plenusque, pulcherrimus, inodorus, solitarius, sub-terminalis. *Calyx* exterior 8-phyllus, foliolis linearibus: interior semiquinquefidus; acutus. *Stamina* plurima, brevia, rubo longò, tenui lateralitèr inserta. *Stylis* 5, brevibus. *Capsula* subrotunda, 5-locularis, polysperma.

Habitat tam culta, quam spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ.
 Flos Festalis. Rumph. Amb. l. 6. c. 11. tab. 8. Ketmia Sinenfis, fructu sub-rotundo, flore pleno. Burm. Zeyl. pag. 133.

Virt. foliorum, & radices. Emolliens, Resolvens, Anodyna. Profunt in Stranguria; & Dysuria; dolores nephriticos mitigant, alvum laxant, inflammationem tonsillarum, & oris per gargarisma leniunt.

Usus. Flores spiritum vini, & similes liquores tingunt colore rubro, additoque parvissimo alumine, colore violaceo gratissimo. Idem flores recentes, si calceis, vel telis nigris affricentur, nigredinem augent, & nitorem. In Cochinchina sic trivialis est ista planta, ut ex illâ integræ hortorum sepes ducantur. Præter binas varietates flore simplici, & flore pleno coccineis, est tertia varietas flore etiam pleno, magno coloris lateritii: præterea quarta flore albissimo, pleno, rarior quidem & culturâ difficilior, quæ aliquantulum differt a præcedentibus foliis serrato-incisis, ad Hibiscum Syriacum declinantibus.

Sp. 4. HIBISCUS MUTABILIS. α Phû duong. α Fû yung. α

Differ. spec. Hib. *foliis* cordato-quinqueangularibus, obsolete serratis: *caule* arboreo. Lin. sp. 9.

Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, 9-pedalis, rectus, multiplex, ramofus: cortice cinereo, glabro, cannabino. *Folia* cordata, sub-rotunda, 5-angulata, obsolete serrata; utrinque tomentosa, albicantia, sparsa,

sa, petiolis longis. *Flos* magnus, plenus, colore mutabilis, nunc albus, nunc ruber, plerumque roseus apparet: pedunculis polyor-
ris, terminalibus. *Calyx* exterior sæpius 9-phyllus, folioliis linea-
ribus: interior semiquinque-fidus. *Stamina* Monadelphica. *Capsula*
sub-rotunda, 5-locularis, polysperma.
Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ. Thunb. Jap. pag. 272. *Flos* Horarius. Rumph. Amb. 1. 6. c. 12. tab. 9.
Virt. Fere eadem, quæ præcedentis Rosæ Sinenfis, & Althææ Eu-
ropææ æmula. In rebus œconomicis nullius usus, præter aspectum
pulchrum.

Sp. 5. HIBISCUS SYRIACUS. α Houg kán hié.

Differ. spec. Hib. foliis cuneiformi-ovatis, superne inciso-ferratis: cau-
le arboreo. Linn. sy. pl. sp. 12.
Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, rectus, 9-pedalis; multi-
plex: *ramis* strictis; ascendentibus. *Folia* parva, sub-cuneiformia,
superius inciso-ferrata, tomentosa, alterna, petiolis brevibus. *Flos*
cæruleo-violaceus, plenus, mediocris, sub-erectus, subsessilis, la-
teralis, & terminalis. *Calyx* exterior 7-phyllus. *Stamina* Monadel-
phica. *Fructus* plerumque abortiens.

Habitat in hortis Cochinchinæ: in Chinâ mihi non visus.
Forsk. Ægypt. cent. 4. n. 93. pag. 125. Thunb. Jap. pag. 272.

Sp. 6. HIBISCUS SURATTENSIS. α Cay song chua.

Differ. spec. Hib. recurvato-aculeatis: foliis 5-lobis: calycibus ex-
terioribus appendiculatis: stipulis semicordatis: soribus peduncula-
tis. Linn. sp. 116.
Hab. & notæ. *Frutex* 6-pedalis, scandens, multiplex; ramosis: cau-
le, foliis, petiolis, calyce, pedunculis omnibus aculeatis. *Folia* mix-
ta 3-loba, palmataque 5-loba, serrata, sparsa, petiolis longis.
Flos lateralis, solitarius, mediocris, pedunculo longo: corollâ in-
teriore crocæâ; foris ruberrimâ. *Calyx* duplex; uterque persistens. Ex-
terior rotatus, appendiculatus, exoticus, 10-phyllus, folioliis ova-
to-oblongis, pedicellatis: interior 5-fidus, lacinis acutis, connatis:
dorso, & margine carinatis. *Corolla* petala 5, campanulata,
obusa, basi leviter cohærentia. *Filamenta* plurima, subulata, in-
ferius coalita in tubum, calyce longiorem. *Antheræ* oblongæ, in-
curvæ. *Germen* conicum, 5-gonum. *Stylus* 5, reflexus, æquales sta-
minibus. *Stigmata* convexa. *Capsula* lato-conica, dîmersis, sericea,
5-valvis, 5-locularis, polysperma, calyce interiore connivente clausa.
Semina angulata, scabra.
Habitat inter sepes Cochinchinæ.
Kæmia Indica, Spiuulosa, profundè laciniata, acetosa sapore. Burm.
Zeyl.

Zeyl. pag. 135. Herba crinalium Agrestis. Rumph. Amb. I. 6. c. 19. pag. 40. tab. 16

Ufus. Foliis gratè acidis condiuntur cibi. In cataplasmate juvant ad dissolvendos tumores duros, & pustulas ex variolis residuas: in quem finem plantæ radix efficacior habetur.

Sp. 7. HIBISCUS ESCULENTUS. *α* Cây bông vàng, chia lá, & Hoàng sôc quí.

Differ. spec. Hib. *foliis* quinque partito-pedatis: *calycibus* interioribus latere rumpentibus. Lin. sp. 19.

Habitus, & notæ. *Caulis* suffruticosus; 6-pedalis, teres, inæqualis; suberectus: ramis herbaceis, diffusis, reclinatis, hispidis. *Folia* palmata, crenata, tomentosa, petiolis longis, hispidis, sparsis. *Flos* lateralis, solitarius, magnus, 5-petalus, luteus, rubro confersus. *Calyx* exterior 8-phyllus: interior oblongus, spathaceus, apice 4-dentatus, a latere dehiscens. *Capsula* oblonga, acutè 5-gona, 5-locularis, 5-valvis: *feminibus* multis, reniformibus. *Stamina* Monadelphica. *Styli* 5.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Burm. Ind. pag. 153. Fork. Ægyp. centur. 4. pag. 125. n. 90. Secunda Quigombo ex Africa traducta. Pil. Bras. I. 4. c. 45. pag. 211. fig. ibi.

Ufus. Fructus nondum maturi, sed cocti esculenti sunt. Planta colitur ob formam, & colorem floris, quamvis inodori.

GENUS XVII. ALCEA

Char. Gener. *Cal.* duplex: exterior 6-fidus. *Arilli* monospermi; plures. Lin. sy. pl. G. 905.

† Sp. 1. ALCEA AFRICANA. *γ*.

Differ. spec. Alc. *foliis* 3-lobis, crenatis: *floribus* solitariis, axillariibus: *calyce* utroque 6-partito.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, multiplex, teres, hispides. *Folia* 3-loba, inæqualiter crenata, aspera, alterna, petiolata. *Flos* coccineus, lateralis, pedunculis solitariis, longis, monofloris: *calycibus* exteriore, & interiore 6-partitis: *staminibus* Monadelphis: *pistillo* pentagyno: *arillis* 5, monospermis, lævibus.

Habitat ad litora Africæ Orientalis.

Observ. Alcea Indica (Burm. Ind. pag. 149.) convenit cum Africanâ foliis 3-lobis, crenatis: differt autem floribus terminalibus, luteis, & calyce interiore 5-fido.

GENUS XVIII. MALVA.

Char. Generi. *Cal.* duplex: exterior 3-phyllus. *Arilli* plurimi, monospermi. Lin. fy. pl. G. 966.

Sp. 1. MALVA TOMENTOSA. Cay. Fay. tbi.
Differ. spec. Malv. *foliis* cordatis, crenatis, tomentosis: *floribus* lateralibus congestis: *caule* fruticoso. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 2-pedalis, erectus, teres, hispidus, parum ramosus. *Folia* ovata, sub-acuta, sub-cordata, crispa, crenata, utrinque tomentosa. *Flos* luteus, minusculus, axillaris, glomeratus. *Calyx* exterior 3-phyllus: interior 5-dentatus. *Petala* 5, ob-cordata, breviter *Stamina* 5, coalita. *Styli* multi. *Arilli* monospermi multi.

Habitat inculca in Cochinchinâ.

Althæa Orientalis bidens, sub-rotundis foliis, floribus parvis, luteis. Pluk. Amalth. 11. tab. 356. fig. 1. Malva foliis cordatis, crenatis, villosis. Hort. Cliff. pag. 347.

Sp. 2. MALVA VERTICILLATA. β Tūng quèi tsù. α Doung qui tu.
Differ. spec. Malv. *caule* erecto: *foliis* angulatis: *floribus* axillaribus, glomeratis: *calycibus* scabris. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, erectus. *Folia* cordata, 5-7-angulata, sub-crenata, glabra, petiolis longis, alternis. *Flos* albo-ruber, parvus, pedunculis 1-floris, axillaribus, glomeratis. *Calyx* exterior 3-phyllus: interior 5-fidus. *Stamina* Monadelphica, multa. *Arilli* plurimi, monospermi.

Habitat culta Cantone Sinarum. In Cochinchinâ rarè.

Berm. Ind. pag. 149. Hort. Cliff. pag. 502.

Virtus: totius plantæ. Emolliens, Laxans.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

- 1. POLYGALA. Cal. 2 laciniae alaeformes. Cor. vexillum cylindricum. Caps. obcordata, 2-locularis.

DECANDRIA.

* Stamina omnia connexa.

- 2. ERYTHRINA. Ala, carinaque brevissima.
- 3. ABRUS. Filamenta 9 basi infima connexa, latere superiore libera. Sem. ovata.
- 4. GENISTA. Pistillum deprimens carinam. Stigm. involutum.
- 5. LUPINUS. Antherae alternae rotundae, alternae oblongae. Legumen coriaceum.
- 6. ANTHYLLIS. Cal. turgidus, includens siliquam.
- 7. ARACHIS. Legum. torulosam, reticulatum. Cor. resupinata, vexillo amplo.
- 8. ASPALATHUS. Leg. muticum, oxarum, subdispermum.
- 9. PTEROCARPUS. Leg. foliaceum. Stamina bina trianthera.
- † 10. DERRIS. Legum. membranaceum. Petala basi falcata.
- 11. CROTOLARIA. Legum. pedicellatum, turgidum.
- *** Stigma pubescens. Nec priorem nota.
- 12. PHASEOLUS. Carina, stylusque spirales.
- 13. DOLICHOS. Vexillum basi callis 2, oblongis, alas comprimentibus.
- 14. PISUM. Stylus supra carinatus, villosusque.
- 15. VICIA. Stylus sub stigmate barbatus.

*** *Legum. sub-monospermum. Nec priorum notæ.*

16. PSORALEA. *Cal. punctis glandulosis.*
 17. TRIFOLIUM. *Legum. vix calyce longius, 1-2-spermum. Flores capitati.*
 18. GLYCYRRHIZA. *Cal. bilabiatus: superiore 3-fido.*

**** *Legumen sub-articulatum.*

19. ÆSCHYNOMENE. *Legum. articulis monospermis. Cal. bilabiatus.*
 20. HEDYSARUM. *Legum. articulis sub-rotundis, compressis. Carina obtusissima.*
 21. CORONILLA. *Legum. isthmis interceptum, rectum.*
 22. ORNITHOPUS. *Legum. articulatum, arcuatum.*
 23. HIPPOCRÆPIS. *Legum. compresso-membranaceum: altera futura emarginaturis ad medium excisa.*
 24. MEDICAGO. *Legum. spirale, membranaceo-compressum. Pistillum carinam deflectens.*
 † 25. DIPHACA. *Legumina 2, articulata. Stam. Vaginâ duplici.*

***** *Legumen 1-foculare, polyspermum. Nec priorum notæ.*

26. CLITORIA. *Vexillum amplum, alas obtegens. Cor. reflexinata.*
 27. ROBINIA. *Vexillum reflexo-patens, sub-rotundum.*
 † 28. CITTA. *Vexillum. turgidum. Legum. exterius cellulosum.*
 29. GLYCINE. *Carina vexillum reflectens.*
 30. INDIGOFERA. *Carina utrinque denticulo.*
 † 31. GRONA. *Carina subtus cavernosa, alis utrinque coalita.*

- † 32. PHYNCHOSIA. *Carina* rhomboidea, rostrata. *Legum* membranaceum.
- † 33. MARCANTHUS. *Carina*, & *ale* longissimæ. *Legum*. Crassum, teres.
34. ERVUM. *Cal.* 5-partitus, sub-æqualis, longitudine fere corollæ.
- † 35. SARCODUM. *Cal.* semitruncatus. *Legum.* carnosum.
36. CYTISUS. *Legumen* pedicellatum. *Cal.* bilabiatus.
37. LOTUS. *Legumen* teres, factum *seminibus* cylindricis.

OCTANDRIA.

GENUS I. POLYGALA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus : *foliis* duobus alaformibus, coloratis. *Legum.* obcordatum, bifoculare. Lin. G. 921.

Sp. 1. POLYGALA SIBIRICA. β . . .

Differ. spec. Pol. *floribus* cristatis : *racemis* nudis : *caulibus* herbaceis. *Foliis* lanceolatis. Lin. sp. 9.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, 6-pollicaris, sub-erectus, ramosus, teres. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, glabra, alterna. *Flos* spicis brevibus, laxis, axillaribus. *Calyx* foliolis binis lateralibus alaformibus, magnis. *Corolla* albicans, ad viridem declinans : *carina* cristata, appendice penicilliformi. *Stamina* 8, coalita. *Capsula* compressa, obcordata, 2-ocularis, 1-perma.

Habitat inculta Cantone Sinarum. Effet Chinenfis (Lin. sp. 19.) si imberbis.

Polygala multicaulis, angustissimis foliis, floribus carneis. Amm. Ruth pag. 34. n. 44.

† Sp. 2. POLYGALA GLOMERATA. β Tai Kām.

Differ. spec. Pol. *floribus* cristatis, congestis : *foliis* ovato-oblongis : *caule* fruticoso.

Hab. & notæ. *Caulis* perennis, lignosus, erectus, 7-pollicaris, parum ramosus. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, glabra, alterna, *Flos* albus, sessilis, congestus, lateralis. *Calyx* 5-phyllus, compressus : foliolis binis lateralibus lato-falcatis, magnis, florem tegentibus, tribus aliis lanceolatis, parvis, omnibus persistentibus. *Corolla* 3-petala, papilionacea, calyce minor. *Vexillum* nullum. *Ale* 2, turbinatæ, apice rotundatæ, reflexæ. *Carina* simplex, inflexa, alis longior, caudâ bifidâ, longâ, penicilliformi, atergo exterius adnatâ. *Filamenta* 8. filiformia, ascendentiâ, carinæ æqualia, vaginæ tumidæ infidentia. *Anthera* oblongæ stantes. *Germen* compressum, inversè cordatum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* unciniforme. *Capsula* compressa, obcordato-biloba, 2-ocularis, 1-sperma : *feminibus* ovatis, pilosis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

DECANDRIA.

GENUS II. ERYTHRINA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus $\frac{1}{2}$. *Vexillum* longissimum, lanceolatum.
Lin. sy. pl. G. 926.

Sp. I. ERYTHRINA CORALLODENDRUM. « Cây Bông: Thich
dông bì. 卽 Tum yê Xú.

Differ. spec. Er. *foliis* ternatis, inermibus: *caule* arboreo, aculeato.
Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, cortice cinereo, glabro: *aculeis* re-
ctis, brevibus, sparsis: *ramis* sub-ascendentibus. *Folia* 3-nata, spar-
sa. *Foliola* sub-cordata, sub-rotundo-trigona, acuta, integerrima,
glabra, glauca: *petiolis* communi, & propriis longis, inermibus.
Flos coccineus spicis terminalibus, erectis. *Calyx* spatha simplex,
subacuta. *Corollæ* vexillum longissimum, acutum, protensum. *Ale*,
& *carina* quadruplo breviores. *Stamina* 10, vexillo subæqualia,
omnia in unum basi coalita. *Legumen* longum, rectum, teres, to-
rulosum, articulatum, glabrum: *feminibus* oblongo-reniformibus,
8 circiter: capsulâ membranaceâ communi vestitis, a capsulâ exter-
nâ leguminis distinctâ.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ Australi.
Gelala Litorea. Rumph. Amb. l. 3. c. 33. t. 76. *Arbor* fabifera Boa tsin-
kring dicta. Bont. Jav. l. 6. c. 44. pag. 135. fig. ibi.

Virtus. Antifebrilis, Mundificans, Antiputridinosa. Decoctum corticis
valet contra febres intermittentes, sine evacuatione sensibili. Folia
contusa purgant ulcera putrida: profuntque in Odontalgia loco ap-
plicata.

Ufus. Lignum hujus arboris est album, & levissimum, ad ædificia inae-
ptum: aptissimum vero, & ab indigenis præ omnibus quæsitum
ad formandum pulverem pyrium ex ejus carbonibus. Ejus foliis car-
nes involuta diu servantur a putredine, tenerioresque, & lapidiores
redduntur: sicque aviatoribus, prætermittâ coctione, usurpantur.

† Sp. 2. ERYTHRINA FUSCA. « Cây Sơn dông.
Differ. spec. Er. *foliis* ternatis, inermibus, lanceolatis: *carollarum*
vexillis convolutis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis: *cortice* fusco, cannabi-
no: *aculeis* plurimis, brevibus, sparsis: *ramis* diffusis. *Folia* ter-
nata, inermia, sparsa, petiolata: *foliolis* lanceolatis, integerrimis,
glabris. *Flas* fusco-ruber, racemo terminali. *Calyx* sub-bilabiatus,
la-

labiis integris, erectis. *Corolla* vexillum longissimum, obtusum, sub-turbinatum, in tubum convolutum, basi refractum. *Stamina* longa, basi connexa. *Legumen* longum, teres, articulatam, pilosum: *seminibus* oblongis. Porus mellifer supra basim calycis.

Habitat in Cochinchinâ ad ripas fluminum spontanea.

Gelala Aquatica. Rumph. Amb. l. 3. c. 35 t. 78.

GENUS III. ABRUS.

Char. Gener. *Cal.* obsolete 4-lobus: superiore latiore. *Filamenta* 9, basi infimâ connata, dorso hiantia. *Stigma* obtusum. *Sem.* sphaerica. Lin. sy. pl. G. 924.

Sp. 1. ABRUS PRECATORIUS. a Cam thao do hôt.

Differ. spec. Abr. *foliis* abrupto-pinnatis: *pinnis* numerosis, obtusis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, multiplex, longus, ramosus. *Folia* abruptè pinnata, sparsa, petiolo longo: *foliis* oppositis, ovato-oblongis, glabris, sub-12-jugis. *Flos* purpurascens, ipicis lateralibus. *Legumen* compressum, breve, glabrum, rostratum: *seminibus* 3-4, ovatis, nitidè coccineis, maculâ laterali nigerrimâ: durissima, non edulia.

Habitat in dumetis, & sepibus Cochinchinæ.

Abrus frutex, Zaga. Rumph. Amb. l. 7. c. 31. tab. 32. Phaseolus Indicus ruber. Bont. Jav. l. 6. c. 44. pag. 136. fig. ibi. Orobis Indicus Abrus Alpini dictus, fructu coccineo, macula nigrâ notato. Burm. Zeyl. p. 177.

GENUS IV. GENISTA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: $\frac{2}{7}$. *Vexillum* oblongum a pistillo, staminibusque deorsum reflexum. Lin. sy. pl. G. 930.

† Sp. 1. GENISTA SCANDENS. a Cày Gieng gieng.

Differ. spec. Gen. *spinis* simplicibus: *caule* scandente: *foliis* 2-pinnatis.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus, caule scandente, longissimo, tereti, ramoso: *spinis* multis, simplicibus, brevibus, sparsis, recurvis. *Folia* bipinnata: *foliis* ovatis, integerrimis, oppositis. *Flos* flavus: *calyce* concolore, sub-bilabiato, 5-fido: *racemis* magnis, laxis, terminalibus, pendulis. *Corolla* papilionacea, vexillo oblongo, reflexo. *Stamina* 10, omnia coalita. *Legumen* sub-rotundum, compressum, glabrum: *semine* 1, magno, compresso.

Habitat

Habitat in Cochinchinâ prope ripas fluminum, arundinum Indicarum, & majorum arborum ad summitatem usque pertingens. Abundantiâ, magnitudine, & aureo florum colore jucundum spectaculum præbet transeuntibus.

GENUS V. LUPINUS.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus. *Antheræ* 5 oblongæ, 5 sub-rotundæ; *Legumen* coriaceum. Lin. fy. pl. G. 939

† Spec. 1. LUPINUS COCHINCHINENSIS. α Cay Luc lac. . N. . .
Differ. spec. Lup. *foliis* simplicibus, ovalibus: *floribus* spicatis, terminalibus: *calycibus* appendiculatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sub-teres, rectus, striatus, 2-pedalis: *ramis* ascendentibus. *Folia* simplicia, ovalia, emarginata, glabra, albicantia, alterna. *Flos* luteus, terminalis, spicatus: *calycibus* appendiculatis: labio superiore 2-fido: inferiore 3-dentato. *Stamina* 10, connata: *antheris* 5 oblongis, 5 aliis alternis sub-rotundis. *Legumen* oblongum, turgidum, obtusè 3-gonum, caudatum, glabrum, polyspermum: *feminibus* orbiculatis, uncinatis. Habitat agrestis in Cochinchinâ. Idem a me visus in Bengalâ.

† Sp. 2. LUPINUS AFRICANUS. γ. . .
Differ. spec. Lup. *foliis* lanceolatis, 3-natis: *caule* fruticoso, diffuso: *pedunculis* polyfloris, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, ramis diffusis. *Folia* ternata, lanceolata, glabra, petiolis alternis. *Flos* luteus, pedunculis terminalibus, polyfloris. *Calyx* appendiculatus, 5-fidus. *Corolla*, *Stamina*, & *Legumina* generis propria. Habitat agrestis in orâ Orientali Africa.

GENUS VI. ANTHYLLIS.

Char. Gener. *Cal.* ventricosus. *Legumen* sub-rotundum, testum. Lin. fy. pl. G. 936.

† Sp. 1. ANTHYLLIS INDICA. α Cay Kâoc sât.
Differ. spec. Ant. fruticosa, *foliis* pinnatis, æqualibus, glabris: *racemis* oblongis, sub-terminalibus.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus, caule erecto, *ramis* scandentibus, inermibus. *Folia* impari-pinnata: *foliolis* ovatis, integerrimis, glabris, sub-æqualibus. *Flos* albus, racemis oblongis, multis, sub-terminalibus. *Calyx* ventricosus, 5-dentatus, ruber, persistens. *Filamen-*

menta 10, omnia connata. Legumen breve, 2-spermum: *seminibus*, reniformibus

Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS VII. ARACHIS.

Char. Gener. *Cel.* bilabiatus. *Cor.* supinata. *Filamenta* connexa. *Legum.* gibbum, torulosum, venosum, coriaceum. Lin. sy. pl. G. 937.

Sp. I. ARACHIS ASIATICA. 2. Cây đậu phụng.

Differ. spec. Ar. *foliis* pinnatis, pilosis: *stipulis* bifidis: *floribus* congestis: *folliculis* 3-4-spermis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, multiplex, teres, pilosissimus, rufescens, sub-erectus, ramis diffusis procumbentibus. *Folia* sparsa, periolata, abruptè pinnata, 2-juga: *foliolis* ovatis, pilosis, integerrimis: *petiolis* brevibus. *Stipula* acutæ, bifidæ, oppositæ, semi-amplexicaules. *Fls* aureus, congestus, axillaris: *pedunculis* tenuibus, longissimis, 1-floris. *Flores* masculi multi, commixti hermaphroditis. *Calyx* bilabiatus: labio superiore ovato, 3-fido: inferiore subulato, integro, incurvo, longiore. *Corolla* papilionacea, resupinata: *vexillo* latissimo, obtuso, emarginato, expanso: *alis* brevioribus, ovatis, conniventibus: *carinâ* falcata, *alis* brevioribus. *Filamenta* 10, omnia in vaginam connata, ad angulum rectum assurgentia: *antheris* 5 oblongis, 5 aliis alternis subrotundis. *Germen* (hermaphroditum) oblongum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus: *stigmatibus* simplicibus. *Pericarpium* supra terram nullum: sub terrâ folliculus, oblongus, obtusus, reticulatus, torulosus, evalvis, 3-4-spermus, e germine floris in maturefcentiâ, reclinato pedunculo, terram perforante enatus. *Semina* ovata, sæpe obliquè truncata.

Habitat culta abundantissimè in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Chamaelatus Japonica. Rumph. l. 9. c. 54. tab. 156. fig. 2.

Senna tetraphylla, s. absi congener hirsuta, Maderaspatensis, folliculos sub terrâ condens. Pluk. Almag. 341. tab. 60. fig. 2.

Usus. Hæc semina leviter tosta lapida fiunt, & variis tragematibus misceri solent amygdalas suppletura. Oleo tenui, limpido scitent, lucernis aptissimo, communis usus in Cochinchinâ. Ad frigida ædulia etiam adhibetur, quamvis præstantiâ saporis cedat oleo olivarum.

† Sp. 2. ARACHIS AFRICANA. 7

Differ. spec. Ar. *foliis* pinnatis, glabris: *stipulis* integris: *folliculis* 2-3-spermis.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, longus, procumbens, ramosus. *Folia* abruptè-pinnata, 2-juga: foliolis ovatis, glabris. *Flos* aureus, plerumque geminus, axillaris, pedunculis brevioribus: *floribus* masculis cum hermaphroditis sparsis. *Corollæ* alæ, & *carina* vexillo triplo minores. *Folliculus* evalvis, torulosus, reticulatus, 2-3-spermus, subterraneus. *Stipule* subulatae, integre, oppositæ ad basim petiolorum.

Habitat in variis locis Africæ Orientalis. Per me in Lusitaniam delata floruit, & fructificavit, sed ita debilis, ut tertio anno semina non amplius germinarent. Nullibi vidi Pericarpium in valvas aperriri.

Observ. Hæc species a præcedente non admodum differt, nec qualemcunque differentiam a me notatam apud Auctores invenio, fortasse, quia Africanam non viderunt. A Linnæo indiscriminatim vocantur *Arachis Hypogæa*.

GENUS VIII. ASPALATHUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus: laciniâ superiore maiore. *Legum.* ovatum; muticum, sub-dispermum. Lin. sy. pl. G. 931.

† Sp. 1. ASPALATHUS ARBOREA. α Cây Kúa gà.

Differ. spec. Asp. *foliis* pinnato-quinatis: *racemis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor* medioeris: trunco recto, elato; *ramis* debilibus, reclinatis. *Folia* impari-pinnata, 2-juga: *foliolis* ovatis, integerrimis, glabris, sessilibus, inferioribus minoribus. *Flos* albus, parvus, racemis compositis, terminalibus: *calyce* 5-fido, patente, laciniâ superiore maiore. *Corolla* vexillo obcordato, latiusculo, ascendente: alis oblongis, vexillo æqualibus. *Stamina* omnia connata, corollâ breviora. *Stigma* obrulum, sessile. *Legumen* oblongo-ovatum, compressum, muticum, sub-dispermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Differt ab *Aspalatho Indicâ*; quæ pedunculos habet unifloros, axillares; nec in arborem assurgit.

GENUS IX. PTEROCARPUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus. *Caps.* falcata, foliacea, variegata. *Sem.* aliquot, solitaria. Lin. sy. pl. G. 925.

† Sp. 1. PTEROCARPUS FLAVUS. β Hâm pè mố. α Hôyah.

Differ. spec. Pter. *foliis* pinnatis, sub-trijugis: *spicis* lateralibus; *corollis* dentatis.

1432 **DIABELPHIA. DECANDRIA.**

Hab. & nota: *Arbor* magna: ramis ascendentibus; inermibus: cortice glabro, intus succoso, flavo, amaro. *Folia* impari-pinnata sub-trijuga: foliolis ovatis, acutis, integerrimis. *Flos* flavus, spiculis lateralibus, brevibus. *Corolla* papilionacea, vexillo dentato, reflexo. *Legumen* breve, compressum, glabrum: cortice crasso, duro, vix dehiscente, inæquali: *seminibus* 2-3, compresso-rotundis.

Habitat in sylvis Sinensibus.

Malaparius. Rumph. Amb. I. 5. c. 32. tab. 117.

Observ. Quamvis hæc plantâ frequenter usus sum in praxi Medicâ, florem non vidi, nisi pictum, & descriptum in herbariis Sinensibus, & Rumphiano, unde existimo Pterocarpi speciem esse.

Virtus: corticis. Resolvens, Vulséraria. Rumphius scribit prodesse in Paralyâ, quod experientia nondum probavi.

Usus. Decocto corticis tinguntur ferica colore flavo permanente, nec injucundo.

† **GENUS X. DERRIS.**

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, coloratum, margine 5-crenato, erecto.

Cor. Petala 4, papilionacea, longitudine sub-æqualia: vexillo ovato: alis oblongis: carinâ lunatâ: omnibus basi falcatis, unguibus filiformibus infistentibus.

Stam. Filamenta 10, omnia connata in vaginam, æqualia, brevia.

Antheræ didymæ lobis rotundis.

Pist. Germen oblongum, compressum. Stylus æqualis straminibus. Stigma simplex.

Peric. Legumen oblongum, obtusum, compressissimum, membranaceum, leve, monospermum.

Sem. Oblongum, planum.

Nom. (*Δεppis* membrana) a legumine membranaceo.

Char. Gener. Cal. 5-crenatus, coloratus. Petala unguibus filiformibus. Legum. oblongum, membranaceum.

† Sp. 1. **DERRIS-PINNATA.** Cham bi-ân tsiân.

Differ. spec. Der. scandens, foliis pinnatis: pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab. Frutex scandens, caule longo, inermi, ramosissimo. Folia alternatim pinnata, multijuga: foliolis ovato-oblongis, basi rhombicis, parvis, glabris, integerrimis. Flos albus, pedunculis polyfloris, lateralibus. Legum. 1-spermum. Ha-

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Usus. Radix carnosâ, rubescens supplet defectum fructus Arecæ, quæ simul cum folio aromatico Piperis Betle assidue masticatur ab indigenis, ut suavem halitum, & rubedinem oris conciliet.

† Sp. 2. DERRIS TRIFOLIATA. *β.* Sãn leão tâu.

Differ. spec. Derr. scandens, *foliis* ternatis: *racemis* longis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, ramosus, inermis: *radice* longâ, multiplici, carnosâ. *Folia* 3-nata, ovato-lanceolata, integerrima, glabra. *Flos* albus, racemis longis axillaribus: *calyce* concolore, leviter 4-dentato. *Corollæ* petala longitudine æqualia, basi falcata, unguiculata. *Stamina* omnia connexa, æqualia. *Legumen* 2-3-spermum, oblongum, rectum, compressum, membranaceum? maturum non vidi.

Habitat in sylvis provinciæ Cantonienfis Sinarum.

GENUS XI. CROTOLARIA.

Char. Gener. *Legumen* turgidum, inflatum, pedicellatum. *Filamenta* connata cum fissurâ dorsali. Lin. sy. pl. G. 934.

† Sp. 1. CROTOLARIA HEPTAPHYLLA. *α*

Differ. spec. Crot. *foliis* septemnatis: *spicis* longis: *caule* arboreo;

Hab., & notæ. *Arbor* 10-pedalis, ramis diffusis. *Folia* impari-pinnata, 3-juga: *foliolis* ovato-oblongis, venosis, sub-tomentosis, petiolis brevibus. *Flos* albus, axillaris, & terminalis, spicis simplicibus, longis, solitariis. *Calyx* 5-dentatus, villosus, brevis. *Corollæ vexillum* emarginatum, assurgens: *alæ* oblongæ, vexilli dimidiæ: *carina* inflexa, alis brevior. *Stamina* omnia connata. *Legumen* pedicellatum, turgidum, villosum; inæquale: *seminibus* paucis, sub-rotundis.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

† Sp. 2. CROTOLARIA SCANDENS. *α* Cay Hay.

Differ. spec. Crot. *foliis* oblongis: *pedunculis* polyfloris, axillaribus: *caule* fruticoso, scandente.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus, ramis longis, lignosis, scandentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata. *Flos* albus, axillaris, pedunculis polyfloris: *corollâ* papilionaceâ, petalis sub-æqualibus, patentibus: *calycibus* glabris: *Staminibus* omnibus connexis. *Legumen* turgidum, utrinque acuminatum: *seminibus* paucis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XII. PHASEOLUS.

Char. Gener. *Carina* cum *staminibus*, *styloque* spiraliter tortis. Lin. sy pl. G. 940.

Sp. 1. PHASEOLUS VULGARIS. α Đậu tằm, tau.

Differ. spec. Phas. *caule* volubili: *floribus* racemosis, geminis, *bracteis* calyce minoribus: *leguminibus* pendulis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, volubilis, 8-pedalis, simplicissimus. *Folia* 3-nata, acuminata, basi rotundata, aspera, petiolis longis. *Flos* albus, axillaris, racemis geminis, vel etiam petiolis simpliciter geminis: *bracteis* calyce maioribus. *Legumen* longum, sub-curvum, sub-compressum, glabrum: *seminibus* multis reniformibus, albis.

Habitat raro in Cochinchinâ, non indigena.

Thunb. Jap. pag. 278. Smilax hortensis, sive Phaseolus maior. Bauh. Pin. pag. 339. n. 1.

Sp. 2. PHASEOLUS LUNATUS. α Đậu dai.

Differ. spec. Phas. *caule* volubili: *leguminibus* acinaciformibus, *sub-lunatis*, lævibus. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, volubilis, 10, aut ultra pedes longus, ramosus. *Folia* 3-nata, lævia, acuta, inæqualia. *Pedunculi* polyflori. *Flos* luteus, vexillo patente, viridi, calyci concolore. *Carina*, & *stamina* spiraliter contorta. *Legumen* compressum, latum, sub-curvum, acuminatum, glabrum: *seminibus* orbiculato-reniformibus, nitidis, nigris, albo striatis, magnis.

Habitat cultus in Cochinchinâ. Quamvis esculentus, ob pulchritudinem seminum pluris habetur, quam ob saporem.

Burm. Ind. pag. 157.

† Sp. 3. PHASEOLUS TUBEROSUS. α Đậu sắn rắng.

Differ. spec. Phas. *caute* scandente: *vexillo* revoluto: radice tuberosa, fasciculatâ.

Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, longus, ramosus: *stipulis* bicornibus, acutis, expansis: *foliis* 3-natis, magnis: *floribus* integrè luteis, racemosis, subterminalibus. *Calyx* 4-fidus, laciniis longitudine æqualibus, summâ obtusâ, emarginatâ. *Corollæ* vexillum revolutum. *Stamina*, & *carina* spiralia. *Legumina* sub-compressa, longa, non edulia. Radix tuberosa, fasciculata, magna, esculenta.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Sp.

† Sp. 4. PHASEOLUS TUNKINENSIS. α Đậu kê bắc.

Differ. spec. Phas. *Caule* volubili, ramosissimo: *foliolis*, conicis, parvis, crassis: *vexillo* revoluto, calyci concolore.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, volubilis, brevis, ramosissimus. *Folia* 3-nata, conica, parva, crassa, glabra, plana. *Flos* albus, racemosus, axillaris: *vexillo* revoluto, calyci viridi concolore. *Carina* cum staminibus spiraliter contorta. *Legumen* sub-lunatum, compressum, læve, pendulum, 3-spermum: *seminibus* ovatis, pallidis, rubro variegatis, edulibus.

Habitat cultus in Cochinchinâ, ab Tunkino oriundus.

Sp. 5. PHASEOLUS RADIATUS. α Đậu Xanh: lục dâ, β Liu téu.

Differ. spec. Phas. *Caule* erecto, tereti: *floribus* capitatis: *leguminibus* cylindricis horizontalibus. Lin. sp. 11.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 2-pedalis, sub-teres, sulcatus, pilosus, ramosus. *Folia* 3-nata, lato-lanceolata, pilosa, stipulis geminis, acutis, petiolis longis. *Flos* fusco-luteus, capitatus, axillaris, pedunculo communi longo, erecto. *Cal.* 4-fidus, acutus, æqualis, lacinia summa emarginatâ. *Corollæ vexillum* magnum, sub-rotundum, patens, apice plicato, emarginato. *Alæ* breviores, lato-falcatae, lobo conico, inflato, exterius prominente. *Carina* falcata, simul cum staminibus spiraliter contorta, media longitudine inter vexillum, & alas. *Legumen* lineare, teres, rectum, acuminatum, pilosum, fuscum, polyspermum, horizontale: *seminibus* viridi-luteis, ovatis, parvis, omnium phaseolorum saluberrimis, nec palato ingratis.

Habitat, & colitur abundanter in Cochinchinâ, & Chinâ.

Phaseolus Minimus. Rumph. Amb. l. 9. c. 30. tab. 139. fig. 2. Phaseolus Zeylanicus, siliquis radiatum digestis. Burm. Zeyl. pag. 192.

Virt. Semen. Resolvens, Diuretica. Prodest in Hydrope, Cephalgiâ, visus debilitate.

Sp. 6. PHASEOLUS MUNGO. α Đậu mông. β Sião téu: Thiâm téu.

Differ. spec. Phas. *Caule* flexuoso, tereti, hirsuto: *leguminibus* capitatis, hirsutis. Lin. sp. 13.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, flexuosus, erectus, teres, hispidus, ramosus. *Folia* 3-nata, sub-rotunda, utrinque sub-acuta, pillosa, mollia, flavo-viridia: *stipulis* 2-fidis, acutis, medio adnatis, ciliatis. *Flos* flavus, axillaris, pedunculo communi petiolis sub-æquali, desinente in capitulum 3-4-florum. *Calyx* 5-fidus, suffultus stipulis geminis, incurvis, inflexis, calyce longioribus. *Carina* ab uno latere corniculum tubulosum exerens, quo unam ex alis

re-

removet: alá alterá cum ipsá cariná, & staminibus in spiram contortis. *Legumen* teres, tenue, longiusculum, acuminatum, pilosum; *feminibus* multis, sub-ovatis fusco-viridibus, esulentis. Habitat in Cochinchiná, & Chiná in agris cultus. Mungo. Garc. Arom. l. 2. c. 21. Phaseolus hirsutus, flexicaulis, Mungo affinis Maderaspatanus, caule tereti. Pluk. Almag. 290.

GENUS XIII. DOLICHOS.

Char. Gener. *Vexilli* basis callis duobus, parallelis, olongis, alas fubrus comprimentibus. Lin. fy. pl. G. 941.

Sp. 1. DOLICHOS SINENSIS. α Đậu dua β Táu cõ: Táu cõ.
Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* pendulis, cylindricis, torulosis: *pedunculis* erectis, multifloris. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, longus, teres, tenuis, volubilis, subramosus. *Folia* ternata, lato-lanceolata, glabra: stipulis lanceolatis binis, ternisve ab basim petioli communis. *Flos* albo-violaceus, pedunculis paucifloris, sub-erectis, axillaribus: *vexillo* ascendente, obtusissimo, emarginato, callis binis ad basim exertis. *Stylus* sub-teres, superius pilosus. *Legumen* lineare, longissimum, 1-2 pedale, sub-teres, torulosum, glabrum, pendulum: *feminibus* oblongo-reniformibus, pallidis, multis.

Habitat cultus ubique in Cochinchiná, & Chiná.

Rumph. Amb. l. 9. c. 22. tab. 134. Burm. Ind. pag. 158.

Ufus. Legumina ista sunt salubria, & sapida, maximè recentia.

Observ. Existimo Dol. sesquipedalem (Lin. sp. 7.) specie non differre: certè notæ omnes ibi expositæ utrique æqualiter conveniunt, si locum natalem excipias, quod non est curandum.

Sp. 2. DOLICHOS UNGUICULATUS. β

Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* capitatis, sub-cylindricis: *apice* recurvo, concavo. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, volubilis, glaber, mediocris, parum ramosus. *Folia* ternata, acuta, glabra: stipulis medio adnatis, utrinque acutis. *Flos* axillaris, pedunculo longo, crasso, striato, patente, sæpe bipartito: capitulis paucifloris. *Corolla* albo, luteo, & violaceo variegata: *vexillo* lato, rotundato, emarginato, ascendente, callis binis parallelis, curvis, alas deprimentibus. *Alæ*, & *carina* obtusæ, conniventes, unguiculatæ, sub-æquales. *Stamina* Diadelphica, ascendentia, vaginâ longâ: *antheris* ovatis, stantibus. *Stylus* teres, superius barbatus: *stigmatibus* crassiusculo, glabro. *Legumen* longum, sub-teres, subarcuatum, torulosum, pendulum: api-

apice recurvo, concavo. *Semina* ovata, rubra.
 Habitat in Chinâ, unde in Lufitaniam translatus. HOLLIG.
 Thunb. Japon. pag. 279. Rumph. Amb. l. 9. c. 27. tab. 138. *Cacara*
 Nigra.

Usus. *Semina* sunt edulia: sed nec ori, nec stomacho multum grata.

Sp. 3. DOLICHOS ENSIFORMIS. α. Dau 149 & Tào 149. 51
 Differ. spec. Dol. caule sub-erecto: *leguminibus* gladiatis, dorso 3-
 carinatis: *seminibus* arillatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, scandens, longus,
 ramosus, glaber. *Folia* 3-nata; acuta, rugosa, glabra: *stipulis* se-
 taceis, minimis. *Flos* violaceus, pedunculis polyfloris, axillaribus.
Calix tubulosus, bilabiatus: labio superiore 2-fido, inferiore 3-den-
 tato, brevior. Corollæ *vexillum* sub-rotundum, emarginatum, re-
 fractum: callis oblongis ad basim alas prementibus. *Alæ*, & *carina*
 falcatae, vexillo æquales. *Filamenta* Diadelpa, subulata, æqualia,
 ascendentia: *antheris* ovatis, nutantibus. *Germen* oblongum. *Sty-
 lus* filiformis, glaber, æqualis staminibus. *Stigma* parvum, conda-
 vum. *Legumen* magnum, compressum, dorso crassius, 3-hervium,
 ad apicem reflexum, acuminatum, acinaciforme: *seminibus* 5-6
 compresso-ovatis, arillatis, magnis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: coliturque pro umbraculo contra
 solis calorem: cibo minus aptus. Est varietas legumine duplo lon-
 giore, & planiore, foliis obtusioribus, & aliis parvis differentiis,
 quæ ad mutandam speciem non sufficiunt.
 Thunb. Jap. pag. 279. Lobus Machæroides. Rumph. Amb. l. 9. c. 23.
 tab. 135. fig. 1.

Sp. 4. DOLICHOS TETRAGONOLOBUS. α. Dau 149 & Tào 149. 51
 Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* membranaceo-quadrangula-
 tis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, teres, tenuis, scandens, longus,
 ramosus. *Folia* ternata, lato-lanceolata, glabra, pallide viridia:
stipulis lanceolatis, minusculis. *Flos* pallide cæruleus, pedunculis
 lateralibus, longis, paucifloris: *vexillo* sub-rotundo, magno, re-
 fracto, callis binis parallelis alas breviores deprimentibus. *Legu-
 men* crassum, semipedale, a quatuor angulis in longitudinem ex-
 tensum 4 membranas tenues, laceras, connatas. *Semina* 8 circiter,
 sub-ovata.

Habitat, non frequens, in Cochinchinâ, & Chinâ.
 Burm. Ind. pag. 159. Lobus Quadrangularis. Rumph. Amb. l. 9. c. 21.
 tab. 133.

Usus. Recens legumen lapidum inveni sed caput gravatum

Sp. 5. DOLICHOS PRURIENS. α Dày ngĩa.

Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* racemosis: *valvulis* sub-carinatis, hirtis: *pedunculis* ternis. Lin. sp. 9.

Hab. & notæ. *Caulis* suffruticosus, longissimus, teres, ramosus, volubilis, aliquando repens. *Folia* ternata, ovata, sub-obtusa, mollia, pilosa, lætè virentia. *Flos* fusco-violaceus, pedunculis polyfloris, lateralibus, longis, pendulis. *Legumen* 3 pollices longum, compressum, sub-curvum, pilosissimum, polyspermum: *seminibus* 6, ovatis, compressis. Pili ruffi totius plantæ, & præcipuè leguminis, si cutem tangaat, pruritus excitant intolerabilem.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ, omnibus odiosus.

Phaseolus Zeylanicus, lobis undequaque pilosis, fructu lucido, nigro. Burm. Zeyl. pag. 19f. Cacara pruritus. Rumph. Amb. l. 9. cap. 36. tab. 142.

Sp. 6. DOLICHOS ALTISSIMUS. α Dày bán Phu yen.

Differ. spec. Dol. *leguminibus* racemosis, hirtis, æqualibus: *seminibus* hilo cinctis: *foliis* utrinque glabris. Lin. sp. 8.

Hab. & notæ. *Caulis* suffruticosus, perennis, ramosus, longissimus, ad arborum summitatem scandens. *Folia* ternata, sub-rotundo-rhombæa, sub-rugosa, utrinque glabra: stipulis subulatis. *Flos* violaceus, racemis longis, lateralibus: *venis* sub-rotundo, magno, reflexo: callis parallelis alas comprimentibus. *Legumen* oblongum, planum, scabrum, 3-4-spermum: *seminibus* ovatis, compressis, pallidis, hilo cinctis.

Habitat incultus, cultusque in Cochinchinâ.

Cacara perennis. Rumph. Amb. l. 9. c. 25. tab. 136.

Observ. Si caulem perennem excipias, reliquæ notæ hujus plantæ magis conveniunt Dolicho Altissimo, quam Lignoso: huic adscribe, si magis placet, vel potius ex duabus speciebus una fiat.

Ufus. Semina elixa in frequenti usu sunt apud indigenas, quamvis magis satient, quam delectent.

Sp. 7. DOLICHOS PURPUREUS. α Dày bán tí. β Tù piên téu.

Differ. spec. Dol. volubilis, caule glabro: *petiolis* pubescentibus: *corollæ* alis patentibus. Lin. sp. 18.

Hab. & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, rubro-purpureus, hispides, ramosus. *Folia* sub-cordata, acuta, brevina, venis purpureis, 3-nata: *petiolis* pilosis: *stipulis* quaternatis, subulatis. *Flos* lætè purpureus, calyce concolore: *spicis* longis, erectis, terminalibus. *Legum.* 3-pollicare, lato-planum, glabrum, purpurascens: *seminibus* compresso-ovatis, hilo cinctis. *Corollæ* alæ patentis.

Habi-

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 160.

Ufus. Legumina tenera, & recentia sapida sunt, & salubria.

Sp. 8. DOLICHOS ALBUS. α Dâu bán láng. β Pê piên rêu.

Differ. spec. *Dol. Caule* volubili, glabro: *vexillo* latissimo: *legumine* plano, carnofo.

Hab., & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, teres, glaber, albicans; ramosus. *Folia* 3-nata, trigono-rotunda, pubescentia, mollia, pallida: petiolis glabris: stigulis binatis, acutis, brevibus. *Flos* albus, racemis brevibus, sub-terminalibus: *vexillo* latissimo, reflexo, callis binis alas comprimentibus. Legumen 3-pollicare, lato-planum, carnosum, glabrum, dorso tuberculosum, rostratum: feminibus compresso-ovatis, hilo cinctis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ, tenerior, & sapidior præcedente, nec formâ valde differens.

Cacara Alba. Rumph. Amb. l. 9. c. 26. tab. 137.

Sp. 9. DOLICHOS BULBOSUS. α Săn rông.

Differ. spec. *Dol. volubilis*, *foliis* glabris, multangulis, dentatis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, suffruticosus, longus, teres, glaber, ramosus: stipulis nullis. *Folia* sub-rotundo-angulata, 3-nata, acuminata, glabra, petiolata. *Flos* terminalis, racemis longis. *Calyx* Cyathiformis, 4-fidus, laciniâ superiore brevior, emarginatâ. *Corolla* pallidè violacea: *vexillo* ovato, integerrimo, connivente. *Filamenta* Diadelphea, aequalia: *antheris* omnibus ovato-oblongis incumbentibus. *Stylus* longior staminibus, filiformis, sulcatus, glaber: *stignate* crassifuculo, glabro. *Legumen* compressum, lineare, isthmis interceptum, 4 pollices longum, sub-arcuatum. *Radix* tuberibus fasciculatis, sub-rotundis, caudatis, succosis, albis. *Sem.* sub-quadrata, compressa.

Habitat cultus in Cochinchinâ.

Cacara Bulbosa. Rump. Amb. l. 9. c. 20. t. 132. fig. 2. Phascolus

Nervicensis, foliis multangulis, tuberosâ radice. Pluk. Almag. pag. 292. tab. 52. fig. 4.

Ufus. Tuberâ tam cruda, quam cocta esculenta sunt: non autem semina.

Sp. 10. DOLICHOS TRILOBUS. α Săn đai cù: Cai cãn. β Kên cõ.

Differ. spec. *Dol. volubilis*: *foliolis* lateralibus, extrorsum gibbis: intermedio trilobo. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, teres, longissimus, ramo-

mosus, volubilis, vel repens quando terram attingit, hirsutus. *Folia* 3-nata, petiolata, stipulis bicornibus: *foliis* 3-lobatis, acuminatis, pubescentibus. *Flos* purpureus, spicis longis, terminalibus, & lateralibus. *Calyx* 4-fidus, laciniis acutis, inferiore longiore. *Corolla* vexillum lato-ovatum, emarginatum, erectum, patens, maculâ luteâ magnâ in mediâ notatum. *Alæ* oblongæ, vexillo breviores. *Carina* alis longior. *Filamenta* 10, Diadelpa, ascendentia, æqualia, & vaginæ longæ connata: *antheris* omnibus oblongis, incumbentibus. *Germen* lineare, pilosum. *Stylus* ventricosus, æqualis staminibus. *Stigma* sub-rotundum, glabrum, minimum. *Legumen* 4-pollicare, lineare, rectum, compressum, isthmis interceptum: *seminibus* 8 circiter, sub-quadratis, compressis, rufis. *Radix* tuberibus longis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 160. t. 50. fig. 1. Phaseolus Maderaspatanus, foliis glabris, trilobis. Pluk. Almag. pag. 292. t. 214. fig. 3.

Ulus. Tubera radices fasciculata, pauca, 2-pedalia, subteretia, fibroso-carnosa, pallida, edulia sunt cocta, non cruda, nec etiam legumina.

Virtus: radices. Refrigerans, Pellens, Diaphoretica, Antifebrilis. Prodest in omnibus febribus calidis, etiam malignis: in tenesmo, & dysenteria: sitim mitigat, & ebrietatem.

Observ. Dubito an sit eadem planta, de qua Plukenerius, & Burmannus locuti sunt: maximè, quia de tuberibus tacuerunt, quæ in nostrâ sunt valde notabilia magnitudine, & virtute.

† Sp. II. DOLICHOS MONTANUS. α Sãn rãng.

Differ. spec. Dol. *Caulis* fruticoso, scandente: *foliis* ovato-rhombis: *filamentis* 5 *antheris* oblongis: 5 aliis alternis, sub-rotundis.

Habitus, & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, ramosus, scandens: *radice* sub-tuberosâ, fasciculatâ, durâ, macrorrhizâ. *Folia* ternata, foliolis ovato-rhombis, magnis, tomentosis, integris. *Flos* integrè purpureus, spicis longis, lateralibus. *Calyx* 4-fidus, laciniis acutis inferiore longiore. *Corolla* vexillum ovatum, emarginatum, connivens: *alæ* vexillo æquales: *carina* alis brevior. *Stamina* 10, Diadelpa, subulata, ascendentia: 5 alterna longiora, *antheris* oblongis: 5 alia breviora, *antheris* sub-rotundis. *Germen* lineare, rectum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum, glabrum. *Legumen* lineare, rectum, compressum, isthmis interceptum: *seminibus* compressis, sub-orbiculatis.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Observ. Hæc species duabus proximè antecedentibus affinis est, imprimis radice tuberosâ, leguminibus linearibus isthmis interceptis,

stylis, stigmatibusque non pubescentibus. Si Linnaeus binas priores species Dolicho non adjudicasset, aliter de omnibus tribus sentirem: quod indubius discernere non possum, quia nec satis memini, nec in adversariis meis notatum invenio, an in his plantis inveniantur calli illi vexillares, qui Dolichi characterem determinant.

Sp. 12. DOLICHOS BIBLORUS. *Fr. Sān cū.*

Differ. spec. Dol. *Caulis* perenni, lævi: *pedunculis* bifloris: *leguminibus* erectis. Lin. sp. 25.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, sesquipedalis, erectus, ramosus, pilosus. *Radix* tuber ovatum, fuscum. *Folia* liniari-lanceolata, integerrima, venosa, utrinque pubescentia, sub-fessilia. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis 2-floris, erectis: stipulis binis lateralibus, subulatis, longis. *Corollæ* vexillum callis duobus oblongis, parallelis ad basim alas prementibus. *Legumen* hirsutum, coriaceum, inflatum, 2-spermum.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 161. Phascolus vulgaris, Lablab effigie, flore parvo, ochroleuco, siliquis falcatis, gemellis. Pluk. Almag. pag. 291. tab. 213. fig. 4.

Sp. 13. DOLICHOS SOIA. *α. Đậu nanh. β. Hoām téu.*

Differ. spec. Dol. *Caulis* erecto, flexuoso: *racemis* axillaribus erectis: *leguminibus* pendulis, hispidis, sub-dispermis. Lin. sp. 23.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus, sub-rectus, simplex; ramis ascendentibus. *Radix* indivisa, radiculis tuberculosis. *Folia* 3-nata, ovata, sub-acuminata, pilosa, petiolis longis. *Flos* violaceus, axillaris, racemis simplicibus, erectis: *leguminibus* hirsutis, pendulis. *Calyx* tubulosus, 5-fidus, laciniis acutis, binis superioribus brevioribus. *Corollæ* vexillum sub-ovatum, emarginatum, connivens. *Alæ* oblongæ, vexillo breviores, unguibus longis, filiformibus. *Carina* 2-phylla, lato-falcata, unguiculata, minima. *Filamenta* 10, Diadelphia, quorum 9 brevissima, vaginæ longæ, sub-curvæ connata. *Anthere* sub-rotundæ. *Germen* oblongum, hirsutum. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum, glabrum. *Legumen* rectum, sub-compressum, torulosum, hispidum, pendulum: *seminibus* ovatis, lævibus, pallidis, tribus circiter. *Corollæ* parvula, vix calycem superans, callis binis oblongis, ex basi vexilli prodeuntibus, alas premit. Est varietas flore albo, & purpureo distincta, pedunculis brevioribus. Est alia seminibus nigris.

Habitat in Cochinchinâ, & in Chinâ frequenter cultus.

Thunb. Japon. pag. 282. Phascolus erectus, Daidzu. Kaempf. Amæn. pag. 837. fig. 838. Cadelium. Rumph. l. 9. c. 31. fig. 140. Ubi

notandum hanc plantam herbarii Amboinensis a Linnæo citari pro Phaeolo Maximo, cum tam descriptio, quam figura, & usus ad hanc speciem Dolichi Soia omnino pertineant, post-habito tantummodo colore floris, qui in diversis locis non semper idem.

Usus. Hæc semina elixa, aut leviter tosta tam stomacho, quam palato accepta sunt. Ex illis fit celebris muria Japoniensis, Soia dicta, quæ Chineses, & Cochinchinenses frequenter utuntur ad condiendos cibos, & appetitum excitandum. Fit etiam pulmentum candidum, lactis coagulati simile, Sinensibus dictum *Téu hí*, vel *Táu bu*, quo nullus cibus est illis familiarior: & quamvis ex se insipidum, propriis condimentis adhibitis, dat ferculum nec injucundum, nec insalubre.

Sp. 14. DOLICHOS CATIANG.

Differ. spec. Dol. *Caule* erecto: *leguminibus* geminis, linearibus, erectiusculis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, sub-teres, scaber, ramosus. *Folia* 3-nata, lato-lanceolata, glabra, petiolo communi longo: stipulis lanceolatis, minutis. *Flos* sub-terminalis, pedunculo longissimo, 2-3-floro. *Corollæ vexillum* ovatum, patens, callis binis ad basim alas prementibus. *Stamina* Diadelphia. *Stylus* a medio ad apicem superius villosus: *stigmatibus* simplici. *Legumen* lineare, 4-pollices longum, sub-teres, tenue, glabrum, sub-erectum: *seminibus* oblongo-ovatis, sub-compressis, hilo discolore.

Varietas 1. α *Đây đen*. β *Hé téu*. Flore violaceo: semine nigerrimo.

2. α *Đây bạc*. β *Mìn téu*. Flore luteo: semine pallido.

3. α *Đây đỏ*. β *Sào hùm téu*. Flore purpurascente: semine rufo.

Habitant in agris culti in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 161. Phaeolus minor. Rumph. Amb. l. 9. c. 29. tab. 139. fig. I.

Usus. Omnes istæ varietates sunt vulgaris cibus in Indiâ. Virtutem Medicam, quam indigenæ illis attribuunt, satis probatam non habeo, nec judico.

† Sp. 15. DOLICHOS HASTATUS. γ

Differ. spec. Dol. *Caule* procumbente: *foliis* sub-hastatis: *pedunculis* polyfloris, erectis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, procumbens, longus, teres, ramosus. *Folia* sub-hastata, 3-nervia, glabra, 3-nata. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis polyfloris, longis, striatis, erectis. *Corollæ vexillum* patens, callis binis alas comprimentibus. *Legumen* lineare, rectum, sub-teres: *seminibus* ovatis, pallidis, esculentis.

Habitat cultus in orâ Africa Orientali.

GENUS XIV. PISUM.

Char. Gener. *Stylus* triangularis, supra carinatus, pubescens. *Caly-*
cis laciniae superiores 2 breviores. Lin. fy. pl. G. 944

Sp. I. PISUM SATIVUM. α. Đậu tòn. β. . . .

Differ. spec. Pis. *petiolis* teretibus: *stipulis* infernè rotundatis, cre-
natis: *pedunculis* multifloris. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, ramosus, albicans, gla-
ber, scandens, cirrhis terminalibus. *Folia* abruptè pinnata, sub-bi-
juga: foliolis ovalibus, glabris, petiolis teretibus: *stipulis* cauli-
nis, perfoliatis, magnis, rotundatis, crenatis. *Flos* albus, lateralis
pedunculis paucifloris, longis. *Legumen* bi-pollicare, rectum, sub-
teres, glabrum: *seminibus* globosis, subsenis, edulibus.

Habitat in Chinà, & Cochinchinà, non frequens, nec fortasse indi-
gena.

Thunb. Japon. pag. 283. Hill. Brit. herb. pag. 279. tab. 40. fig. 2.

GENUS XV. VICIA.

Char. Gener. *Stigma* latere inferiore transversè barbatum. Lin. fy. pl.
G. 947.

Sp. I. VICIA FABAE. β. Sàm têu. α. Tàm dàu.

Differ. spec. Vic. *caule* erecto: *petiolis* absque cirrhis. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 2-pedalis, crassus, angula-
tus, ramosus. *Folia* impari-pinnata, sub-trijuga, foliolis ovato-ob-
longis, tomentosis: cirrhis nullis. *Flos* axillaris, polynatus, albus,
maculà nigrà distinctus. *Legumen* crassam, sub-teres, rectum,
acuminatum, tomentosum, polyspermum: *seminibus* ovatis, com-
pressis, magnis, edulibus.

Habitat culta in Chinà, rarò in Cochinchinà.

Thunb. Japon. pag. 284. Faba vulgaris, fructu minore. Hill. Brit.
herb. pag. 286. tab. 41. fig. 6.

GENUS XVI. PSORALEA.

Char. Gener. *Calyx* punctis callosis adspersus, longitudine *leguminis*
1-spermi. Lin. fy. pl. G. 967.

† Sp. I. PSORALEA SCUTELLATA. α. Cây Nénh hoa tím.

Differ. spec. Flor. *anborea*, *foliis* pinnatis: *calycibus* scutellatis: spi-
cis congestis.

Hab.;

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis longis, reclinatis. *Folia* imparipinnata, multi-juga: *foliis* ovatis, acuminatis, integerrimis, glabris, costis multis obliquis, parallelis. *Flos* violaceus, spicis congestis, sub-terminalibus. *Calyx* scutellæformis, truncatus, brevis, crassus, excrecentiis albis, glandulosis conspersus. *Corolla* papilionacea, *vexillo* sub-rotundo, patente: *alis*, & *carinâ* brevioribus. *Stamina* 10, Diadelpa. *Legumen* breve, compressum, acuminatum; 1-2-spermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 2. PSORALEA RUBESCENS. α Nénh hoa đò.

Differ. spec. *Pfor. arborea*, *foliis* pinnatis: *pedunculis* polyfloris, lateralibus: *calycibus* sub-truncatis, biglandulosis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus. *Folia* pinnata, oblongo-ovata. *Flos* lateralis, albo-ruber, pedunculis polyfloris. *Calyx* sub-truncatus, tuberculosis: glandulis binis, viscosis ad basin suffultus. *Corolla* papilionacea. *Stamina* Diadelpa. *Legumen* compressum, acuminatum; 1-spermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XVII. TRIFOLIUM.

Char. Gener. *Florcs* sub-capitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. Lin. sy. pl. G. 968.

Sp. 1. TRIFOLIUM MEL. INDICA. β Sam pa lim.

Differ. spec. *Trif. leguminibus* racemosis, nudis, monospermis: *caule* erecto. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres, ramis diffusis. *Folia* 3-nata, ovata, integerrima. *Flos* purpureus, terminalis, racemis brevibus. *Legumen* lanceolato-ovatum, compressum, 1-spermum, nudum.

Habitat in agris Cantonensibus.

Burm. Ind. pag. 172.

Sp. 2. TRIFOLIUM GLOBOSUM. β Tsin li quong.

Differ. spec. *Trif. capitulis* villosis, globosis: *calycibus* superioribus flosculo destitutis. Lin. sp. 16.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, sub-erectus, ramosus.

Folia 3-nata, oblonga. *Flos* pallidus, axillaris, & terminalis: capitulo globoso, villis albis plurimis circumdato, calycibus superioribus apetalis, nec fertilibus. *Legumina* ovata, 1-sperma.

Habitat in agris prope Cantonem Sinarum.

Tri-

Trifolium Orientale, capitulo lanuginoso. Tournef. Cor. 27.

- † Sp. 3. TRIFOLIUM. CUSPIDATUM. α Cay chia br.
 Differ. spec. Trif. *pedunculis* sub-capitatis: *leguminibus* 1-spermis ;
 nudis: *foliis* linearibus, cuspidatis.
 Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, 4-pedalis, hirsutus, erectus, ramis ascendentibus. *Folia* 3-nata, linearia, integerrima, cuspidate acuta apice rotundato accrescente. *Flos* albus, lateralis, pedunculis paucifloris, sub-capitatis: *calycibus* pilosis: *corollæ* vexillo ovato, maculâ purpureâ distincto. *Legumen* nudum, monospermum.
 Habitat agreste in Cochinchinâ.

- † Sp. 4. TRIFOLIUM VOLUBILE. γ
 Differ. spec. Trif. *pedunculis* polyfloris, axillaribus: *leguminibus* bispermis, nudis: *caule* volubili.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, tenuis, teres, longus, procumbens; sæpe volubilis. *Folia* 3-nata, sub-rotunda, integerrima, tomentosa. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis polyfloris. *Legumen* oblongum, acutum, nudum, glabrum, 2-spermum.
 Habitat ad litora Africæ Orientalis.

GENUS XVIII. GLYCYRRHIZA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: $\frac{1}{2}$. *Legumen* ovatum, compressum. Lin. sy. pl. G. 955.

Sp. 1. GLYCYRRHIZA ECHINATA. β Fu châu cãn tsào. α Cãm thao.

Differ. spec. Glyc. *leguminibus* echinatis: *foliis* stipulatis, *foliolo* impari sessili. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 5-pedalis, erectus, teres, glaber, inermis, pallidè virens: *ramis* multis patentibus: *radice* longissimâ, tereti, repente, intus luteâ, succosâ, foris fusco-rufâ, sapore dulci. *Folia* impari-pinnata, sub-quadrifuga: *foliis* lanceolato-ovatis, integerrimis, impari sessili: *stipulis* subulatis. *Flos* purpurascens, axillaris, spicis capitatis, sub-rotundis: *pedunculo* communi longo, erecto. *Calyx* bilabiatus, labio inferiore lineari, indiviso. *Corolla* papilionacea, *vexillo* acuto: *alis*, & *carinâ* brevioribus. *Stamina* Diadelphia. *Legumen* oblongum, compressum, echinato-scabrum: *seminibus* reniformibus, fulcis, paucis.

Habitat in provinciis Borealibus imperii Chinenfis.

Glycyrrhiza capite echinato. Bauh. Pin. pag. 352. n. 1. Glycyrrhiza sitiquis conglobatis, echinatis. Hill. Brit. herb. pag. 288. tab. 41. fig. 8.

Sp. 2. GLYCYRRHIZA GLABRA. α Fán chàu càn tsáo. α Cam thao.
Differ. spec. *Glyc. leguminibus* glabris: *stipulis* nullis: *foliolo* impari petiolato. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 4-pedalis, erectus, teres, glaber, parum ramosus: radice longâ, tereti, luteâ: dulci. *Folia* lanceolata-ro-ovata, pinnata, cum impari petiolato: stipulis nullis. *Flos* albo-purpureus lateralis, spicis oblongis, pedunculo communi longo, erecto. *Legumen* oblongum, læve, compressum: feminibus paucis. Habitat agrestis, cultaque in variis locis imperii Chinesis.

Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica. Bauh. Pin. pag. 352. n. 1. Glycyrrhiza vulgaris, siliquis glabris. Hill. Brit. herb. pag. 287. tab. 41. fig. 7.

Virtus: radicis utriusque speciei. Edulcorans, Pectoralis. Valet in Tussi, Asthmate, Rheumatismo, Stranguriâ. Faucium asperitatem, sitim, & famem mitigant pastilli ex Glycyrrhizæ, & argillæ albæ (indigenis dictæ Hoät thach) æqualibus partibus confecti, quos dum itinerantes ore volvunt, contra illa incommoda levamen sentiunt.

GENUS XIX. ÆSCHYNOMENE.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus. *Legumen* articulis truncatis, monospermis. Lin. sy. pl. G. 960.

† Sp. 1. ÆSCHYNOMENE HETEROPHYLLA. α Cây bot múoi.
Differ. spec. *Æsch. caule* fruticoso: *foliis* inferioribus 3-natis, ovatis: superioribus pinnatis, sub-rotundis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, debilis, 8-pedalis: ramis patentibus, tomentosus. *Folia* inferiora 3-nata, ovata, petiolata: superiora impari-pinnata, foliolis sub-rotundis, sessilibus. *Flos* albus, parvus, axillaris, pedunculis polyfloris. *Calyx* 4-dentatus. *Corollæ* papilionaceæ *carina* ovata, alis longior, vexillo brevior. *Stamina* 10, omnia in unum coalita. *Legumen* lineare, compressum, pilosum, articulis multis truncatis, cordatis: feminibus reniformibus.

Habitat inculta in viâ Nhà bô Cochinchinæ Borealis.

Observ. *Legumen*, & *Corolla* ad Æschynomenem pertinent: non ita *Calyx*, & *Stamina*.

† Sp. 2. ÆSCHYNOMENE LAGENARIA. α Cây dien dien.
Differ. spec. *Æsch. herbacea*, *foliolis* obtusis, plurimi-jugis: *leguminibus* muricatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, crassus, teres, spon-

spongiosus: ramis plurimis brevissimis, patentibus. Folia imparipinnata, plurimi-juga: foliolis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis, glabris, minutulis. Flos luteus, pedunculis lateralibus, polyfloris. Calyx bilabiatus: labio superiore obtuso, emarginato, refracto: inferiore 3-fido, laciniis acutis, sub-æqualibus. Corollæ papilionaceæ vexillum ovarum, integrum, ascendens. Ala oblongæ, vexillo breviores. Carina lunata, æqualis vexillo. Filamenta Diadelpha, filiformia, adnata vaginæ versus carinam fissæ. Antheræ ovatæ incumbentes. Germen lineare, compressum, rectum. Stylus subulatus, æqualis staminibus. Stigma simplex. Pericarpium Legumen longum, rectum, strictum, compressum, muricatum, articulatum, articulis truncatis, longiusculis, deciduis. Semina compressa, reniformia.

Habitat in paludibus, & locis cænosis, aquosisque in Cochinchina.

Ufus. Caulis spongiosus, & faciliè cedens, ac elasticè resiliens commode aptatur ad obrurandas lagenas, defectu suberis, quo regio illa caret.

Obsèrv. Rarè accidit, ut vagina staminum versus carinam fissâ inveniatur, cum potius versus vexillum findi soleat. Hoc tamen jam notaverat Linnæus in Bauhinia Divaricatâ, & Acuminatâ, licet contrarium ac in Papilionaceis fieri contingat. Gen. pl. ed. 6. pag. 205. n. 511, & sy. pl. vol. 2. pag. 248.

GENUS XX. HEDYSARUM.

Char. Gener. Cor. carina transversè obtusa. Legumen articulis monopermis. Lin. sy. pl. G. 961.

Sp. 1. HEDYSARUM RENIFORME. β Lò iim tsào.

Differ. spec. Hed. foliis simplicibus, reniformibus: caule tereti. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. Cautis annuus, sesquipedalis, ramosus, teres, tenuis, glaber, procumbens. Folia pauca, transversè ovata, sub-reniformia, integerrima, glabra, sparsa, folitaria, suprema ternata, petiolis longis, filiformibus. Flos violaceus, spicis terminalibus, paucifloris. Calyx 5-fidus, pilosus, connivens. Corollæ vexillum latum, obtusissimum. Legumen tenue, articulis 6, refracto-plicatis, lævibus, 1-spermis.

Habitat suburbia Cantonis Sinarum.

Burm. Ind. pag. 164. tab. 52. fig. 1.

† Sp. 2. HEDYSARUM VESPERTILIONIS. α Cáy hó diep.

Differ. spec. Hed. foliis simplicibus, lunatis: lobis retrofalcatis: racemo

cemo terminali : *leguminibus* retrofractis, in calyce inflato inclusis. Lin. Jun. supplement. pl. pag. 331.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 4-pedalis, erectus, rectissimus, subsimplicissimus, teres, ad apicem quadrangus, sulcatus, subtiliter hispídus, sæpe uno, vel duobus ramulis, brevibus, erectis. *Folia* subulnata, 4 lineas longa, 2 pollices lata, in formam arcus sagittarii curvata, apice retusa, 3-nervia, reticulato-venosa, glabra, luteo, rubro, & viridi varicolora : *petiolis* longis, rectis, gracilibus, trifariam alternis : stipulis binis, acutis, minutis. *Flos* albus, spicâ simplici, longâ, erectâ, terminali. *Calyx* 5-fidus, pilosus : laciniis tribus inferioribus sub-longioribus, omnibus acuminatis, dorso carinatis, persistentibus. *Corollæ* papilionaceæ *vexillum* lato-cordatum, connivens, calyce paulo longius : *alæ* oblongæ, incurvæ, & vexillo breviores : *carina* media longitudine inter alas, & vexillum. *Filamenta* Diadelphea, simplicia, & novem-fida, corollâ breviora : *antheris* simplicibus, sub-rotundis. *Germen* filiforme, flexuosum. *Stylus* subulatus, crassus, brevis : *stigmatibus* crassiusculo. *Pericarpium* Legumen lineare, glabrum, tenue, articulatum : articulis sub-lenticularibus, filo dorsali connexis, in maturentiâ hinc, inde plicatis, intra calycem inflatum, apice conniventem retractis. *Semina* sub-reniformia, compressa, brevía, fusca, lævia. *Folia* ad apicem caulis sæpe heterophylla observantur, minuscula, inæqualiter, & obrusè trigona, ibique aliquando ternata.

Habitat in Cochinchinâ, a Siamensi regno oriundum. Colitur ob pulchritudinem ; nam, lenni aurâ afflante, commota folia totidem varicolorum papiliones volitantes representant. Hæc planta cum aliis jam anno 1774 per me missa fuerat in Sueciam, & Angliam.

Sp. 3. HEDYSARUM GANGETICUM. β Tlung long thu.

Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus, ovatis, acutis, stipulatis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, cespitosus, diffusus, stipulatus, teres, pilosus. *Folia* ovato-lanceolata, simplicia, integerrima, utrinque pilosa, alterna. *Flos* spicis terminalibus, longis. *Corollæ* *vexillum*, & *carina* lutea : *alæ* violaceæ. *Legumen* articulatam, arcuatum, ad singulos articulos ex parte convexâ emarginatum.

Habitat agreste in suburbis Cantonienfibus.

Hedysarum monophyllum, latifolium, siliculis plurimis spicâ longâ digestis. Burm. Zeyl. pag. 113. tab. 49. fig. 2. Phaeolus Montanus. Rumph. Amb. l. 11. c. 36. tab. 66.

Sp. 4. HEDYSARUM TRIQUETRUM. α Cay Do dot.

Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus, cordato-oblongis : *petiolis* alatis : *ramis* triquetris. Lin. sp. 12.

Hab.,

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, fruticosus, procumbens, multiplex, 3-pedalis: *ramis* triquetris. *Folia* oblonga, acuta, lateribus rectilineis, sub-parallelis: *petiolis* alatis, alternis. *Flos* purpureus, spicis sub-terminalibus. *Corollæ vexillum* sub-rotundum. *Legumen* compressum, rectum, lineare, articulatam, pilosum.

Habita in Collibus *Son coung* in Cochinchina.

Burm. Ind. pag. 165. tab. 52. fig. 2. *Onobrychis Zeylanica*, monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Burm. Zeyl. pag. 176. tab. 81. *Phaseolus Montanus sextus*. Rumph. Amb. l. II. cap. 36. pag. 146.

Observ. In nostrâ plantâ folia non habent margines rotundatos, nec petiolos refractos, sicut in Zeylanica: gaudet autem similiter stipulis lanceolatis, & caule ad verticem rubefcente.

Sp. 5. HEDYSARUM DIPHYLLUM. β . . .

Differ. spec. Hed. *foliis* binatis, petiolatis: *bracteis* geminis ovatis, acutis, sessilibus. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Radix* sub-fusiformis, magna. *Caulis* herbaceus, teres, tenuis, multiplex, 8-pollicaris, diffusus. *Folia* ovata, apice acuta, binata, glabra, parva: petiolo communi longo: stipulis geminis, acutis. *Flos* luteus, axillaris, solitarius: *calyce* bilabiato, colorato, ciliato. *Legumen* hispidum, rectum: articulis paucis, lentiformibus.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 165. *Hedysarum bifolium*, foliolis ovatis, filiculis asperis geminis. Burm. Zeyl. pag. 114. tab. 50. fig. 1.

Sp. 6. HEDYSARUM PULCHELLUM. β A phò siên.

Differ. spec. Hed. *foliis* ternatis: *bracteis* geminis, conjugatis, orbiculatis, lineatis. Lin. sy. pl. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 3-pedalis, teres, glaber; *ramis* multis, obliquis. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, glabra, ternata, foliolo medio triplo maiore. *Flos* luteus, spicis longis, rectis, terminalibus: *bracteis* orbiculatis, lineatis, conjugatis flores ternos occultantibus. *Legumen* planum, rectum, acuminatum, articulatam, 2-permum, eisdem bracteis assurgentibus defensum.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Onobrychis Indica 3-phyllus, foliis amplis mucronatis, filiquis parvis in spicam longam ex alis inter bina foliola circinata arcuè conniventia reconditis. Pluk. Amalt. pag. 161. tab. 433. fig. 7. *Hedysarum trifoliatum* frutescens, flore, ac fructu inter duo foliola rotunda absconditis. Burm. Zeyl. pag. 116. tab. 52. Figura ista est optima, quamvis aliquantulum discrepet a Sinenâ plantâ numero florum, & seminum.

† Sp. 7.

† Sp. 7. HEDYSARUM ELEGANS. β Háp chiong tsào.

Differ. spec. Hed. *foliis* ternatis, obtusis, utrinque tomentosis: *bracteis* conjugatis, ovatis: *leguminibus* arcuatis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 3-pedalis, ramosus. *Folia* ternata, ovata, obtusa, utrinque tomentosa, obliquè nervosa. *Flos* luteus congestus, bracteis geminis, ovatis, conjugatis, lineatis, pilosis in spicas subterminales, erectas dispositis. *Legumina* curva, pilosa, articulata, 3-sperma, erecta.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Observ. Hæc species primo aspectu non multum differt a præcedente: differt tamen foliis obtusis, pilosis, bracteis ovatis, formâ curvâ leguminis, & maiori numero florum, & seminum: quod varietati tribui nequit, maximè cum ambas examinaverim eodem tempore, & in eodem solo agresti natas.

Sp. 8. HEDYSARUM TRIFLORUM. β Sic thòi tsào.

Differ. spec. Hed. *foliis* ternatis obcordatis: *caulibus* procumbentibus: *pedunculis* unifloris, ternis. Lin. sp. 35.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, brevis, cespitosus, procumbens. *Folia* ternata, obversè cordata, glabra, parva, petiolata. *Flos* albus, pedunculis monofloris, congestis, axillaribus. *Legumina* arcuata, articulata, polysperma, compressa.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 167. Hedyсарum trifoliatum, repens, Acetosefella folio glabro, caule hirsuto, siliquâ planâ, articulata. Burm. Zeyl. pag. 119. tab. 54. fig. 2.

Sp. 9. HEDYSARIUM LAGOPODIODES. β Tsií fúm tsào.

Differ. spec. Hed. *foliis* ternatis: *racemis* oblongis: *leguminibus* inflexis: *calycibus* hirsutis. Lin. sp. 37.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 2-pedalis, teres, hispidus: *ramis* diffusis. *Folia* 3-5-nata, ovato-lanceolata, glabra, petiolata: *Stipulis* lanceolatis, minutis. *Flos* obscuro-purpureus, spicis oblongis, densis, hirsutissimis, terminalibus: *bracteis* subrotundis, acuminatis, 2-floris, deciduis: *pedunculis* 1-floris, longis, inflexis, hirsutis. *Calyx* 5-fidus, laciniis longè acuminatis, conniventibus: pilis multis, longis corollam occultantibus. *Legumen* lineare, coloratum, articulatum: *articulis* retracto-plicatis: *seminibus* compressis, reniformibus, fuscis, lævibus, minusculis.

Habitat incultum circa Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 168. tab. 53. fig. 2. Quæ tamen figura non satis convenit cum nostrâ observatione tam numero, quam formâ foliorum.

Sp. 10.

Sp. 10. HEDYSARUM CRINITUM. a Cây Day mán.

Differ. spec. Hed. *foliis* pinnatis : *racemis* longis : *leguminibus* inflexis : *Caulē* fruticoso. Lin. sp. 52.

Hab., & notæ. *Caulis* 5-pedalis, erectus, fruticosus, teres, tomentosus, multiplex : *ramis* diffusis. *Folia* impari-pinnata, sub-trijuga : *foliolis* lanceolatis, 4-pollicaribus, integerrimis, glabris, venosis. *Flos* violaceus ; *spicā* densā, tereti, 1-pedali, rectā, terminali : *bracteis* lanceolatis, longē acuminatis, ciliatis, 2-floris : *pedunculis* longis, pilosis, inflexis. *Foliorum* stipulæ lanceolatæ, minimæ. *Calyx* 5-partitus, pilosissimus, laciniis subulatis, patentibus. *Corolla* papilionacea : *vexillo* sub-rotundo, integro, connivente, *alis* brevioribus, oblongis : *carinā* lunatā, longitudine mediā inter vexillum, & alas. *Filamenta* Diadelpia, brevia : *antheris* ovatis, stantibus. *Germen* lineare, flexuosum. *Stylus* subulatus, ascendens : *stigmatē* subulato. *Legumen* longum, tenne, articulatum ; articulis 7 circiter, subrotundis, filo dorsali connexis, intra calycem retracto-plicatis, pedunculo communi appressis, pedicellis propriis arcuato-inflexis.

Habitat in collibus agrastibus Conchinchinæ.

Burm. Ind. pag. 169. tab. 56.

Observ. Hæc, & præcedens planta, quamvis in multis differant, non multum differunt. Observavi utramque recentem in natali solo : hanc scilicet in Cochinchinā foliis semper pinnatis, 2-3-jugis, rarissimè ternatis : illam vero in Chinā foliis promiscuè ternatis, & quinatis : nec in aliis notis maior, & constantior differentia.

Sp. 11. HEDYSARUM ALPINUM. a Dâu nhút.

Differ. spec. Hed. *foliis* pinnatis : *leguminibus* articulatis, glabris, pendulis : *caule* erecto. Lin. sp. 40.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres, simplex, ramosus. *Folia* impari-pinnata ; multijuga : *foliolis* oblongis, obtusis, stipulatis. *Flos* luteus, racemis parvis, erectis. *Legumen* lineare, rectum, tenue, glabrum, articulatum, longum, pendulum : *semibus* sub-reniformibus, multis.

Habitat agreste in Cochinchinā.

Gmel. Sibir. v. 4. pag. 26. n. 35. tab. 10 Hedysarum saxatile, siliquā lævi. Amman Ruthen. pag. 116. n. 152. 153.

Sp. 12. HEDYSARUM VIRGINICUM. a Cây muông đát.

Differ. spec. Hed. *foliis* pinnatis : *caule* fruticoso : *leguminibus* articulatis, glabris, pedunculatis, erectis. Lin. sp. 46.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 3-pedalis : *ramis* ascendentibus. *Folia* impari-pinnata : *foliolis* oblongis, obtusis, parvis, mult-

multis. *Flos* violaceus, spicis terminalibus. *Legumen* tenue, articulatam, glabrum, pedunculatum, erectum: *seminibus* sub-rotundis, compressis.

Habitat in agris Cochinchinæ ad portum Turanum, vulgo Hàu. Gronov. Virgin. 174.

† Sp. 13. HEDYSARUM LINEARE. *α* Cay Ve ve cá.

Differ. spec. Hed. *foliis* pinnatis, *foliolis* lanceolato-linearibus: *spicis* terminalibus: *leguminibus* rectis, lævibus: *caule* diffuso.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis, diffusus, ramosus. *Folia* impari-pinnata, foliolis lanceolato-linearibus, glabris. *Flos* obscuro-violaceus, parvus, spicis erectis, terminalibus. *Legumen* lineare, rectum, læve, acuminatum, 6-spermum.

Habitat incultum in Cochinchinâ.

Virtus: radicis. Deobstruens, Emennagoga, Cibi appetentiam excitans.

GENUS XXI. CORONILLA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: $\frac{2}{3}$: dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum Lin. sy. pl. G. 956.

† Sp. 1. CORONILLA COCHINCHINENSIS. *α* Dâu Chi.

Differ. spec. Cor. suffruticosa: *foliolis* sub-15 jugis: *pedunculis* sub-trifloris: *leguminibus* erectis, torulosis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus ramosus. *Folia* pinnata, 15-juga, foliolis oblongis, obtusis, cuspidè tenui. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis sub-trifloris. *Calyx* 5-dentatus, brevis, dentibus sub-æqualibus. *Corollæ vexillum* alis sub-longius. *Legumen* erectum, rectum, filiforme, longum, torulosum, isthmis interceptum. *Semina* multa, sub-cylindrica.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXII. ORNITHOPUS.

Char. Gener. *Legumen* articulatam. teres, arcuatam. Lin. sy. pl. G. 957.

† Sp. 1. ORNITHOPUS RUBER. *α* Cay Ve ve duc.

Differ. spec. Orn: *foliis* alternis, ovatis, ciliatis: *leguminibus* compressis, scabris: spicis terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis: *ramis* multis, sub-erectis, rubris. *Folia* ovata, alterna, ciliata, petiolata, pauca. *Flos* pallidus, papilionaceus, spicis terminalibus. *Legumen* arcuatam, compress-

compressum, scabrum, articulatum, ex parte convexâ sinuatum, polypernum: *seminibus* sub-rotundis.

Habitat Agrestis in Cochinchinâ.

Observ. Accedit ad Orn. Compressum: (Lin. sp. 2.) recedit foliis alternis, flore spicato. Cumque ab Hedyaro non abhorreat, ed transferetur, si libet.

GENUS XXIII. HIPPOCREPIS.

Char. Gener. *Legumen* compressum: alterâ futurâ pluries emarginatum; curvum. Lin. sy. pl. G. 958.

† Sp. 1. HIPPOCREPIS BARBATA. α Gay Xuong nguc.

Differ. spec. Hip. *Leguminibus* rectis: *spicâ* oblongâ, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres. *Folia* ovata, integerrima, glabra, ternata, medio maiore. *Flos* purpureus, terminalis, papilionaceus, in spicam oblongam, densam accrescens. *Legumen* pedunculatum, erectum, rectum, planum, barbatum, futurâ exteriore pluries, & profundè emarginatâ: *seminibus* quadrato-reniformibus, parvis, compressis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXIV. MEDICAGO.

Char. Gener. *Legumen* compressum, cochleatum. *Carina* a vexillo deflectens. Lin. sy. pl. G. 971.

Sp. 1. MEDICAGO POLYMORPHA. α Cỏ áo nhỏ cây.

Differ. spec. Med. *leguminibus* cochleatis: *stipulis* dentatis: caule diffuso. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* sub-erectus, diffusus, 2-pedalis. *Folia* obtusa, glabra. *Flos* luteus, pedunculis 1-floris solitariis. *Legumen* in orbem volutum, compresso-planum, sub-articulatum, inermè, glabrum, luteo-fuscum.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Thunb. Jap. pag. 291. Medica Orbiculata. Bauh. hist. 2. pag. 384.

† GENUS XXV. DIPHACA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-fidum, gibbum, persistens: laciniis acutis, inferiore longiore: stipulis binis lanceolatis, curvis suffultum.

Munm

Corol.

Corol. Papilionacea. Vexillum trigono-rotundum, emarginatum, ascendens. Alæ ovatæ, vexillo breviores. Carina 2-phylla, lunata, vexillo æqualis: unguibus longis filiformibus.

Stam. Filamentâ 10, æquali numero insistentia laminis duabus, oblongis planis, erectis, vaginæ locum tenentibus. Antheræ oblongæ, incumbentes.

Pist. Germina 2, oblonga, compressa, recta. Styli singuli subulati, longiores staminibus. Stigmata crassiuscula.

Peric. Legumina 2, compressa, recta, acuminata, articulata: articulis ovatis, striatis, glabris, inæqualibus.

Sem. Ovata, compressa.

Nom. (Δ is binis: Φ ων legumen) a duplici legumine ex singulo flore prodeunte.

Char. Gener. *Legumina* 2. *Vagina staminum* duplex.

† **Sp. 1.** *DIPHACA COCHINCHINENSIS.* α Kim phụng. B. . .

Differ. spec. *Diph. foliis* pinnatis: *floribus* geminis.

Hab. *Caulis* arboreus, 8-pedalis: *cortice* inæquali, fusco, inermi: *ramis* patentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-septemjuga: *foliolis* ovatis, glabris, parvulis, subsessilibus, oppositis, alternisque. *Flos* pallidus, *pedunculis* 2-natis, 1-floris, axillaribus.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Solulus arbor: Roraco. Rumph. Amb. 1. 5. cap. 45. tab. 128.

Observ. Hanc plantam Hedyllarum Ecastaphyllum vocaverat Linnæus (Mantissæ 446): speciem Pterocarpi fecerat D. Bergius: Parkinsoniæ adscripserat Joannes Burmannus; siquidem, deficiente plenâ descriptione, proprium locum assignare non poterant. Licet Filamenta in duos fasciculos æquales connata jam antea Brownius notavisset.

GENUS XXVI. CLITORIA.

Char. Gener. *Cor.* supinata: *vexillo* maximo, patente, alas obumbrante. Lin. sy. pl. G. 943.

Sp. 1. *CLITORIA TERNATEA.* α Cây Đậu biếc.

Differ. spec. *Clit. foliis* pinnatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, teres, tenuis, longus, ramosus. *Folia* impari-pinnata, 2-3-juga: *foliolis* ovatis, sub-pubescentibus. *Flos* solitarius, lateralis, oppositifolius. *Calyx* 5-fidus, erectus. *Corolla* resupinata, cyanea, maculâ luteâ notata: *vexillo* amplo, expanso, alas, & carinam latè obtegente. *Legumen* longum, sub-compressum, rectum, acuminatum, polyspermum: *seminibus* reniformibus.

Habi-

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchina.
Flos caeruleus. Rumph. Amb. 1. 7. cap. 30. tab. 31. Flos Clitorius;
flore caeruleo. Burm. Zeyl. pag. 100.
Ulus. Succo hujus floris solent indigenae tingere libani, aliaque edu-
lia colore cyaneo, pulcherrimo quidem, sed breviter evanescente;
ideoque ad imbuendas telas inepto.

GENUS XXVII. ROBINIA.

Char. Gener. Cal. 4-fidus. Legumen gibbum elongatum. Lin. Sy. pl.
G. 953.

† Sp. 1. ROBINIA MITIS. a Khū sēm. & Khó sām hoa vãng.
Differ. spec. Rob. racemis pedicellis ternis: foliis impari-pinnatis:
caule enermi. Lin. Sp. 4.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, 3-pedalis, erectus, inermis, ra-
mosus. Folia impari-pinnata, ovato-lanceolata, glabra, lætè viri-
dia, sub-bijuga. Flos luteus, racemis terminalibus, brevibus, pe-
dicellis ternis. Legumen oblongum, utrinque attenuatum, glabrum,
polysperum: seminibus reniformibus.

Habitat agrestis in China: raro in Cochinchina.
Burm. Ind. pag. 163. Pluken. Phyt. tab. 310. fig. 3.

† Sp. 2. ROBINIA AMARA. & khó sām hoa tiá. & Khū sēm.
Differ. spec. Rob. racemis elongatis, pedicellis ternis: foliis impa-
ri-pinnatis, sub-quinque-jugis: caule inermi.

Hab., & notæ. Planta fruticosa, 4-pedalis, tota inermis: ramis dif-
fusis, fusco-rubentibus. Folia impari-pinnata, sub-quinque-juga: fo-
liolis ovato-oblongis, superius fusco-virentibus, subius albicantibus.
Flos violaceus, racemis erectis, longis, sub-terminalibus: pedicel-
lis ternis. Calyx planiusculus, 4-dentatus. Corollæ vexillum sub-ro-
tundum, patens: alæ oblongæ, rectæ: carina brevior, obtusa,
monophylla. Legumen longum, sub-teres, rectum, acuminatum,
glabrum: seminibus multis oblongo-reniformibus. Radix sub-carno-
sa, multiplex, luteo-fusca, amarissima.

Habitat inculta in Cochinchina, & China.

Virtus: radicis. Attenuans, Roborans, Exsiccans. Prodest in fluxu
ventris diurno: stomachi debilitate: obstructionibus mesenterii,
& uteri: humores crassos, & nimios compefcit. Ejus virtutem non
tantum in aliis, sed in me ipso efficaciter expertus. Usus commo-
dius in pilulis. Ad tollendum saporem, quem habet; nauseosum
debet macerari in aceto, & leviter torreri.

- † Sp. 3. **ROBINIA FLAVA**. Hoam Khin. a Hùynh cam.
 Differ. spec. Rob. *pedunculis* ternis, 3-floris, terminalibus; *foliis*
 abrupte-pinnatis, sub-octojugis, *caule* inermi.
 Hab. & notæ. *Planta* fruticosa, 1-pedalis, inermis. *Folia* erecta,
 abrupte-pinnata, sub-octojuga, *foliis* oblongis, sub-acutis, gla-
 bris, pallidè virentibus. *Flos* albus, terminalis, pedunculis ternis,
 erectis, trifloris. *Radix* simplex, lignosa, crassa, lutea, amara,
 cariota. Plantam virentem non vidi.
 Habitat agrestis, in provinciis Borealibus imperii Sinesis.
 Virtus: radice. Pellens, Antifebrilis. Usus præcipuus in decocto.

† GENUS XXVIII. CITTA

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium bilabiatum, gibbosum, coloratum, hispidum: labio
 superiore integro, inferiore 3-fido, laciniis subulatis, mediâ lon-
 giore.
 Cor. Papilionacea. Vexillum sub-rotundum, calyce duplo longius, ad
 basim gibboso-turgidum, superius patens, ascendens. Alæ oblongæ,
 acutæ, conniventes, vexillo longiores. Carina falcata, alis æqualis.
 Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) quorum 5 alterna cras-
 siora, corollæ æqualia. Antheræ 5 oblongæ, 5 aliæ sub-rotundæ.
 Pist. Germen oblongum, pilosum. Stylus filiformis, longior staminibus.
 Stigma sub-rotundum.
 Peric. Legumen ovato-oblongum, crassum, compressum, hispidum:
 cortice exterius diviso in cellulas sub-quadratas, obliquè formatas ex
 membranis verticalibus, ordinatis.
 Sem. 3 ovata, compressa, arillata, magna.

Nom. (CITTA pica) a flore turgido, maculis, albis, & nigris hanc
 avem representante.

Char. Gener. Cal. & vexillum gibboso-turgida. Legum. exterius cellu-
 losum, hispidum: seminibus arillatis.

- † Sp. 1. **CITTA NIGRICANS**. Cay. Poung mét.
 Differ. spec. Cit. *caule* fruticoso volubili: *foliis* ternatis, ovatis: *flo-*
ribus sub-umbellatis.
 Hab. *Caulis* fruticosus, tenes, volubilis, digitum crassus, longus,
 ramosus, inermis. *Folia* 3-nata, ovata, acuminata, integerrima,
 venosa, glabra, petiolo communi longo, stipulis nullis. *Flos* axil-
 laris,

laris, pedunculis polyfloris, sub-umbellatis: *calyx* fusco. *Corolla* nigra, maculâ albâ notata.

Habitat inter sepes in Cochinchinâ.

Lobus Litoralis. Rumph. Amb. l. 7. c. 6. tab. 6. Lobus Cartilagineus.

Clus. Exot. l. 3. c. 9, & 10. Quamvis Auctores isti cellulas leguminis non expriment, eandem esse plantam existimo.

GENUS XXIX. GLYCINE.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatu. *Corolla* carina apice vexillum reflectens.

Lin. sy. pl. G. 942.

Sp. I. GLYCINE SUBTERRANEA. γ Jugo.

Differ. spec. *Glyc. foliis* ternatis, radicalibus: *caulibus* prostratis; flexuosis: *pedunculis* bifloris. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, semipedalis, prostratus, multiplex, teres, flexuosus, radicans. *Folia* ternata, radicalia: *foliis* lanceolatis, acutis, integerrimis, venosis, glabris: *petiolo* communi longo, erecto, propriis brevibus. *Flos* dilutè flavus, radicalis, sparsus: *pedunculo* brevi, erecto, solitario, monofloro. *Corolla* vexillum ob-ovatum, apice carinæ compellente, reflexum. *Germen* subrotundum, in maturescentiâ terram penetrans, ibique fructificans. *Legumen* sub-reniforme, bivalve, reticulatum, 1-spermum: valvis raro dehiscentibus. *Semen* lato-ovatum, nec compressum, luteum, edule.

Habitat prope Sofalam, & in variis locis Africæ Orientalis: undè semina per me delata in Lusitaniam flores, & fructus produxerunt duobus annis: tertio autem annò nova semina non germinarunt.

Mandôbi fructus ex oris Africæ translatus. Pis. Bras. pag. 256. Mandubi de Angola. Marcgr. Bras. 43. Arachis Africana. Burm. Ind. Fl. Capens. pag. 22.

GENUS XXX. INDIGOFERA.

Char. Gener. *Cal.* patens. *Corolla* carina utrinque calcari subulato, patulo. *Legumen* lineare. Lin. sy. pl. G. 962.

† Sp. I. INDIGOFERA COCCINEA. β Louc hãm tsào.

Differ. spec. Ind. *foliis* ternatis, ovato-oblongis: *pedunculis* polyfloris, axillaribus: *leguminibus* teretibus, arcuatis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, multiplex, sub-erectus, ramosus. *Folia* ternata, ovato-oblonga, obtusa, pubescentia, parva. *Flos* coccineus, axillaris, *pedunculis* polyfloris. *Calyx* 5-fidus, margi-

parte superiore truncatâ, hians. *Corollæ* carina calcaribus binis, longis, reflexis. *Legumen* longum, teres, tenue, arcuatum. Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. INDIGOFERA ROTUNDFOLIA. β Ô tam sin.

Differ. spec. Ind. *foliis* ternatis, sub-rotundis, utrinque tomentosis: *racemis* brevibus, axillaribus: caule volubili.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, filiformis, volubilis, pilosus. *Folia* ternata, sub-rotunda, apice sub-acuta, utrinque tomentosa: stipulis subulatis. *Flos* luteus, racemis brevibus, axillaribus. *Corollæ* carina calcaribus duobus, longis, subulatis, curvis. *Legumen* oblongum, planum, acuminatum, glabrum, bispermum.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Obsery. Affinitatem habet cum Indigofera Procumbente, ex Cap. B. Spei. Linn. sp. 4.

† Sp. 3. INDIGOFERA BUFALINA. α Đại trâu.

Differ. spec. Ind. *foliis* ternatis, ovatis, glabris: *racemis* axillaribus: *leguminibus* crassis, villosis: caule scandente.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, scandens, teres, longus, glaber.

Folia ternata, ovata, glabra. *Flos* albo-purpureus, racemis axillaribus, & terminalibus: pedunculo communi longo. *Carina* vexillum impellens dentibus binis callosis, supra basim exsertis. *Calyx* bilabiatus, 5-fidus, patens. *Legumen* longum, rectum, crassum, villosum, sub-compressum: seminibus ovatis.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Sp. 4. INDIGOFERA TINCTORIA. α Chàm nhuộm. β Lán tảo: tá cừm.

Differ. spec. Ind. *foliis* pinnatis, obovatis: *racemis* brevibus: *caule* suffruticoso. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, simplex, 3-pedalis, rectus, teres, glaber, ramosus. *Folia* impari-pinnata, sub-septemjuga: foliolis ovatis, integerrimis, glabris, glaucis, brevi-petiolatis. *Flos* axillaris, racemis simplicibus, erectis, brevibus. *Calyx* planiusculus, leviter 5-fidus. *Corollæ* vexillum oblongo-ovatum, ascendens, flavum. Alæ, & carina rubræ: hæc ad basim dente utrinque instructa. *Legumen* longum, tenue, teres, sub-arcuatum, sub-torulolum, glabrum, pendulum: seminibus multis cylindricis.

Habitat spontanea, coliturque vastissime in Cochinchinâ, & Chinâ.

Indicum. Rumph. Amb. 1. 8. c. 39. tab. 80. Anil. Garc. Arom. 1.

2. cap. 26. pag. 239. edit. Lat. Clus. Ubi notandum Garciam non errasse dicendo Indigoferam sive Anil Ocymo similem; siquidem caulibus, & foliola ovata, oppositaque in utraq; plantâ aliquo modo con-

convenunt: nec de modo parandi Indicum in pastillos hæc similitudo intelligi debet, neque Garcias asseruit.

Virtus: foliorum. Resolvens, Abstergens. Ex Indigoferâ istâ cum curcumâ fit unguentum aptum ad resolvendas contusiones, & inflammationes, abstergenda ulcera, & scabiem.

Usus. Folia contusa, & in aquâ, paucâ admixtâ calce, macerata resolvuntur in pigmentum, Indicum dictum, ad tingendum colore cyaneo, viridi, & purpureo usitatissimum in toto orbe.

† GENUS XXXI. GRONA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum, persistens: laciniis sub-æqualibus, superiore emarginatâ.

Cor. Papilionacea. Vexillum obcordatum, sub-clausum. Alæ turbinatæ, obtusæ, vexillo breviores. Carina inflexo-concava, alæ utriusque infra medium coalita, subtus divaricata in cavernam hians.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) vaginæ ascendenti infidentia. Antheræ sub-rotundæ, minimæ.

Pist. Germen lineare. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma simplex.

Peric. Legumen lineare, rectum, compressum, acuminatum, hirsutum, polyspermum.

Sem. Reniformia, compressa, minuta.

Nom. (Γρῶν caverna) ob carinam subtus cavernosam.

Char. Gener. *Corolle* carina alis utrinque coalita: *subtus* in cavernam hians. *Legumen* lineare.

† Sp. I. GRONA REPENS. α. Dâu Lan rừng.

Differ. spec. Gron. *foliis* ovatis, alternis: *spicis* axillaribus: *caule* repente.

Hab. *Caulis* suffruticosus, multiplex, prostratus, repens. *Folia* ovata, integerrima, alterna, petiolata: *stipulis* binis subularis. *Flos* purpureus, *spicis* erectis, axillaribus, & terminalibus: *bracteis* acuminatis, 2-floris.

Habitat in collibus agrestibus Cochinchinæ.

† GENUS XXXII. RHYNCHOSIA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium bilabiatum: labio superiore latiore, emarginato: in inferiore 3-fido, laciniâ mediâ longiore.
- Cor. Papilionacea. Vexillum ovatum, ascendens. Alæ oblongæ, vexillo breviores: unguibus filiformibus, appendiculatis. Carina monophylla, rhomboidea, rostro longo, acuto terminata.
- Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) vaginæ longæ, ascendenti infistentia, vexillo æqualia. Antheræ sub-rotundæ.
- Pist. Germen oblongum, compressum. Stylus sub-æqualis staminibus. Stigma simplex.
- Peric. Legumen ovatum, compressum, membranaceum, sub-acuminatum, 2-spermum.
- Sem. sub-ovata, compressa.
- Nom. (Ρυγχος rostrum) a carinâ floris rostratâ.
- Char. Gener. *Carina* rhomboidea, rostrata. *Legumen* membranaceum, 2-spermum.

† Sp. I. RHYNCHOSIA VOLUBILIS. β Chio tâu.

Differ. spec. Rhynch. *foliis* ternatis, sub-rotundis, tomentosis: pedunculis polyfloris, binnatis.

Hab. *Caulis* herbaceus, volubilis, teres. *Folia* ternata, sub-rotunda, tomentosa. *Fos* luteus, *pedunculis* 2-natis, polyfloris, axillaribus.

- *Semina* nigra, nitida.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† GENUS XXXIII. MARCANTHUS.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium 4-fidum, tubulosum, coloratum, tomentosum, persistens: laciniis acutis, binis lateralibus brevioribus.
- Cor. Papilionacea, longa, sub-clausa. Vexillum ovatum, emarginatum, connivens, calyce longius: Alæ oblongæ, vexillo triplo longiores, rectæ. Carina alis longior: apice acuto, ascendente.
- Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) omnia liniari-turbinata, acuminata, recta: horum 4 triplo crassiora reliquis. Antheræ crassiorum ovatæ, incumbentes: tenuiorum oblongæ, stantes.
- Pist. Germen oblongum, teres. Stylus filiformis, totus pilosus, æqualis

lis staminibus. Stigma obtusum, scabriusculum.

Peric. Legumen rectum, sub-teres, crassum, acuminatum, polyspermum.
Sem. Sub-ovata.

Nom. (Μαρκός longus) ex notabili floris longitudine.

Char. Gener. *Carina*, & *alæ* longissimæ. *Legum.* crassum, sub-teres;

† Sp. I. MARCANTHUS COCHINCHINENSIS. α. Dâu méo.

Differ. spec. Marc. *foliis* ternatis: *pedunculis* polyfloris axillaribus: *caule* volubili.

Hab. *Caulis* herbaceus, longus, teres, volubilis, ramosus. *Folia* ternata, ovato-rhombea, pilosa: *stipulis* filiformibus. *Flos* albus, calyce concolore: *pedunculis* polyfloris axillaribus. *Legumen* esculentum, quamvis nec fapidum, nec salubre.

Habitat cultus in Cochinchinâ.

GENUS XXXIV. ERVUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus, longitudine corollæ. *Lin.* sy. pl. G. 948.

Sp. I. ERVUM HIRSUTUM. α. Cây Đeái chôn.

Differ. spec. Erv. *pedunculis* multifloris: *feminibus* globosis, binis.
Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, sub-erectus, angulatus, hirsutus, ramosus. *Folia* ternata, sub-lanceolata, integerrima, rugosa, pilosa. *Flos* purpurascens, axillaris, spicis ovatis, erectis. *Calyx* 5-partitus, pilosus. *Corolla* papilionacea, brevissima, vix calyci æqualis. *Legumen* teres, acuminatum, 2-spermum: *feminibus* globosis.

Habitat incultum, per agros dispersum in Cochinchinâ.

Cicer pedunculis multifloris, feminibus globosis. Hort. Cliff. pag. 370.

Vicia segetum cum siliquis plurimis, hirsutis. Baub. Pin. pag. 345. n. 2.

† GENUS XXXV. SARCODUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium cyathiforme, breve, coloratum, persistens: parte superiore truncatum, inferiore denticulis 3, acutis, erectis.

Cor. Papilionacea. Vexillum ovatum, integrum, ascendens. *Alæ* oblongo-ovatae, breves, planæ. *Carina* monophylla, falcata, vexillo æqualis.

Nnn

Stam.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) subulata, vaginæ longæ connata, vexillo breviora. Antheræ ovatae, incumbentes.

Pist. Germen lineare. Stylus subulatus, æqualis staminibus. Stigma crassifusculum.

Peric. Legumen longum, teres, rectum, æquale, carnosum, glabrum, polyspermum.

Sem. Reniformia.

Nom. ($\Sigma\alpha\rho\kappa\omega\delta\eta\varsigma$ cornosus) a Legumine carnosæ.

Char. Gener. *Cal.* semitruncatus. *Ala* planæ, breves. *Legumen* carnosum, teres.

† Sp. 1. SARCODUM SCANDENS. α . Cây mùng deer.

Differ. spec. Sarc. *foliis* pinnatis: *spicis* terminalibus: *Caule* fruticoso, scandente.

Hab. *Caulis* fruticosus, lignosus, scandens, inermis, longus, ramosissimus. *Folia* pinnata, multijuga: *foliolis* ovato-oblongis, acuminatis, integerrimis, lanuginosis: *stipulis* linearibus. *Flos* coloris rosei, *spicis* simplicibus, terminalibus: *bracteis* lanceolatis, ciliatis, monofloris.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Quamvis cum Loto conveniat Legumine factæ, differt tamen calyce semitruncato, 3-dentato, alis planis, nec conniventibus, seminibusque reniformibus, atque vexillo ascendente.

GENUS XXXVI. CYTISUS.

Char. Gener. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{2}{7}$. *Legumen* basi attenuatum. Lin. sy. pl. G. 951.

Sp. 1. CYTISUS CAJAN. α . Đậu sảng. β Xân têu kên: sãn tâu can.

Differ. spec. Cyt. *racemis* axillaribus, erectis: *foliolis* sub-lanceolatis, tomentosis: *intermedio* longius petiolato. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* arborescens, lignosus, 10-pedalis, teres, rectissimus: *ramis* similiter rectis, ascendentibus. *Folia* ternata, lanceolata, integerrima, obliquè nervosa, venosa, tomentosa, mollia, albicantia, petiolata, petiolo medio longiore. *Flos* flavus, *pedunculis* longis, erectis, axillaribus, sub-sexfloris. *Calyx* semiquinquefidus, laciniis acutis, sub-æqualibus. *Corolla* papilionacea, petala 4, longitudine sub-æqualia. *Vexillum* sub-rotundum, patens. *Ala* ovata, ad basim dente notata. *Carina* lunata. *Filamenta* 10, Diadelphæ, subulata, sub-æqualia. *Antheræ* ovatae, stantes. *Germen* line-

neare. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus, basi hirsutus, superius glaber. *Stigma* sub-rotundum. *Legumen* longum, rectum, sub-teres, acuminatum, pubescens, obliquè striatum, (non contortum) sub-articulatum, polyspermum: *seminibus* reniformibus, 6 circiter. Habitat incultus, cultusque ad ordinandas sepes in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Observ. In utroque regno hanc plantam observavi omnino conformem: attamen in herbariis Sinensibus invenio duas eodem nomine descriptas, & pictas valdè differentes: alteram quidem caule erecto, sed foliis pinnatis, sub-trijugis, aliam vero foliis ternatis, caule scandente, ut videtur, herbaceo.

Cytisus folio molli, incano: siliquis Orobi contortis, & acutis: Burm. Zeyl. pag. 86. tab. 37. *Phaseolus* Balicus. Rumph. Amb. l. 9. cap. 24. tab. 135. fig. 2.

Virtus: radice. Attenuans, Resolvens, Odontalgica. Prodest in Chlorosi, faucium inflammatione, dentium dolore, fluxu ventris ex crassis humoribus, ani ulceribus, morfu animalium venenatorum.

GENUS XXXVII. LOTUS.

Char. Gener. *Leg.* cylindricum, strictum. *Alæ* sursum longitudinaliter conniventes. *Cal.* tubulosus. Lin. fy. pl. G. 969.

Sp. I. LOTUS ARABICUS. α Dau λεο vâng.

Differ. spec. Lot. *leguminibus* cylindricis aristatis: *caulibus* prostratis: *pedunculis* 3-floris: *bracteis* monophyllis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, striatus, scandens, acirrhus, sæpè prostratus. *Folia* ternata, ovata, pilosa, petiolis brevibus: *stipulis* binis lanceolatis. *Flor* luteus pedunculis longis, erectis, polyfloris, axillaribus. *Calix* tubulosus labio superiøre obtuso, emarginato. *Corollæ* alæ oblongæ, conniventes. *Stylus* linearis, teritiusculus, villosus, cum staminibus ascendens. *Legumen* teres, acuminatum, rectum, pilosum: *seminibus* oblongis, cylindricis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Lotus Hirsuta. Forskæl. Arab. Cent. 5. n. 39. pag. 140.

Observ. Notæ Loti Hirsutæ ex Forskæleo potius conveniunt Loto Arabico Linæi, quam illius Lotus Rosea foliis quinatis, sive impari-pinnatis, 2-jugis, prout in Flora Arabicâ exponuntur: Loto vero Arabico folia 3-nata a Linnæo tribuuntur, totidemque in Cochinchinensi numeravimus.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA.

1. CITRUS.

Cal. 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20
in tubum fissum connata. *Stylus* 1. *Bacca* lo-
cularis, pulpâ vesiculari.

2. MELALEUCA.

Cal. 5-fidus, superus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 40
in 5, 6 phalanges. *Stylus* 1. *Capsf.* 3-valvis,
calyce femiveffita.

POLYANDRIA.

† 3. BALSAMARIA.

Cal. 2-phyllus, inferus. *Cor.* 6-petala. *Stam.*
200 in 5, 6 phalanges. *Stylus* 1. *Drupa* 1-
sperma.

4. GLABRARIA.

Cal. 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* pha-
langes 5 ex senis. *Stylus* 1. *Drupa*.

5. HYPERICUM.

Cal. 5-partitus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Styli* 1,
3, 5. *Capsf.* locularis.

ICOSANDRIA

GENUS I. CITRUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9-locularis. *Lin. fy. pl. G.* 974.

Sp. I. CITRUS MEDICA. *Cay Tanh yen.* 800. *lin. bot. ay.*

Differ. Spec. Cit. *petiolis* linearibus. *Lin. sp. I.* 411.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis, erectus, aculeatus: *ramis* longis, reclinatis. *Folia* ovato-oblonga, alterna, sub-ferrata, glabra; pallido-virentia: *petiolis* linearibus. *Flos* albus, odoratus, mediocris, pedunculis polyfloris; sub-terminalibus. *Bacca* semipedalis, ovata, apice protuberante, sub-9-locularis: *pulpâ* vesiculari, albâ, sæpius acidâ: *cortice* flavescente, crasso, duriusculo, odorato; inæquali. *Fructus* esculentus tam crudus, quam saccharo conditus.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Malum Citrium. *Rhumph. Amb. l. 2. c. 35. tab. 25. Malus Medica.*

Bauh. Pin. pag. 435. n. 1.

Est hujus Varietas, non rara in Sinis, caule, foliis, & floribus similis: fructu vero oblongo, solido absque loculis, aut pulpâ, supra medium diviso in 5, vel plures lacinias longas, teretes, sub-curvas, manum hominis representante lateraliter conniventem, digitisque parum curvatis. Ex quâ formâ deducitur nomen. vulgare *Phat thu*, id est Citrus digitata, seu Chirocarpus.

Varietas 2. Citrus Limon. *z. Cay Canh. 8. Tsim p' xü.* *Caulis* arboreus, 8-pedalis, tortuosus, aculeatus: *ramis* multis diffusis. *Folia* ovato-lanceolata, sub-integerrima, alterna: *petiolis* plerumque linearibus. *Flos* albus, maculâ rubescente, *pedunculis* terminalibus, paucifloris: *corollâ* 5-petalâ, oblongâ: *Staminibus* 20, in varia corpora collectis. *Bacca* sesquipollicaris, apice protuberante, sub-globosa, æqualis, nitida, flavo-viridis, odorata, sub-9-locularis, pulpâ multâ, acidissimâ, seminibus paucis, sub-ovatis: Hæc Citri varietas in usu œconomico est omnium optima: vocaturque a *Rumphio* Limonellus Nipis. *Amb. l. 2. c. 39. tab. 29.* Limonum arbores multum variant non solum magnitudine, & formâ fructus, sed etiam foliorum, & petiolorum simplicium, & alarum: quas notas apud citatum *Rumphium* facile observabis.

Sp. 2. CITRUS AURANTIUM. a Cay Cam. β Cān xii.

Differ. spec. Cit. *petiolis* alatis : *foliis* acuminatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, aculeata, cortice viridi-fusco, ramis patentibus. *Folia* lato-lanceolata, sub-integerrima, glabra, alterna, *petiolis* plerumque alatis. *Flos* albus, 5-petalus, odoratus : *pedunculis* terminalibus, polyfloris. *Stamina* 20, connata in varia corpora tubum formantia. *Bacca* sub-globosa, apice planiuscula, coloris aurei, nitida, odorata, 3-pollicaris, sub-9-locularis, pulpâ vesiculari, acido-dulci : cortice carnofo, mediocri, pelliculâ exteriore gustus sub-ardentis, amaricantis. Hæc descriptio imprimis convenit Aurantio vulgarissimo in quatuor obis partibus, quod in Europâ dici solet Lusitanum, aut Sinense ; quia a Sinis per Lusitanos traslatum per totam Europam propagatum hodie videmus.

Habitat culta, inculaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Aurantia Mala. Math. in Diosc. l. i. c. 131. pag. 206. fig. 7.

Aurantium Sinense. Tournef. Inst. pag. 620. n. 15. tab. 393.

Virtus : pulpæ. Refrigerans, Antiscorbutica. Corticis flavi exterioris. Calefaciens, Tonica, Stomachica, Pellens per sudorem, & urinam. Petuitam, & tussim domat. Vomitum, nauseam, & anxietates cohibet. Pharmacum est apud Sinas usitatissimum : cortex scilicet, non medulla fructus, quæ non permittitur infirmis a Medicis Sinensibus, quamvis tam facîle in Europâ concedatur.

† Sp. 3. CITRUS NOBLLIS. a Cam Sanh. β Tsem cān.

Differ. spec. Citr. *inermis*, ramis ascendentibus : *petiolis* strictis *fructu* tuberculoso : sub-compresso.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis ascendentibus, inermibus. *Folia* lanceolata, integerrima, sparsa, nitida, obscuro-viridia, gravè olentia : *petiolis* linearibus. *Flos* albus, 5-petalus, odoratus, *pedunculis* polyfloris, terminalibus. *Bacca* compresso-rotunda, sub-9-locularis, intus, & foris rubra : cortice crasso, succoso, dulci, eduli, tuberculoso-inaequali. Sinensi vulgari duplò maior est, diametro 5 pollices æquante. Est Citrorum omnium gratissima.

Habitat abundanter in Cochinchinâ : etiam in Chinâ, quamvis Canone illam non viderim.

Malus Arantia cortice dulci, eduli. Bauh. Pin. pag. 436. n. 3. Aurantium, quæ malus Aurancia regia, dulcis : cortice suavi, & dulci. Burm. Zeyl. pag. 39. Aurantium verrucosam : Manis Ibsaar. Rumph. Amb. l. 2. c. 43. Tabula vero 35 minus cum nostrâ descriptione cohæret, quam tabula 34 : nec ista, aut Rumphii exploratio in totum convenit, fortasse, quia plantam non viderit, cum ipsemet fateatur ibi non esse vulgarem.

Sp. 4.

† Sp. 4. CITRUS MADURENSIS. α Kūn kūt. β Kūn: kūt xū.
 Differ. spec. Citr. *inermis*: ramis diffusis, angulatis: petiolis linearibus: fructu globofo, lævi.
 Hab., & notæ: *Arbuscula* 3-pedalis: ramis patentibus, tortuosis, angularis, inermibus. *Folia* lato-lanceolata, sub-integerrima, alterna, glabra: *petiolis* linearibus. *Flos* albus, 5-petalus, odor, minusculus: *pedunculis* paucifloris. *Bacca* globosa, lævis, luteo-viridis, semipollici vix æqualis, sub-8-locularis: pulpâ vesiculari, amaricante. Saccharo condita edulis est, & grata: non autem cruda. Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: coliturque ob pulchritudinem. Limonellus Madurensis. Rumph. Amb. l. 2. cap. 40. pag. 110. tab. 31.

† Sp. 5. CITRUS MARGARITA. β Chū tsū. α Chāu tsū.
 Differ. spec. Citr. ramis ascendentibus, aculeatis: petiolis linearibus: baccis 5-locularibus, oblongis.
 Hab., & notæ. *Arbuscula* 4-pedalis: ramis ascendentibus, aculeatis. *Folia* lanceolata, integerrima, nitida, sparsa: petiolis linearibus. *Flos* albus, 5-petalus, odoratus: *pedunculis* paucifloris, sparsis. *Bacca* oblongo-ovata, rubro-lutea, glabra, 8 lineas longa, 5-locularis: cortice tenui: pulpâ vesiculari, dulci, eduli.
 Habitat Cantone Sinarum, nec rara: in Cochinchinâ mihi non visa.

† Sp. 6. CITRUS FUSCA. α Cây Bông. β Chí Xác. γ Chí Kéa.
 Differ. spec. Citr. *ramosissima*, aculeata: foliis lanceolato-ovatis: petiolis cordato-alatis: baccis globosis, asperis.
 Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: ramis plurimis, tortuosis, sub-ascendentibus: aculeis plurimis longis, validis. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, obscuro-viridia, glabra, ingrati odoris: petiolis magnis, alatis, cordiformibus. *Flos* albus, sub-odorus: *pedunculis* polyfloris, subterminalibus. *Bacca* globosa, 2-pollicaris, aspera, fusco-viridis, corticosa, sub-9-locularis: pulpâ vesiculari, pallidâ, acidâ, sub-amarâ, ingrata.
 Habitat latissimè in Cochinchinâ, rariùs in Chinâ. Aurantium Acidum Lemon Itam. Rumph. Amb. l. 2. c. 41. tab. 33. Virtus: Corticis integri baccarum. Attenuans, Deobstruens, Eccoprotica.

Sp. 7. CITRUS DECUMANA. α Cây Bưởi. β Yếu Xí.
 Differ. spec. Citr. petiolis alatis: foliis obtusis, emarginatis. Lin. sp. 3.
 Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: ramis patentibus, aculeatis. *Folia* ovata, sub-acuta, rarò obtusa, rarissimè emarginata, glabra, spar-

sparsa : *petiolis* cordato-alatis, magnis. *Flos* albus, odoratissimus, *racemis* vastis, erectis, terminalibus. *Corolla* 5-petala, reflexa. *Stamina* 20 circiter, petalis sub-æqualia, in tubum polyfidum coallita. *Bacca* sphaeroidea, sæpius utrinque retusa, diametro 8-pollicari, æqualis, luteo-viridis, in 12, & amplius loculos divisa : pulpâ vesiculari rubrâ, in aliis albâ, nunc dulci, nunc acidâ : cortice crassissimo, albo, fungoso, amaricante, inutuli. *Semina* ovata, sub-acuta, 2, 3 in quolibet loculo. Harum arborum sunt multæ varietates, fortasse species, quarum una præstantior sapore, & odore fructûs caulem habet minorem, similiter aculeatum, baccas sub-globosas, 5-pollicares, intus albas, dulcissimas, exterius flavescentes. Dicitur idiomate Sinico *Hiam yuen*, Cochinchinensi vero *Huong ten* : quod interpretatur Globus Odoratus.

Habitat frequenter in Cochinchinâ, & Chinâ.

Aurantium fructu omnium maximo Pumpelmus dicto. Burm. Zeyl. pag. 39. Limo Decumanus, Pompelmoes. Rumph. Amb. l. 2. c. 34. pag. 96. tab. 24. fig. 2.

Observ. Existimo multas alias dari species Citri in Indiâ, quarum aliquas vidi, sed non satis examinavi. Nec dici potest eas esse tantummodo varietates, prout habentur etiam in Europâ. Namque, ut bene notavit Rumphius, (Amb. l. 2. c. 40.) illæ in Europâ variant per artificiosam culturam, oculationem, & insitionem, quam artem plerique Indiani, maxime Cochinchinenses, penitus ignorant. Hæ vero nascuntur in sylvis, absque ullâ culturâ, & tamen constanti varietate, adeoque specie differre censendum, nisi tam levis, aut minus constans sit differentia, quæ dissuadeat.

Quæ a Linnæo dicitur Citrus Trifoliata huic generi prorsus repugnat. Quique Auctores illam a Kæmpfero prius expositam Citro adjudicarunt, videntur recentis plantæ corollam, stamina, & baccam non observasse : certè non fatentur, nec accuratè exponunt. Vide supra Class. 5. G. 58. Triphasia Aurantiola. Ubi notabis characterem Genericum a me ex vivâ plantâ diligenter excerptum planè differre a Citro : notas vero specificas, & habitum omnimodo convenire Trifoliatæ.

GENUS II. MELALEUCA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus, superus. *Cor.* 5-petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora. *Stylus* 1, *Caps.* semivestita calyce baccato, 3-valvis, 3-locularis. Lin. sy. pl. G. 978.

Sp. MELALEUCA LEUCADENDRA. α Cây Tiam. Lin. sp. 1.
Differ. spec. Mel. *foliis* linearilanceolatis, quinque-nerviis, sparsis :
spicâ longâ apice foliosâ. Hab.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, trunco alto, flexuoso: ramis ascendentibus, incomptis, paucis: cortice crasso, pallido, lamellato, fissili, tenaci. *Folia* lineari-lanceolata, integerrima, 5-nervia, plana, recta, cinerea, odorata, duriuscula, sparsa, petiolata. *Flos* albus, sessilis: spicis longis, sub-terminalibus, apice in folia homogenea rursus erumpentibus: bracteis floralibus minutis, ovatis, acutis. *Calyx* tubulosus, 5-fidus: tubo sub-rotundo, coriaceo, rubro-fusco: laciniis rotundatis, deciduis. *Corolla* petala 5, sub-rotunda, concava, calyce longiora. *Filamenta* 40 circiter, in 5-6 fasciculos connata, longa, capillaria, inæqualia, margini tubi calycis infidentia. *Antheræ* minimæ, ovatæ, incumbentes. *Germen* inferum, sub-rotundum, 3-lobum, calyce cinctum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum. *Pericarpium* capsula sub-rotunda, 3-ocularis, 3-valvis, apice dehiscentis: calyce truncato (laciniis decidentibus) semivestita. *Semina* multa, oblonga, compresso-angulata, minima.

Habitat frequens in sylvis Cochinchinæ.

Melaleuca Leucadendron, Latifolia, & Angustifolia. Lin. Jun. sup. pl. syst. veget. pag. 342. Arbor Alba. Rumph. Amb. l. 2. cap. 25. tab. 16. & cap. 26. tab. 17.

Usus. Cortice hujus arboris in laminas flexiles divisso utuntur quotidie indigenæ ad obturandas rimas quarumdam navium, quarum tabulæ non clavis, sed funiculis ligantur. Item ad tegendas domos, & quidquid aliud aeri expositum ab ejus mutationibus servare volumus longo tempore indemne.

Virtus: foliorum. Attenuans, Roborans, Stomachica, Diuretica, Emmenagoga. Valet in Obstructione hepatis, Hydrope, debilitate ventriculi, difficultate respirationis, mensium, aut lochiorum suppressione. Hoc decocto utuntur commodè Cochinchinenses viatores ad præcavenda mala ex cibis crassioribus venalibus in diversoriis.

POLYANDRIA.

† GENUS III. BALSAMARIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 2-phyllum, coloratum, inferum: foliolis rotundis, concavis, deciduis.

Cor. Petala 6, oblongo-ovata, concava, patentia, calyce longiora.

Stam. Filamenta 200 circiter, corollæ breviora, connata in 5-6 fasciculos, receptaculo infidentes. Antheræ oblongæ, stantes.

Pist. Germen globosum, rubrum, nitidum. Stylus filiformis, longior

Ooo

stami-

staminibus. Stigma convexum, margine inequali.

Peric. Drupa globosa, lignosa, glabra, æqualis: nucleo rotundo, acuminato, folido, carnosio, oleoso.

Nom. Balsamaria, quasi Balsamum Mariæ, nomen est, quo in multis Indiæ locis hæc arbor vulgo cognoscitur.

Char. Gener. Cal. 2-phyllus, inferus. Cor. 6-petala. Stam. 200 circiter in 5-6 fasciculis. Stylus 1. Drupa globosa, 1-isperma.

† Sp. I. BALSAMARIA INOPHYLLUM. n. Cay Muu.

Differ. spec. Bals. foliis ovatis, sub-emarginatis, lineatis: racemis corymbosis, terminalibus.

Hab. Arbor supra mediocrem, trunco elato, tortuoso: cortice crasso, scabro, fusco: ramis incomptis, ascendentibus. Folia ovata, sub-emarginata, integerrima, transversè lineata, plana, dura, nitida, opposita: petiolis brevibus. Flos candidus, pulcherrimus, suavolens, racemis in formam Corymbi ordinatis, pedunculis longis, albis, sub-terminalibus. Calyx albus, viridi mixtus, undè a corolla dignoscitur, simulque ex foliorum brevitate, & rotunditate. Drupa globosa, 1-pollicaris, lævis, viridi-fusca: cortice exteriore tenui, succosa: interiore crassiore, lignosa: nucleo albo, laxo.

Habitat tam culta, quam agrestis in locis mediterraneis Cochinchinæ. Vidi etiam frequentem in Cambodiâ, & in sylvis Malaiorum juxta fretum Malacense.

Inophyllum flore 8-fido. Burm. Zeyl. pag. 131. Bitangor Maritima. Rumph. Amb. l. 3. c. 26. tab. 71. Ubi etiam dicitur Cajû Maria.

Observ. Circa florem hujus arboris variant Auctores. Burmannus dixerat 8-fidum. Rumphius loco citato ex 9, vel 10 petalis compositum: postea vero libro 4. capite 55. describens arborem dictam Lignum Clavorum dicit eam magnam affinitatem habere cum Bitangora, seu Cajû Maria, illique tribuit, sicut nos isti, calycem 2-phyllum, & corollam 6-petalam. Linnæus eam facit speciem Calophylli, cui (Gen. pl. ed. 6. pag. 266.) attribuit corollam 4-petalam, calycem nullum: at in Systemate plantarum, & Vegetabilium Characterem genericum decernit Calophyllo calycem 4-phyllum, Corollam 4-petalam. Sed nullus, quem viderim, advertit plantam esse Polyadelpham, sicut nos constanter observavimus in vivis arboribus, simul cum aliis notis supra descriptis. Eadem planta a Linnæo adscripta fuerat classi Polyandriæ, insuperque alia species ab eo dicta Calophyllum Calaba. Hanc ego non vidi, nec a loco dimovere præsumo: illi vero, re melius probatâ, novam classem, genus, & nomen debui decernere, ne confundantur.

Ulus. Truncus, rami, & folia scatent humore albo, crasso, tenacissimo:

fimo: quod collectum mutat colorem in viridem obscurum, diciturque Balsamum Mariæ. Valet in curatione vulnerum, quæ non admodum citò consolidat, sed prævalet in præcavendâ inflammatione, & putredine. Ex Druparum nucleis exprimitur abundans oleum, similiter viride, renue, & ingrati odoris, lychnis aptum, in re Medicâ balsamo inferius.

GENUS IV. GLABRARIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Nectarium* receptaculi setis longitudine *Calycis*. *Stam.* 30: setis semper connexis. *Drupa*. *Lin.* sy. pl. G. 975.

Sp. 1. GLABRARIA TERSA. α Cây Pháo lúi. *Lin.* sp. 1.

Differ. spec. *Glab.* foliis ovato-lanceolatis, alternis: pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, superius scabriuscula, subtus cinerea, petiolata, alterna, sparsaque. *Flos* albus, parvus, pedunculis polyfloris, brevibus, lateralibus. *Florem* non examinavi, quamvis, arborem obviam habuerim.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ.

Lignum Leve: *Halaur.* *Rumph.* *Amb.* 1. 4. c. 38. tab. 43.

Ulus. *Lignum* est levissimum, pallidum, acris odoris, crassis, & pilosis constans fibris, ab insectis, & putredine immune, dummodo siccum servetur; ideoque ad superiora ædificiorum tigna maxime idoneum.

GENUS V. HYPERICUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa in 5 phalanges basi connata. *Capsula*. *Lin.* sy. pl. G. 981.

Sp. 1. HYPERICUM OLYMPICUM? α Le ngành thảng, ở Hoàng xã,

Differ. spec. *Hyp.* floribus trigynis: calycibus acutis: staminibus corollâ brevioribus: caule fruticoso. *Lin.* sp. 9.

Hab., & notæ. *Arbor* 10-pedalis, ramis patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* luteus, pedunculis incanis, sub-bifloris, lateralibus, & terminalibus: calycibus 5-partitis, acutis: corollis 5-petalis, integerrimis. *Stamina* in 3 phalanges elevata. *Styli* 3. *Capsula* 3-ocularis, polysperma.

Habitat incultum in Cochinchinâ, & Cantone Sinarum.

Hort. *Cliff.* pag. 380. *Hypericum* Orientale, flore magno. *Tournef.*

Inst. *Corol.* pag. 19.

Sp. 2. HYPERICUM PETIOLATUM. ♀ Hoàng niêu thâu.

Differ. spec. Hyp. floribus trigynis: foliis ovatis, petiolatis, integerrimis: caule fruticoso, tetragono, compresso. Lin. Sp. 10.

Hab. & notæ. Caulis fruticosus, multiplex, 3-pedalis, angulatus, diffusus. Folia lato-lanceolata, integerrima, vix tomentosa, opposita, petiolata. Flos flavo-ruber, axillaris, & terminalis, pedunculis paucifloris. Stamina phalanges 3, elevata: glandulis totidem, alternis, magnis, ad basim sitis. Styli 3. Capsula 3-locularis, polysperma.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Lin. Syst. Veget. pag. 583. sp. 7.

† Sp. 3. HYPERICUM COCHINCHINENSE. α Le ngành do.

Differ. spec. Hyp. floribus trigynis: foliis sub-petiolatis, densissimis: caule arboreo: pedunculis sub-quinquefloris, axillaribus.

Hab. & notæ. Arbor mediocris, 16-pedalis: ramis ascendentibus: ramulis plurimis, obscuro-rubentibus. Folia lanceolato-ovata, obtusa, integerrima, glabra, densissima, parva, opposita, sub-petiolata. Flos coccineus, pedunculis sub-quinquefloris, axillaribus. Calyx 5-partitus, laciniis acutis, integris. Corolla petala 5, ovato-oblonga, integra, patentia. Nectarium glandulis 3, magnis, reclinatis. Stamina 100 circiter, in tria corpora coalita. Styli 3. Capsula ovata, colorata, 3-locularis, polysperma: seminibus oblongis, planiusculis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Ufus. Lignum hujus arboris rubescit: grave, durum, ac tenax est; ad eaque opera aptissimum, quæ pondus, & impetum ferunt cedendo potius ne frangantur: quales sunt navium remi, & antennæ. Florum succus tingit colore aureo.

† Sp. 4. HYPERICUM AUREUM. ♀ Guéi thoung hōa.

Differ. spec. Hyp. floribus semipentagynis: pedunculis sub-divisis, terminalibus: caule fruticoso.

Hab. & notæ. Caulis fruticosus, 3-pedalis, erectus, multiplex, teres, ramis reclinatis. Folia oblonga, obtusa, integerrima, glabra, opposita, sessilia, nec amplexicaulia. Flos maiusculus, nitidè aureus, staminibus, & pistillo concoloribus: pedunculis sub-divisis, terminalibus, paucifloris. Calyx 5-partitus, coloratus. Corolla petala 5, oblonga, patentia. Stamina multa, corollâ breviora, in 5 plalanges ordinata: antheris sub-rotundis, minusculis. Stylus 1, semi-5-fidus, corollæ æqualis, staminibus longior. Stigmata 5, simplicia. Capsula sub-ovata, 5-locularis, polysperma: seminibus oblongis, minimis.

Habitat

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum: colitur etiam ob florum nitorem, & pulchritudinem.

Observ. Suspicio hoc esse Hypericum Monogynum. Thunb. Jap. pag. 297. Quia plures notæ conveniunt. Sed non valeo certò statuere, cum Vir Clarissimus, cæteroquin solers observator, nec stylum 5-fidum memoret, nec phalanges staminum recenscat.

* Lemnifolium, corollæ omnibus ligatis.

<p>1. CICHORIUM. 2. POLIS. 3. LEONTODON. 4. SCORONILLA. 5. LACTUCA. 6. SONCHUS. 7. LAPPANA. 8. CANTHARUS. 9. CARDUS. 10. SCARABEUS. 11. SPILANTHUS. 12. AGERATUM.</p>	<p>1. CICHORIUM. 2. POLIS. 3. LEONTODON. 4. SCORONILLA. 5. LACTUCA. 6. SONCHUS. 7. LAPPANA. 8. CANTHARUS. 9. CARDUS. 10. SCARABEUS. 11. SPILANTHUS. 12. AGERATUM.</p>
--	--

CLAS-

474
CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *Semifosculosi: corollis omnibus ligulatis.*

- | | |
|----------------|---|
| 1. CICHORIUM. | <i>Recept. sub-paleaceum. Papp. sub 5-dentatus. Cal. calyculatus.</i> |
| 2. PICRIS. | <i>Recept. nudum. Papp. plumosus, stipitatus. Cal. calyculatus.</i> |
| 3. LEONTODON. | <i>Recept. nudum. Papp. plumosus, stipitatus. Cal. imbricatus, squamis laxis.</i> |
| 4. SCORZONERA. | <i>Recept. nudum. Papp. plumosus, stipitatus. Cal. imbricatus margine scariofo.</i> |
| 5. LACTUCA. | <i>Recept. nudum. Papp. pilosus, stipitatus. Cal. imbricatus margine scariofo</i> |
| 6. SONCHUS. | <i>Recept. nudum. Papp. pilosus, sessilis. Cal. imbricatus, gibbus.</i> |
| 7. LAPSANA. | <i>Recept. nudum. Papp. nullus. Cal. calyculatus.</i> |

** *Flores Capitati.*

- | | |
|----------------|--|
| 8. CARTHAMUS. | <i>Cal. squamis squarrosis, foliaceis.</i> |
| 9. CARDUUS. | <i>Cal. squamis spinosis, ventricosus.</i> |
| 10. SERRATULA. | <i>Cal. squamis acutiusculis, muticis imbricatus, sub-cylindricus.</i> |

*** *Flores Discoidei.*

- | | |
|-----------------|--|
| 11. SPILANTHUS. | <i>Recept. nudum. Papp. 2-aristatus. Cal. sub-æqualis.</i> |
| 12. AGERATUM. | <i>Recept. nudum. Papp. 5-aristatus. Cal. sub-æqualis. Corollulæ 4-fidæ.</i> |

13. CACALIA. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. calyculatus.*
14. CHRYSOCOMA. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. imbricatus. Pist. brevissima.*
15. EUPATORIUM. *Recept. nudum. Papp. plumosus. Cal. imbricatus. Pist. longissima.*
16. CALEA. *Recept. paleaceum. Papp. pilosus. Cal. imbricatus.*
17. BIDENS. *Recept. paleaceum. Papp. aristatus. Cal. imbricatus.*
18. PTERONIA. *Recept. fetis partitis. Papp. sub-plumosus. Cal. imbricatus.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

19. ARTEMISIA. *Recept. sub-nudum. Papp. nullus. Cor. radii nulli.*
- † 20. CENTIPEDA. *Recept. nudum. Papp. nullus. Cor. disci 8, 4-fidæ. Sem. scrofa.*
21. COTULA. *Recept. sub-nudum. Papp. marginatus. Cor. disci 4-fidæ.*
22. BACCHARIS. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cor. fæminæ hermaphroditis mixtæ.*
23. CONYZA. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cor. radii 3-fidæ.*
- † 24. PLACUS. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cor. radii nullæ: disci 5-fidæ.*
25. GNAFALUM. *Recept. nudum. Papp. plumosus. Cal. scariosus: squamis concavis.*
26. XERANTHEMUM. *Recept. paleaceum. Papp. sub-setaceus. Cal. scariosus: radio explanato.*

** Flores Radiati.

27. MATRICARIA. *Recept. nudum. Papp. nullus. Cal. squamis imbricatis, acutis.*
28. CRHYSANTHEMUM. *Recept. nudum. Papp. nullus. Cal. squamis intimis scariosis.*
29. ERIGERON. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cor. radii capillares.*
30. SOLIDAGO. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cor. radii sub-seni, remoti.*
31. CINERARIA. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. æqualis, simplex.*
32. SENECEO. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. squamis apice sphacelatis.*
33. TUSSILAGO. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. squamis sub-membranaceis.*
34. ASTER. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Cal. sub-squarrosus.*
35. TAGETES. *Recept. nudum. Papp. aristatus. Cal. 1-phyllus.*
36. SIEGESBECKIA. *Recept. paleaceum. Papp. nullus. Radius dimidiatus.*
37. ECLIPTA. *Recept. paleaceum. Papp. nullus. Corollule disci 4-fidæ.*
38. BUPHTHALMUM. *Recept. paleaceum. Papp. marginatus. Stigma hermaphroditum simplex.*
39. VERBESINA. *Recept. paleaceum. Papp. aristatus. Flosculi radii circiter 5.*

POLYGAMIA FRUSTRANA.

40. GORTERIA. *Recept. nudum. Papp. pilosus. Radius corollæ ligulatus.*

- 41. CENTAUREA. *Recept. fetosum. Papp. pilosus. Radius corollæ tubulosus.*
- 42. COREOPSIS. *Recept. paleaceum. Papp. aristatus. Cal. calyculatus.*
- 43. HELIANTHUS. *Recept. paleaceum. Papp. aristatus. Cal. squarrosus.*

P O L Y G A M I A S E G R E G A T A.

- 44. SPHERANTHUS. *Recept. multiflorum. Papp. nullus. Polygamia necessaria.*
- † 45. ENYDRA. *Cal. com. 4-phyllus : partialis 1-florus. Flosc. omnes tubulosi : hermaphroditii, & foeminei. Pappus nullus.*

M O N O G A M I A.

- 46. IMPATIENS. *Cal. 2-phyllus. Cor. 5-petala, irregularis. Caps. supera, 5-valvis.*
- 47. VIOLA. *Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala, irregularis. Caps. supera, 3-valvis.*
- 48. LOBELIA. *Cal. 5-dentatus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. infera, 2-ocularis.*
- † 49. SOLENA. *Cal. 5-dentatus. Cor. nulla. Bacca polyperma.*

POLYGAMIA ÆQUALIS.

GENUS I. CICHORIUM.

1 Char. Gener. *Receptac.* sub-paleaceum. *Cal.* calyculatus. *Papp.* sub-5-dentatus, obfoletè pilosus. Lin. fy. pl. G. 1000.

Sp. 1. CICHORIUM ENDIVIA. 𣎵 Khú tsái. 𣎵 Khú chao.

Differ. spec. *Cic. floribus* solitariis, pedunculatis: *foliis* integris cre-

natis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, teres, crassus, ramosus. *Folia* ad radicem multa, magna, sub-cuneiformia, sinuato-dentata, utrinque glabra: suprema lanceolata, parva. *Flos* dilutè cæruleus, solitarius, pedunculatus. Sapor plantæ amaricans: odor nullus. Esculenta, Refrigerans.

Habitat in locis Borealibus imperii Sinensis.

Thunb. Jap. pag. 304. *Intybus fativa*; *latifolia*, sive *Endivia vulgaris*. Bauh. Pin. pag. 125. n. 1.

GENUS II. PICRIS.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* plumosus. *Sem.* transversè fulcata. Lin. G. 986.

† Sp. 1. PICRIS REPENS. 𣎵 Hú hoim lién. 𣎵 Hò hoàng lién.

Differ. spec. *Pic. perianthis* exterioribus imbricatis, brevibus: interioribus cylindræis, 8-phyllis, lævibus: *caule* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, procumbens, repens, tenuis, teres, glaber. *Folia* lanceolato-linearia, obtusa, repanda, denticulata, glabra. *Flos* semiskosculosus, luteus: pedunculis longis, paucifloris, sparsis, foliis sub-æqualibus. *Calyculus* brevis imbricatus: *calyx* interior oblongus, teres, 8-phyllus, foliolis linearibus, lævibus, æqualibus. *Corollulæ* omnes hermaphroditæ, ligulatæ, 5-fidæ. *Pappus* sub-plumosus, stipitatus. *Semina* in longitudinem (non transversè) fulcata. Radix tenuis, amarissima.

Habitat spontanea Cantone Sinarum. Est alia planta, ejusdem virtutis, saporis, & nominis, sed caule erecto, & radice crassiusculâ, quam solummodo pictam vidi in herbariis Sinensibus.

Virtus: radicis. Deobstruens, Antifebrilis.

GENUS III. LEONTODON.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Cal.* imbricatus squamis laxiusculis. *Pappus* plumosus. Lin. sy. pl. G. 99r.

† Sp. I. LEONTODON SINENSE. ꞑ Pú cūm tsào, ꞑ Bô coung anh.
Differ. spec. Leont. *Calyce* supernè reflexo: foliis oblongis: infernè runcinatis.

Hab., & notæ. *Herba* annua, acaulis. *Folia* turbinato-oblonga, apice rotundata, integerrima: inferius runcinata, glabra, sessilia, in orbem expana. *Pedunculi* 1-flori, longi, erecti, glabri. *Calyx* sub-erectus, squamis acutis, laxis, supremis reflexis. *Corolla* aurea, tota ligulata. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat incultum apud Sinas.

Virtus. Attenuans, Resolvens, Mundificans.

GENUS IV. SCORZONERA.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus, squamis margine scariosis. Lin. sy. pl. G. 985.

† Sp. I. SCORZONERA PINNATIFIDA. ꞑ . . .

Differ. spec. Scor. *foliis* pinnatifidis, semiamplexicaulibus: *paniculâ* diffusâ, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, debilis, 3-pedalis, ramosus. *Folia* pinnatifida, denticulata, crassa, glabra, semiamplexicaulia. *Flos* semistofculosus, dilutè luteus, paniculâ diffusâ, terminatâ pedunculis sub-umbellatis. *Calyx* oblongus, imbricatus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus.

Habitat spontanea in continenti Africæ, Orientalis, prope Mozambicum.

GENUS V. LACTUCA.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* simplex, stipitatus. *Semina* lævia. Lin. sy. pl. G. 988.

Sp. I. LACTUCA SATIVA. ꞑ Rau diep tau, ꞑ Yé tsai: Kíú.

Differ. spec. Lact. *foliis* rotundatis, caulinis cordatis: *caule* corymbofo. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, crassus, glaber, albicans, corymbofo-ramosus. *Folia* turbinato-rotunda, plicato-

Ppp ii

to-

480. SYNGENESIA. POLYGAMIA ÆQUALIS:

to-rugosa, glabra, concava, petiolata, imbricata, margine sinuata. *Flos* luteus, semiflosculosus, terminalis, bracteis cordatis: *calyce* cylindrico, imbricato: *pappo* piloso: *receptaculo* nudo: *seminibus* lævibus.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Macai Sinarum ex semine ab Europâ oriundo.

Thunb. Jap. pag. 300. Bauh. Pin. pag. 122. n. 1.

Ufus. Oulus est salubre, & refrigerans, maximè gratum tempore æstatis.

Sp. 2. LACTUCA SALIGNA. α Rau di ep hoang.

Differ. spec. *Lact.* foliis hastato-linearibus, sessilibus, carinâ aculeatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, erectus, teres, albicans, ramosus. *Folia* sub-hastato-linearia, semiamplexicaulia, glabra, inermia, integerrima. *Flos* albus, semiflosculosus, paniculâ terminali.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Lactuca Sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis, superioribus acuminatis, integris. Rai. Suppl. 135.

Sp. 3. LACTUCA INDICA. α Rau di ep nhâ.

Differ. spec. *Lact.* foliis lanceolato-ensiformibus, sessilibus, inæqualiter dentatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, teres, glaber. *Folia* oblongo-lanceolata, pinnato-sinuata, inæqualiter dentata, glabra, inermia: caulina sub-rotunda, integerrima, perfoliata. *Flos* semiflosculosus, dilute luteus, paniculâ erectâ, terminali. *Calycis* imbricatus, oblongus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex, stipitatus.

Colitur in Cochinchinâ, sapore multo inferior Sativâ.

Obeck. It. ad Ind. Orient.

GENUS VI. SONCHUS.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Calycis* imbricatus, ventricosus. *Pappus* pilosus. Lin. sy. pl. G. 987.

Sp. 1. SONCHUS FLORIDANUS. β. Nieu II foi.

Differ. spec. *Sonch.* pedunculis sub-squamosis: foliis lyrato-hastatis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 4-pedalis, erectus, teres, glaber, ramosus. *Folia* lyrato-hastata, sessilia. *Flos* luteus, terminalis, multus: pedunculis squamosis.

Habitat.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.
 Sonchus annuus Canadensis, altissimus, laciniatus, flore cærulefcente.
 Vaill. Act. Par. 1721. pag. 198.

Sp. 2. SONCHUS SIBIRICUS. β. Xào tù.
 Differ. spec. Sonch. *pedunculis* squamatis: *foliis* lanceolatis, indivisis, sessilibus. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, simplex, erectus, teres. *Folia* lanceolata, indivisa, sub-denticulata, glabra, sessilia. *Flos* luteus, paniculâ magnâ, patente: *pedunculis* squamosis. *Calyx* oblongus, ventricosus, imbricatus, lævis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus. *Elosoali* ligulati.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.
 Lactuca salicis folio, flore cæruleo. Amman. Ruth. pag. 150. n. 211.
 Sonch. foliis lanceolatis, sessilibus, plerumque denticulatis. Gmel. Sibir. 2. pag. 11. tab. 3.

GENUS VII. LAPSA NA.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Cal.* calyculatus, squamis fin-
 gulis interioribus canaliculatis. Lin. fy. pl. G. 998.

Sp. 1. LAPSA NA RHAGADIOLUS. α. Cai nhâ thoi.
 Differ. spec. *Lapl. Calycibus* fructus undique patentibus: *radiis* subulatis: *foliis* lyratis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, teres, striatus. *Folia* oblonga, lyrato-dentata, laciniis acutis. *Flos* croceus, semifosculosus, pedunculis sub-divisis, lævibus, terminabilibus. *Calyx* calyculatus, in maturitate undique patens. *Seminis* pappo in aliquibus piloso, in aliis nullo.

Habitat inculta in hortis, & agris Cochinchinae.
 Rhagadiolus edulis Hieracio affinis. Bauh. hist. 2. pag. 1014. Rhagadiolus Lapsanae foliis. Tourn. Inst. Cor. pag. 36.

GENUS VIII. CARTHAMUS.

Char. Gener. *Cal.* ovatus, imbricatus: *squamis* apice sub-ovatis, foliaceis. Lin. fy. pl. G. 1009.

Sp. 1. CARTHAMUS TINCTORIUS. α. Cây Rum. Diêu Khanh. & Hùm lân hĩa.

Differ. spec. *Cart. foliis* ovatis, integris, ferrato-aculeatis. Lin. sp. 1.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 5-pedalis, rectus, teres, fir-

18482 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS,

firmus, parum ramosus. *Folia* ovato-oblonga, serrato-aculeata, alternata, sub-petiolata. *Flos* croceo-ruber, *pedunculis* 1-2-floris, terminalibus. *Calyx* ovatus, imbricatus, squamis infimis foliiformibus, aculeatis. *Corollule* omnes tubulosæ, hermaphroditæ, longæ, tenues, 5-fidæ. *Semina* ovata, sub-angulata, lævia, fulco-pallida: *pappo* sub-piloso. *Receptaculum* convexo-planum, pilis longis stratum.

Habitat abundanter cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Cnicus Indicus: Cassamba. Rumph. Amb. l. 8. cap. 38. tab. 79. fig. 2.

Cnicus Sativus, sive Carthamus officinarum. Bauh. Pin. pag. 378. n. 1.

Virtus: feminum. Purgans. Florum Eccoprotica, Resolvens, Emmenagoga. Valer præcipue in dolore ventris, & aliis symptomatibus ex suppressione lochiorum ortis.

Ufus. Florum succo imbuuntur telæ pulcherrimo colore roseo, cocineo, purpureo, aut violaceo. Ad extrahendam tincturam ex siccis floribus macerari debent prius cum sale aliquo fixo vegetabili: sed coloris elegantiam non exprimit, nisi postea admisceatur succus limonum, vel aliud acidum vegetabile.

GENUS IX. CARDUUS.

Char. Gener. *Cal.* ovatus, imbricatus, squamis spinosis. *Receptaculum* pilosum. Lin. sy. pl. G. 1004.

Sp. 1. CARDUUS LANCEOLATUS. 8 La di thao. Sião Ky.

Differ. spec. Card. *foliis* decurrentibus, pinnati-fidis, hispida: laciniis divaricatis: *calycibus* ovatis, spinosis, villosis: *caule* piloso. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, inermis, ad apicem villosus. *Folia* lanceolata, decurrentia, pinnati-fida, subtus albicantia, pubescentia. *Flos* capitatus, terminalis, pedunculis longis, 1-floris. *Calyx* ventricoso-ovatus, imbricatus, foliolis lanceolatis, inermibus. *Corollule* dilute purpureæ, deorsum refractæ. *Receptaculum* semi-ovatum, pilosum. *Pappus* pilosus, longus.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum: ubi hæc herba facillè auferunt porcos.

Carduus Lanceolatus, latifolius. Bauh. Pin. pag. 385, n. 6. Gmel. Sib. 2. pag. 66.

Sp. 2. CARDUUS TUBEROSUS. 8 Thù gin sên.

Differ. spec. Card. *foliis* petiolatis, sub-decurrentibus, sub-pinnatifidis,

SYNGENESIA. POLYGAMIA. ÆQUALIS. 3483

subdis, spinosus: *caule* inermi: *floribus* solitariis. Lin. sp. 16. Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, erectus, simplicissimus, inermis, pilosus: *radice* tuberibus multis fasciculatis, sub-fusiformibus, carnosis, dulcibus. *Folia* oblonga, sub-decurrentia, pinnatifida, inermia. *Flos* purpureus, terminalis, binatus: *calyce* ventricoso, spinoso: *corollulis* omnibus hermaphroditis, flosculosis, erectis.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.

Carduus pratensis, Asphodeli radice, foliis tenuiter laciniatis. Bauh. Pin. pag. 377. n. 4. Cirsum radicibus bulbosis: foliis semipinnatis. Hall. Helv. n. 177.

Virtus. Tubera hujus Cardui a Sinenfibus censentur Corroborantia, Phytisi, aut liturno morbo laborantibus prodesse.

GENUS X. SERRATULA.

Char. Gener. *Cal.* sub-cylindricus, imbricatus, muticus. Lin. fy. pl. G. 1003.

Sp. 1. SERRATULA MULTIFLORA. Differ. spec. Serr. *foliis* lanceolatis, subtus villosis, sub-decurrentibus, integerrimis: *caule* corymbose: *calycibus* cylindricis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, corymbofo-ramosus, densissimus, inermis. *Folia* lato-lanceolata, serrato-lyrata, glabra, sparsa. *Flos* rubescens, parvus, plurimus: *pedunculis* terminalibus, fastigiatis: *calyce* cylindraco, imbricato squamis bre- vibus, arctatis, muticis, apice conniventibus. *Corollule* tubulose, minime. *Pappus* pilosus. *Receptaculum* lanuginosum.

Habitat inculta Cantone Sinarum. Cirsum inerme, caulibus adscendentibus, foliis linearibus, infra cinereis. Gmelin. Sib. v. 2. pag. 71.

† Sp. 2. SERRATULA SCORDIUM. a Cay muoi tsoi: Trach lan. 4 Tsé lan.

Differ. spec. Serr. *foliis* lanceolatis, serratis, semialexicaulibus: *floribus* fastigiatis: *radice* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, semipro-cumbens, teres, crassiusculus: *ramis* paucis: *radice* longè repente. *Folia* lanceolata, acutè, & profunde serrata, inermia, lubrus to-mentosa, superius nitida, succosa, odora, semialexicaulia. *Flos* terminalis, purpureus, fastigiatus: *calyce* sub-cylindrico, imbrica-to, laxi, paucifloro. *Corollule* omnes tubulose, 5-dentatæ, her-maphroditæ: pistillo longitudine æquali. *Receptaculum* nudum. *Pap-pus* pilosus, sessilis. *Semina* oblonga, involucre proprio cincta.

Habi-

Habitat spontanea, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ: hîc verò duæ
 varietatē plantæ, habitu prorsus diversæ eodem nomine indicantur.
 Virtus: totius herbæ. Resolvens, Antiputridinosa, Diaphoretica, Em-
 menagoga. Internè valet in Hydropè, & mensum irregularitate.
 Externè in ulceribus putridis, & Gangrænâ.

GENUS XI. SPILANTHUS.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Papp.* aristis duabus: alterâ mino-
 re. *Cal.* sub-æqualis. Lin. sy. pl. G. 1011.

† Sp. 1. SPILANTHUS TINCTORIUS. α. Cham. lôn lá. β. . . .

Differ. spec. *Spil. foliis* lanceolatis, serratis, glabris: *pedunculis* po-
 lyfloris, terminalibus: *caule* diffuso.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, sub-procumbens, te-
 res, diffusus: radice repente. *Folia* lanceolata, inæqualiter serrata,
 utrinque glabra, enervia, opposita, succosa, lætè viridia. *Flos*
 albo-cæruleus, terminalis, polynatus: *calyce* hemisphærico, imbric-
 ato, æquali, foliolis obtulis. *Corollulæ* omnes hermaphroditæ, tu-
 bulbosæ. *Receptaculum* convexum, nudum. *Pappus* aristis tribus, ca-
 pitatis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Ufus. Folia contrusa dant optimam tincturam cæruleam, viridemque,
 faciliori methodo parabilem, & coloris nitore non inferiorem In-
 digoferæ Tinctoriæ.

Observ. Abecedaria Rumphii (Amb. l. 11. c. 35. t. 65.) vix a nos-
 trâ plantâ formâ differt, si pedunculos 1-floros, & laterales præ-
 termittamus: sed imprimis diversam esse judico, quia diligens Au-
 ctor de usu tinctorio prorsus tacet. Hoc usu, & aliquibus notis
 convenit cum Serratulâ Tinctoriâ (Lin. sy. pl. sp. 1.): at, præ-
 ter diversa folia, Pappi aristæ ad Spilanthum revocant.

GENUS XII. AGERATUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Papp.* 5-aristatus. *Cal.* oblongus, sub-
 æqualis. *Corollæ* 4-fidæ. Lin. sy. pl. G. 1016.

Sp. 1. AGERATUM CILIARE. α. . . .

Differ. spec. *Ag. foliis* ovatis, crenatis, obtusis: *caule* glabro, Lin.
 sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, crassus, gla-
 ber, sub-fuscus, ramosus. *Folia* ovata, sub-acuta, crenata, veno-
 sa, glabra, opposita. *Flos* terminalis, sub-umbellatus. *Calyx* sub-ova-
 tus;

tus, sub-æqualis. *Corollula* tubulosæ, hermaphroditæ, 5-fidæ. *Stamina*, & *stylus* calyci sub-æqualia. *Stigmata*. 2 filiformia, longa. *Corona seminum* cuspidibus 5 elevata. Receptaculum nudum. Habitat incultum prope Cantonem Sinarum. Centaurium ciliare minus, Bisnagaricum, Origani foliis amplioribus: floribus in umbellis. Pluk. Almag. 93. tab. 81. fig. 4.

GENUS XIII. CACALIA.

Char. Gener. Recept. nudum. Pappus pilosus. Cal. cylindricus, oblongus, basi tantum sub-caliculatus. Lin. sy. pl. G. 1013.

† Sp. 1. CACALIA PROCUMBENS. α Rau lui. β. . . .
Differ. spec. Cac. caule suffruticoso, procumbente: foliis ovato-lanceolatis, sub-ferratis, carnosis: racemis elongatis, interruptis.

Hab., & notæ. Caulis perennis, 9-pedalis, multiplex, procumbens, inermis, teres, æqualis, glaber, succosus, ramosus. Folia ovato-lanceolata, sub-ferrata, lætè viridia, carnosà, glabra, alterna, petiolata. Flos aureus, racemis terminalibus, elongatis, interruptis. Calyx cylindricus, lævis, calyculatus. Corollulæ omnes hermaphroditæ, tubulosæ, paucæ, longæ, limbi laciniis erectis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus, longus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ tam culta, quam agrestis.

Sonchus Volubilis. Rumph. Amb. 1. 8. c. 78. tab. 103. fig. 2.

Usus. Inter olera salubria habetur, & indigenarum mensis apponitur. Est varietas caulibus, & foliis subtus purpureis, cætera non differens.

† Sp. 2. CACALIA BULBOSA. α Cây Tam thât. β Sãn sât.

Differ. spec. Cac. foliis radicalibus lyratis: caule sub-nudo: paniculâ pauciflorâ.

Hab., & notæ. Radix bulbus sub-rotundus, nodosus, perennis. Folia radicalia oblonga, lyrata, denticulata, sub-carnosâ, petiolata, pauca. Caulis sesquipedalis, sub-nudus, erectus, teres. Flos aureus, pedunculo polyfloro, terminali. Calyx cylindricus: calyculus 5-phyllus, foliolis filiformibus, laxis. Corollulæ omnes tubulosæ: tubulis calycem superantibus, inflatis, reflexis: limbo brevi, connivente. Stigmata 2, longa, erecta.

Habitat culta, incultaque in Chinâ, & Cochinchinâ.

Virtus. Emolliens, Refrigerans, Resolvens. Usus potissimum externus.

Cataplasma resolvit tumores lenitque dolores mamillarum: convenit etiam in Erisipelate. Succus foliorum prodest in Ophthalmiâ antiquâ, rubore, & doloribus oculorum. Gargarisma dolores, & inflammationem faucium mitigat.

Sp. 3. CACALIA SONCHIFOLIA. α Cáy Măt tlang.

Differ. spec. Cac. *Caulis* herbaceo: *foliis* lyratis, amplexicaulibus, dentatis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, teres, erectus, interdum divifus, reclinatus. *Folia* oblonga, profundè lyrata, dentata, amplexicaulia, carnosa, pilosa, glauca: seminalia subrotunda, maculâ purpureâ lunatâ subtus notata. *Flos* purpurascens, paniculâ terminali, pauciflorâ. *Calyx* simplicissimus, oblongus, basi sub-ventricosus. *Receptaculum* nudum. *Flosculi* omnes tubulosi, pedicellis longis. *Pappus* pilosus, longus.

Habitat spontanea in agris, & hortis minus cultis in Cochinchinâ. Sonchus Amboinicus. Rumph. Amb. l. 8. c. 77. tab. 103. fig. 1.

Tagolina Lusonum, flore purpureo. Petiv. Gaz. tab. 80. fig. 13.

Virtus: totius herbæ. Abtengens.

Ufus. Tenera folia cruda edulia sunt.

† Sp. 4. CACALIA PINNATIFIDA. β Cien sãn săt.

Differ. spec. Cac. *foliis* pinnatifidis: *laciniis* lanceolatis, ferratis: *caule* herbaceo, tortuoso.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, tortuosus, crassus. *Folia* pinnato-incisa, laciniis lanceolatis, ferratis, glabris, nec carnosis. *Flos* luteus, panniculâ terminali, pauciflorâ. *Calyx* oblongus, teres, calyculatus. *Corollulæ* omnes hermaphroditæ, tubulosæ. *Pappus* pilosus.

Habitat prope Cantonem Sinarum inter Oryzæ segetes: unde vernaculum nomen Sinense *Cacalia Segetum*.

Observ. Invenitur apud Linnæum (sy. pl. vol. 3. pag. 712, & Mant. pag. 281) species Cacaliæ dicta Pinnatifida, cum pinnatifida non fit, sed bipinnata, quæ hoc nomine rectius indicatur a Linnæo Juniore. Suppl. pl. pag. 353. Nostra vero, cum habeat folia simplicia, nec pinnata, aut bipinnata, meliori jure Pinnatifidæ nomen, & locum occupabit.

GENUS XIV. CHRYSOCOMA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Calyx* hemisphæricus, imbricatus. *Stylus* vix flosculis longior. Lin. sy. pl. 1019.

Sp. 1. CHRYSOCOMA VILLOSA. α Rau cúc.

Differ. spec. Chryf. herbacea, *foliis* lanceolatis, villosis: *calycibus* artatis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, incanus,

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS. 487.

canus, ramosus. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, villosa, incana, alterna, sessilia. *Flos* luteus, umbellis parvis, terminalibus. *Calyx* arctus, pilosus, hemisphæricus, imbricatus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Coniza tomentosa, & incana, floribus luteis umbellatis. Amman. Ruth. pag. 141. n. 190. After incanus, calycibus laxis, oblongis, foliolis ex lineari lanceolatis, floribus nudis, umbellatis. Gmel. Sibir. 2. pag. 192. tab. 82. fig. 2.

GENUS XV. EUPATORIUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, longus. Lin. fy. pl. G. 1015.

Sp. 1. EUPATORIUM PURPUREUM. α Cay Bsch son.

Differ. spec. Eup. *foliis* quaternis, scabris, lanceolato-ovatis, inæqualiter serratis, petiolatis, rugosis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, simplex, striatus, parum ramosus. *Folia* congesta, sub-quaterna, ovato-lanceolata, sub-serrata, rugoso-aspera, sub-sessilia, obscuro-viridia. *Flos* purpureus, corymbo fastigiato. *Calyx* imbricatus, oblongus, sub-octoflorus: flosculis tubulosis hermaphroditis: *stylis* semibifido, longo. *Receptaculum*, sub-nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneum in agris Cochinchinæ.

Eupatorium Canadense, longioribus foliis, rugosis, integris, & caulibus ferrugineis. Moris. hist. 3. pag. 97. tab. 13. fig. 4.

† Sp. 2. EUPATORIUM SINUATUM. γ . . .

Differ. spec. Eup. *foliis* ovatis, sinuatis, pilosis, alternis: *calycibus* sub-octofloris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, hispidus. *Folia* ovata, sinuata, denticulata, pilosa, alterna. *Flos* purpurascens, sub-octoflorus, paniculis terminalibus. *Calyx* oblongus, imbricatus, flosculis tubulosis uniformibus. *Stylus* longus, semibifidus. *Receptaculum* concavum, nudum.

Habitat agreste in insulâ Africanâ Mozambicco.

GENUS XVI. CALEA.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus. Lin. fy. pl. G. 1021.

† Sp. 1. CALEA CORDATA. α Cay Bac dau.

Differ. spec. Cal. *floribus* sub-ternis: *foliis* cordatis, alternis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis, erectus, ramofus.

Folia cordata, sub-crenata, venosa, subtus tomentosa, alterna. *Flos* dilute purpureus, pedunculis 3-4-natis, terminalibus. *Corolla* composita, uniformis, flosculis hermaphroditis, tubulosis, æqualibus.

Calyx hemisphæricus, imbricatus. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* pilosus, brevis, in aliquibus sub-nullus.

Habitat spontanea in Cochinchinâ.

GENUS XVII. B I D E N S.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristis erectis, scabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno, alterove radiante intruitur. Lin. fy. pl. G. 1012.

Sp. 1. BIDENS PILOSA. α . . .

Differ. spec. Bid. *foliis* pinnatis, sub-pilosis: *caule* geniculis barbatis: *calycibus* involucre simplici: *seminibus* divergentibus. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, angulatus, geniculis barbatis. *Folia* imparipinnata, foliolis ovato-lanceolatis, ferratis, sub-pilosis. *Flos* terminalis, luteus, paniculis erectis, paucifloris. *Calyx* imbricatus, involucre patente, 5-phyllo, foliolis oblongis, parvis. Flosculi omnes sæpius hermaphroditi, tubulosi: interdum flosculi pauci fæminei, nudi in radio. *Semina* longiuscula, angulata, divergentia: *pappo* aristato. *Receptaculum* paleis oblongis, deciduis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Thunb. Japon. pag. 307. Agrimonia Molucca. Rumph. Amb. 1. 10. cap. 27. tab. 15. fig. 2.

Virtus. Radix Odontalgica. Folia Ophthalmica, & contra tussim, ac ambustiones valere dicuntur.

Sp. 2. BIDENS BIPINNATA. α Cay Loung den. β . . .

Differ. spec. Bid. *foliis* bipinnatis, incisis: *calycibus* involucre: *corollis* semiradiatis: *seminibus* divergentibus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplex, erectus, 2-pedalis, sub-quadragnus. *Folia* impari-bipinnata, bijuga: *foliolis* ovato-lanceolatis, serrato-incisis. *Flos* aureus, axillaris, 2-natus: *calycibus* imbricatis, squarrosis, apicibus squamarum reflexis. *Corollula* omnes hermaphroditæ: disci tubulosæ, longæ: radii ligulatæ, paucæ, bre-

SYNGENESIA. POLYGAMIA ÆQUALIS. 489

breves. *Semina* longissima. 4-gona, recurva: *pappo* 3-ristato. *Receptaculum* paleaceum.

Habitat spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 175. *Chrysanthemum* Chinense foliis plurifariam divisis, *Halicacabi* peregrini æmulis. Pluk. Phyt. tab. 22. fig. 4.

GENUS XVIII. PTERONIA.

Char. Gener. *Recept.* setis multipartitis. *Pappus* sub-plumosus. *Cal.* imbricatus. Lin. fy. pl. G. 1017

† Sp. 1. PTERONIA TOMENTOSA. β Chú hĩa mú.

Differ. spec. Pter. *foliis* lanceolatis, serratis, tomentosis, sparsis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, sesquipedalis, simplicissimus, rectissimus. *Folia* lanceolata, serrata, tomentosa, petiolata, sparsa.

Flos violaceus, paniculâ terminali. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Flosculi* omnes tubulosi, hermaphroditi. *Receptaculum* setosum.

Pappus pilosus. Pistillum vix corollæ æquale.

Habitat spontanea prope Cantonem Sinarum.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

GENUS XIX. ARTEMISIA.

Char. Gener. *Recept.* sub-villosum, vel nudiusculum. *Pappus* nullus.

Cal. imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. *Cor.* radii nullæ. Lin. fy. pl. G. 1025.

Sp. 1. ARTEMISIA JUDAICA. α Ngaoe phu duong, β Ngaoc fũ yong.

Differ. spec. Art. *fruticosa*, *foliis* ob-ovatis, obtusis, lobatis, parvis: *floribus* paniculatis, pedicellatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 1-pedalis, erectus, pollicem crassus, ramosissimus: *ramis* longis, patentissimis, reclinatis. *Folia* sessilia, sparsa, utrinque tomentosa, cinerea, crassa, graveolentia, obtusa: inferiora sub-turbinata, plerumque 3-lobata: superiora oblonga, integerrima. *Flos* luteus, paniculâ racemosa, terminali. *Corolla* sub-rotunda, parva, composita flosculis omnibus tubulosis. *Foliorum* formâ convenit cum Art. Japonicâ Thunb. Jap. pag. 310.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ.

Berg. Mar. Med. pag. 708. n. 416. *Artemisia* tota cinerea. Gron. Orient. 259. *Absinthium* Santonicum Judaicum, & Alexandrinum. Bauh. Pin. pag. 139. n. 1, 2.

Virt.

490 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA.

Virt. Foliorum, & seminum. Tonica, Stomachica, Anthelminthica.
Sapor amarus.

Observ. Folia non sunt ita parva ut in Palæstina, sed semipollicari magnitudine.

† Sp. 2. ARTEMISIA AQUATICA. α Gay thuy tung. β Hải tùm.

Differ. spec. Art. *Arborescens*, foliis multipartitis, utrinque glabris: laciniis capillaribus: racemis spicatis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, tortuosus, nodosus, 8-pedalis, crus crassus: ramis similiter distortis, patentibus, glabris, ramulis, petiolis, & pedunculis fulco-rubris. *Folia* sparsa, sub-rotunda, profundè multipartita, laciniis capillaribus, tenuibus, glabris, atrovirentibus, inodoris. *Flos* albus, minusculus, globosus: racemis longis, terminalibus, in spicas lineares desinentibus. *Flosculi* omnes tubulosi. *Receptaculum*, & *semina* nuda.

Habitat culta in Cochinchinâ; & Chinâ, puto, quod etiam agrestis.

Aquam amat, indeque nomen vernaculum. Per multos annos servatur in vase aquâ pleno crescens, & florens, a terrâ profus remota.

Observ. Affinitatem habet, vel fortasse est eadem cum Artemisîâ Cappillari Thunbergii. Japon. pag. 309.

Sp. 3. ARTEMISIA ABROTANUM. α Thanh hao. β Ỗn chĩn hĩa.

Differ. spec. Art. *fruticosa*, foliis setaceis, ramosis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* erectus, 3-pedalis, (in Cochinchinâ herbaceus, annuus) striatus, rectus, glaber, ramosissimus. *Folia* sparsa, petiolata, plurima, glabra, multifida, laciniis setaceo-linearibus, angustissimis, pallidè viridibus. *Flos* luteus, minimus, plurimus: spicis linearibus, erectis, terminalibus. *Calyx* imbricatus, foliolis brevibus, sub-conaiventibus. Sapor florum amaricans: foliorum sub-acutus. Odor gratus.

Habitat incultum, cultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 309. Abrotanum Campestre. Hill. Brit. herb. pag. 463. tab. 66. fig. 16. Abrotanum Mas; angustifolium. Bauh. Pin. 136. n. 3.

Virtus: foliorum, & florum. Tonica, Pellens, Emmenagoga. Extractum cum melle prodest in Chlorosî, & Phytis incipiente.

Sp. 4. ARTEMISIA ANNUA. β Tĩa cĩa.

Differ. spec. Art. foliis triplicato-pinnatis, utrinque glabris: floribus sub-globosis, nutantibus: Receptaculo glabro, conico. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, simplex, rectissimus, 8-pedalis, teres, striatus, glaber, viridis, in senectute rubro-fuscus, sub-lignosus: ramis obliquis, trifariam alternis. *Folia* pinnata, pinnis 2-pinnatifidis, oblongis, sub-acutis, utrinque glabris. *Flos* di-

dilute luteus, racemis oblongis, erectis, axillaribus, plurimis: pedunculis propriis longiusculis, bracteâ lanceolatâ, integerrimâ comitante. *Calyx* hemisphæricus, imbricatus bino ordinæ, foliolis oblongis, incurvis, sub-conniventibus. *Flosculi* omnes hermaphroditi, tubulosi, 5-fidi, breves. *Receptaculum* ovarum, sub-villosum. *Pappus* nullus. Integer flos grano Piperis minor est. Tota planta suavissimum odorem spirat, etiam post longum tempus exsiccata.

Habitat prope Pekinum Sinarum: unde semina in Lusitaniam detuli; quæ hîc facile germinant, plantas ad altitudinem 10 pedum spontaneè emittentia.

Abinthium Tanaceti folio odoratissimum. Amman. Ruth. pag. 142. n. 193. tab. 23. *Artemisia* radice annuâ, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis: calycibus sub-rotundis, ferè erectis ex alis copiosissimis. Gmel. Sibir. 2. pag. 125. n. 108.

Virtus: foliorum, & florum. Balsamica, Tonica. Prodest in febris hecticis, in dysenteria, & ulceribus putridis.

Sp. 5. ARTEMISIA VULGARIS. ๔ Thuốc kaur. ๘ Ngai yê.

Differ. spec. Art. *foliis* pinnatifidis, planis, incis, subtus tomentosis: racemis simplicibus, recurvatis: florum radio 5-floro. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* simplex, annuus, erectus, teres 4-pedalis: radice perenni, repente: ramis teretibus, ascendentibus. *Folia* pinnatifida, laciniis incis, acutis, planis, subtus incanis, tomentosis. *Flos* pallidus, sub-globosus, sub-sessilis, spicis linearibus, terminalibus. *Foliola* calycis longiuscula, rotundata, conniventia. *Corollule* disci 5-fidæ, hermaphroditæ, tubulosæ, breves: radii femineæ, paucæ. *Receptaculum* sub-villosum. *Pappus* nullus.

Habitat inculta, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Indiæ pag. 177. Thunb. Jap. pag. 310. *Artemisia* Latifolia.

Rumph. Amb. 1. 8. c. 54. tab. 91. fig. 2.

Virtus: foliorum, & florum. Tonica, Balsamica, Deobstruens, Emmenagoga, Stomachica, Antispasmodica. Valet in Chlorosi, Cachexia, Nauseâ. Externè in ventriculi doloribus, ulceribus putridis; & cum oleo sesami contusa tollit, vel saltem lenit dolores, & contractiones membrorum, eorumque motus convulsivos: quod apud indigenas familiare remedium, & a Rumphio pariter commendatum.

Observ. Hæc planta tam formâ, quam qualitibus est quasi media inter Artemisiam Vulgarem, & Abinthium. Odor balsamicus, nec ingratus. Sapor vix amaricans. Virtus utriusque, aut etiam superior.

Sp. 6. ARTEMISIA CHINENSIS. β Khl' ngdi.

Differ. spec. Art. *foliis* simplicibus, tomentosis, obtusis, lanceolatis : inferioribus cuneiformibus, trilobis. Lin. sp. 22.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplex, 2 pedes cum semisse asurgens, rectus, crassus, multo tomento albescens, ramosus. *Folia* inferiora obtusa, 3-loba : superiora lanceolato-lineararia, integerrima, utrinque tomentosa, sessilia, plurima, conferta, sparlaque. *Flos* parvus, pallidus, racemis terminalibus, erectis. Planta inodora, & fere insipida.

Habitat Cantone Sinarum.

Artemisia foliis radicalibus a caulinis diversis. Gmel. Sibir. 2. pag. 61. fig. 1, 2.

Abinthium maritimum Sinarum, Lavendulæ folio, pulchrioribus corymbis, inodorum, sapore aromatico. Pluk. Amalt. 3. tab. 153. fig. 5.

Virtus. Ex plantæ hujus foliis exsiccatiss, & contusis fit *Moxa*, seu cauterium actuale non spernendæ efficacitæ ad discutiendos tumores, & dolores rheumaticos, ac arthriticos, levesque convulsiones. In hunc finem solent Medici Sineses uti hac specie Artemisitæ : at Cochinchinenses utuntur Artemisîâ Vulgari, supra descriptâ, sicut etiam Japonenses, testibus Thunbergio, & Kœmpfero : quam ego experientiâ ductus judico efficaciorern. Nec audiendi sunt Leuwenhœkii, & alii, qui putant eundem effectum sortiri posse Gossypium, vel solum ignem; nam propria virtus hujus plantæ Antispasmodica, & Deobstruens igne actuali agitata, & intrusa proculdubio efficacius operabitur.

† GENUS XX. CENTIPEDA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis imbricatus bino ordine, squamis oblongis, concavis, erectis, glabris, exterioribus coloratis.

Cor. Composita discoidea : flosculi hermaphroditi 8 circiter in disco : foeminei petalis nudi, plurimi in radio. Propria hermaphroditis infundibuliformis, brevissima : limbo 4-fido.

Stam. Filamenta hermaphroditis sub-nulla. Antheræ 5, in cylindrum connatæ.

Pist. Hermaphroditis Germen oblongum. Stylus crassus, brevissimus. Stigma 2-fidum, minimum.

Foemineis similiter, sed omnia tenuiora.

Sem. Omnibus solitaria, oblonga, sub-teretia : setis inversis hispida. Pappus nullus.

Recc-

Recept. Hemisphaericum, nudum.

Nom. Centipedam vocavi ob ramulos centuplicatos, quibus hæc planta terræ incumbit.

Char. Gener. Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. imbricatus, squamis erectis, coloratis. Sem. fetis inversis.

† Sp. I. CENTIPEDA ORBICULARIS. α Co the.

Differ. spec. Cent. procumbens, ramosissima: foliis dentatis: floribus axillaribus, solitariis.

Hab. Herba annua: caule 4-pollicari, procumbente, ramosissimo, terræ in orbem appresso: radice repente. Folia minuscule, sparsa, glabra, sub-cuneiformia, dentibus 2-4, nunc oppositis, nunc alternis. Flor. purpurascens, solitarius, sessilis, axillaris. Odor plantæ sub-nullus. Sapor acer.

Habitat inculta in agris Cochinchinae.

Artemisia Minima. Lin. sy. pl. v. 3. pag. 746. Burm. Ind. pag. 177. tab. 58. fig. 3.

Observ. Minus differt ad Artemisiam Carpesium, quam Centipeda. Cur ergo illud privatum Genus afferet, non ista?

GENUS XXI. COTULA.

Char. Gener. Recept. sub-nudum. Pappus marginatus. Corollulae disci 4-fidæ: radii fere nullæ. Lin. sy. pl. G. 1050.

Sp. I. COTULA ANTHEMOIDES. α Rau Kaóc.

Differ. spec. Cot. foliis pinnato-multifidis dilatatis: floribus flosculosis. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. Caulis herbaceus, 1-pedalis, sub-erectus, pilosus, ramosus. Folia multifida, pinnato-incisa, pubescentia. Flor. luteus, sub-globosus, solitarius, pedunculis longis. Calyx sub-simplex, polyphyllus. Corollulae disci 4-fidæ, tubulosæ, hermaphroditæ: flosculi radii feminei, nudi. Receptaculum nudum. Pappus sub-nullus.

Habitat agrestis in agris, & hortis Cochinchinae.

Corula foliis pinnato-multifidis: corollis radio destitutis. Cliff. pag. 417. Anantocyclus Chamæmeli folio. Dill. Elth. 26. tab. 23. fig. 25.

GENUS XXII. BAGGHARIS.

Char. Gener. Recept. nudum. Pappus pilosus. Cal. imbricatus, cylindricus. Flosculi feminei hermaphroditis immixti. Lin. sy. pl. G. 1029.

Sp. 1. BACCHARIS DIOSCORIDIS. *α* Cây Tu bi. *β* Laông sú su.
 Differ. spec. Bac. *foliis* lato-lanceolatis, dentatis, sessilibus, stipulatis.
 Lin. sp. 5.
 Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus, teres: ramis multis debilibus, *Folia* lato-lanceolata, dentata, sessilia, alterna, semiamplexicaulia, atro-viridia, glabra, Caromatica, stipulata. *Flos* luteus, multus, corymbis terminalibus: *calyce* oblongo, imbricato: *pappo* piloso, longo: *receptaculo* nudo.
 Habitat tam agrestis, quam culta in Cochinchina & Chinâ.
 Lin. Jun. Sup. pl. pag. 366. Coniza maior, altera. Bauh. Pin. pag. 265. n. 2.
 Virtus: foliorum. Tonica, Cephalica.

† Sp. 2. BACCHARIS SALVIA. *α* Cây Đại bi.
 Differ. spec. Bac. *foliis* lanceolatis, denticulato-ferratis, tomentosis, basi appendiculatis: *paniculis* laxis, terminalibus.
 Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 8-pedalis, erectus, multiplex, teres, lanosus, albicans: *radice* sæpe repente. *Folia* lanceolata, denticulato-ferrata, rugosa, tomentosa, sparsa: *petiolis* pinnato-alatis. *Flos* luteus, paniculis magnis, patentibus, terminalibus. *Calyx* oblongus, sub-cylindricus, imbricatus, cinereus. *Flosculi* fœminei immixti hermaphroditis; tubulosi, erectis. *Pappus* pilosus flosculis longior. *Receptaculum* nudum. Odor plantæ balsamicus, salviæ Officinalis æmulus. Sapor amaricans.

Conyza Balsamifera. Lin. sy. pl. 3. pag. 774. sp. 15. *Conyza* Odorata, aut Helenium Salviæ odorem spirans. Clus. ex Doct. Colio. Exot. 1. 4. cap. 23. *Conyza* Odorata, Sombong. Rumph. Amb. l. 10. c. 41. tab. 24. fig. 1. *Salvia* Indica Arborefcens. Bont. Jav. l. 6. c. 60.
 Virtus: maximè foliorum. Calefaciens, Tonica, Stomachica, Uterina, Antispasmodica. Valet, tam internè, quam externè in Paralyfi, Stomachi, & artuum debilitate, Leucorrhœa.

Sp. 3. BACCHARIS CHINENSIS. *β* Xan po teng.
 Differ. spec. Bac. *foliis* lanceolatis, integerrimis, subtus tomentosis, petiolatis: *pedunculis* polyfloris, axillaribus.
 Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, simplex, teres. *Folia* lanceolata, integerrima, subtus tomentosa, alterna, petiolis brevibus. *Flos* luteus, oblongus, pedunculis axillaribus, polyfloris. *Calyx* cylindricus, imbricatus. *Corollulæ* hermaphroditæ tubulosæ, fœmineis mixtæ. *Pappus* pilosus, longus. *Receptaculum* nudum.

Habitat

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

GENUS XXIII. CONYZA.

Char. Gener. *Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. imbricatus, subrotundus. Cor. radii trifida. Lin. sy. pl. G. 1030.*

Sp. 1. CONYZA PUBIGERA. z. *Dau xương trắng.*

Differ. spec. Con. *foliis oblongis, sub-dentatis, sub-petiolatis: pedunculis lanatis, sub-bifloris. Lin. sp. II.*

Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus, 8-pedalis, scandens; teres, ramulosus. Folia lato-lanceolata, basi attenuata, sub-dentata, sub-pubescentia, sparsa, petiolata. Flos luteus, axillaris, sub-terminalis, pedunculis paucifloris. Calyx lanatus, albicans, squamis imbricatis, erectis. Corollula tam hermaphrodita, quam feminea: omnes breves, pappo piloso immerse, Receptaculum nudum.*

Habitat agrestis in Cochinchina.

Sonchus Vohubilis. Rumph: Amb. I. 8. cap. 78. tab. 104. fig. 11.

Sp. 2. CONYZA CANDIDA. z. *Bac dau com.*

Differ. spec. Con. *foliis ovatis, tomentosis: floribus confertis, pedunculis lateralibus, terminalibusque. Lin. sp. 13.*

Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus, albicans, ramulosus. Folia ovata, utrinque tomentosa, albicantia, integerrima, alterna. Flos purpureus, pedunculatus, congestus, lateralis, & terminalis. Planta grati odoris.*

Habitat inculta in Cochinchina.

Conyza Cretica, fruticosa, folio molli candidissimo, & tomentoso. Tournef. Inst. Corol. pag. 33. Vaillant. Act. Paris. 1719. pag. 394.

Sp. 3. CONYZA ODORATA. z. . .

Differ. spec. Con. *foliis ovatis, ferratis, sub-tomentosis, acutis: caule corymbose: corollis sub-globosis. Lin. sp. 17.*

Hab., & notæ. *Caulis fruticosus, 4-pedalis, erectus: ramis in formam Corymbi affurgentibus. Folia oblongo-ovata, sub-ferrata, tomentosa, sessilia, alterna. Flos purpureus, lateralis, & terminalis, polynatus, sub-rotundus, corollulis omnibus ultra calycem non prodeuntibus ob breviterem.*

Habitat agrestis in Cochinchina. Planta odorifera.

Burm. Ind. pag. 179. Conyza Odorata, minor, erecta, purpurascens, corymbosa, foliis ovatis, villosis. Brown. Jam. 318.

Sp. 4. CONYZA CHINENSIS. α Rau sông ăn gỏi.

Differ. spec. Con. *foliis* lanceolato-ovatis, reflexo-ferratis, subtus tomentosis: *floribus* terminalibus, congestis. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres, glaber, ad apicem ramosus. *Folia* lanceolato-ovata, sub-ferrata, duriuscula, petiolata, alterna. *Flos* luteus, congestus, pedunculatus, terminalis. *Calyx* imbricatus, ventricosus, ore connivens. *Corollulæ* radii foemineæ, 3-fidæ, tenuissimæ. *Pappus* pilosus. *Receptaculum* sub-villosum.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 179. Senecio Amboinicus. Rumph. Amb. l. 10. c. 25. tab. 14. fig. 2.

Sp. 5. CONYZA HIRSUTA. α Cỏ duối hùm. β Hỏ mĩ tsao.

Differ. spec. Con. *foliis* ovalibus, integerrimis, scabris, subtus hirsutis. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, erectus, simplex, teres, hirsutus, paucifolius. *Folia* oblonga, sub-acuta, denticulata, pilosa, sparsa. *Flos* luteus, confertus, terminalis. *Calyx* pilosus, brevis. *Flosculi* foeminei nudi in radio. *Pappus* simplex. *Receptaculum* nudum.

Habitat inculta in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Burm. Ind. pag. 180. Miller. Dict. n. 18.

† GENUS XXIV. PLACUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis imbricatus, inversè turbinatus: squamis linearibus, tenuibus, erectis.

Cor. Composita calyci æqualis, erecta: corollulæ hermaphroditæ tubulosæ, 5-fidæ, paucæ in disco: Foemineæ nudæ, plurimæ in radio.

Stam. Hermaphroditis: Filamenta 5, brevissima. Anthera cylindracea, tubulosa.

Pist. Utrisque Germen longiusculum. Stylus filiformis, brevis. Stigmata 2, oblonga: hermaphroditis erecta: foeminis reflexa.

Peric. nullum. Calyx immutatus.

Sem. Omnibus oblonga: foeminis tenuiora. Pappus pilosus.

Recept. nudum, convexum.

Nom. (Πλακός placenta) ab usu apud indigenas condiendi placentas succo odore hujus plantæ.

Char.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus, inversè turbinatus: squamis linearibus. *Cor.* radii nullæ.

† Sp. 1. PLACUS TOMENTOSUS. α Cúc bánh ít, hoa tím.
Differ. spec. Plac. *foliis* ovatis, obtusis, ferratis, utrinque tomentosis.

Hab. *Planta* herbacea, 2-pedalis, erecta, ramosa. *Folia* ovata, obtusa, ferrata, utrinque tomentosa, sessilia, alterna, odorifera. *Flos* violaceus, paniculis oblongis, erectis, terminalibus.

Habitat agrestis, cultusque in Cochinchinâ.

† Sp. 2. PLACUS LÆVIS. α Cúc bánh ít, hoa vàng.
Differ. spec. Plac. *foliis* ovatis, acuminatis, ferratis, glabris: *paniculis* brevibus.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, striatus, glaber, ramosus. *Folia* ovata, acuminata, ferrata, glabra, alterna. *Flos* pallidè luteus, paniculis brevibus, terminalibus. *Calyx* ad basim ventricosus, foliolis linearibus, imbricatis, erectis, lævibus. *Flosculi* radii foeminei, nudi. *Receptaculum* plano-convexum, nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXV. GNAPHALIUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus, squamis marginalibus rotundatis, scariofis, coloratis. Lin. sy. pl. G. 1026.

Sp. 1. GNAPHALIUM INDICUM. α Cây Sơn.
Differ. spec. Gnaph. herbaceum, *foliis* lanceolatis: *caule* ramosissimo diffuso: *corymbis* inæqualibus: *calycibus* intus coloratis. Lin. sp. 42.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, reclinator, ramis multis diffusis. *Folia* lanceolata, dentata, alterna. *Flos* purpureus, discoideus, sub-rotundus, terminalis, paniculâ erectâ: *calycis* squamis rubescentibus.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 177. Gnaph. latiore folio, minus ramosum, capitulis palliscentibus. Pluk. Almag. 172. tab. 187. fig. 5.

† Sp. 2. GNAPHALIUM SINUATUM. α
Differ. spec. Gnaph. herbaceum: *ramis* affurgentibus: *foliis* ovato-lanceolatis, sinuatis, dentatis, utrinque pilosis.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, simplex, erectus: *ramis* ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, inciso-sinuata, dentata, utrinque tomentosa, alterna, magna. *Flos* luteus, paniculis terminalibus, erectis: *calycis* squamis marginalibus rubris, membranaceis.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

GENUS XXVI. XERANTHEMUM.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* fetaceus. *Cal.* imbricatus, radiatus: radio colorato. Lin. fy. pl. G. 1027.

† Sp. 1. XERANTHEMUM CHINENSE. β Siao louc ngi.

Differ. spec. Xer., *caule* herbaceo, simplicissimo: *foliis* lanceolatis, ferratis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, teres, erectus, glaber, sesquipedalis. *Folia* lanceolata, ferrata, sub-glabra, alterna, petiolata. *Flos* luteus, radiatus, paniculâ terminali, pauciflorâ. *Calycis* squamæ intimæ apice reflexæ, flosculis longiores. *Semina* omnia coronata pappo multifeto. *Receptaculum* paleis deciduis fratum.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Sp. 2. XERANTHEMUM RFTORTUM. α Cúc ràng Kaa.

Differ. spec. Xer. *caulibus* frutescentibus, provolutis: *foliis* tomentosis, recurvatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, sesquipedalis, provolutus: *ramis* multis tortuosis diffusis. *Folia* oblonga, sinuato-incisa, tomentosa, incana, recurvata. *Flos* luteus, discoideus, corollis omnibus tubulosis, foemineis in radio. *Calyx* imbricatus, squamis patentibus, concoloribus, explanatis. *Receptaculum* sub-nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneum in agris Cochinchinæ.

Xeranth. receptaculis nudis, seminum pappo plumoso. Hort. Cliff. p. 400. Xeranthemoides procumbens, polii folio. Dill. Elth. tab. 322. fig. 415.

GENUS XXVII. MATRICARIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus: marginalibus solidis, acutiusculis. Lin. fy. pl. G. 1049.

† Sp. 1. MATRICARIA CANTONIENSIS. β Hi su tsu.

Differ.

SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 499

Differ. spec. Matr. *foliis* inferioribus serratis, summis integerrimis: *pedunculis* 1-floris: *flosculis* radii integri: *receptaculo* convexo.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, cespitosus, sub-erectus, ramosus. *Folia* lanceolata, inferiora serrata, suprema integerrima. *Flos* radiatus terminalis, solitarius, pedunculis erectis. *Calyx* imbricatus hemisphæricus, foliolis acutis. *Flosculi* disci lutei, 5-fidi, breves, sub-clausi. *Flosculi* radii fœminei, cærulei, ligulati, integerrimi. *Receptaculum* convexum, nudum. *Pappus* nullus.

Habitat spontanea Cantone Sinarum.

Observ. Affinitatem habet, non proximam, cum *Matricaria* Asteroides. *Lin. sy. pl. sp. 6.*

GENUS XXVIII. CHRYSANTHEMUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus: *squamis* marginalibus membranaceis. *Lin. sy. pl. G. 1048.*

Sp. 1. CHRYSANTHEMUM INDICUM. *Del. cat. 3 Tā Kiō hōa.*

Differ. spec. *Chryf. foliis* simplicibus, ovatis, sinuatis, angulatis, serratis, acutis. *Lin. sp. 13.*

Habitus, & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, radice perenni, 4-pedalis, erectus, teres: *ramis* obliquis, sub-divisis, lævibus. *Folia* ovata, acuta, pinnato-incisa, laciniis serratis, acutis, inæqualibus, glabris, undulatis: *petiolis* sparsis. *Flos* sub-terminalis, pedunculis longis, sæpius 1-floris, solitariis. *Calyx* hemisphæricus, imbricatus, foliolis oblongis, planiusculis, arcuatis, margine sub-membranaceis. *Flosculi* omnes ligulati. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus. Hujus sunt multæ varietates, quæ aliquantulum differunt foliorum formâ, horumque, & *caulis* magnitudine: sed maxime florum colore, scilicet candido, rubefcente, purpureo, violaceo, flavo, rufo.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, latè cultum ob pulchritudinem floris, cujus diameter 3 pollices, & amplius æquat. Odor totius plantæ tenuis, nec magni faciendus.

Matricaria Sinenfis. *Rumph. Amb. l. 8. c. 53. tab. 91. fig. 1. Matricaria* Sinenfis, flore monstrofo. *Vaill. Act. Paris. 1720. pag. 368.*

Sp. 2. CHRYSANTHEMUM PROCUMBENS. *Kim cuc. 2 Siad Kiō hōa.*

Differ. spec. *Chryf. foliis* sinuato-incisis, obtusis: *caule* procumbente.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 3-pedalis, procumbens, sæpè repens, tenuis, intricatus, ramosissimus. *Folia* ovata, obtusa, profundè

500 SINGGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA.

fundè sinuata, laciniis ovatis, sub-tomentosa, petiolata, sparsa. *Flos* terminalis, pedunculis polyfloris: *calyce* hemisphærico, imbricato, squamis æqualibus, sub-membraceis: *receptaculo* nudo: *pappo* nullo. Hujus etiam inveniuntur multæ varietates. 1, flore pleno, integrè ligulato, flavo. 2, flore radiato, disco, & radio flavis. 3, disco flosculo flavo, radio ligulato albo. 4, flosculis omnibus albis, nunc semiflosculosis, nunc radiatis, hermaphroditis in disco, fœmineis in radio. Omnium varietatum flores, etiam culti, semper parvi.

Habitat spontaneum, cultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Matricaria Sinensis, minore flore, petalis, & umbone ochroleucis. Pluken. Amalth. pag. 142. tab. 430. fig. 3.

Virtus: florum. Diaphoretica, Cephalica, Ophthalmica.

GENUS XXIX. ERIGERON.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii lineares, angustissimæ. Lin. sy. pl. G. 1031.

Sp. 1. ERIGERON PHILADELPHICUM. α Cay Con hât.

Differ. spec. *Erig. caule* multifloro: *foliis* lanceolatis, sub-ferratis: *caulinis* semiamplexicaulibus: *flosculis* radii capillaceis, longitudine disci. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, ramosus, multiflorus. *Folia* lanceolata, sinuata, sub-ferrata, caulina semiamplexicaulia. *Flos* luteus, paniculatus, terminalis, plurimus, oblongus: *corollis* radii tenuissimis, fœmineis, erectis: *receptaculo* nudo: *pappo* piloso.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Observ. Philadelphium adoptavi, quia hujus notæ a Linnæo propositæ nostro conveniunt. Apud Auctores non invēni pleniorē descriptionem: si præterea valde differre observetur, Cochinchinensē vocabitur.

Virtus: totius herbæ. Potenter menses ciet, nec tutò.

Sp. 2. ERIGERON HIRSUTUM. β Ha si kouc.

Differ. spec. *Erig. caule* hispido, *foliis* lineari-lanceolatis, sub-ferratis, utrinque pilosissimis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, hirsutus. *Folia* lanceolato-linearia, sub-ferrata, utrinque pilosissima, sparsa. *Flos* paniculâ terminali, erectâ, pauciflorâ. *Flosculi* disci hermaphroditæ, tubulosi, lutei: radii fœminei, ligulati, lineares, stricti, integerrimi, cærulei, multi. *Calyx* sub-squarrosus, imbr-

SYNGENESIA: POLYGAMIA SUPERFLUA. 302

catus. *Pappus* pilosus, æqualis. *Receptaculum* nudum.
Habitat agreste circa Cantonem Sinarum.

GENUS XXX. SOLIDAGO.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii circiter 5:
Cal. squamæ imbricatæ, clausæ. Lin. sy. pl. G. 1035.

† Sp. 1. SOLIDAGO DECURRENS. β Hoàng kām siong.

Differ. spec. Sol. *foliis* radicalibus sub-crenatis, decurrentibus: *thyrsos* terminali: radio sub-septemfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, teres, simplex, 1-pedalis: radice fibrosâ repente. *Folia* radicalia lato-lanceolata, sub-crenata, in petiolos longos decurrentia. *Flos* integrè luteus, *thyrsos* oblongo, bracteato, terminali: *corollis* radii 7 circiter, fœmineis ligulatis. *Calyx* cylindricus imbricatus, longitudine disci, foliolis lanceolato-linearibus, erectis, clausis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. SOLIDAGO CANTONIENSIS. β Kām siong hōa.

Differ. spec. Sol. *foliis* lanceolatis, integerrimis: *caule* simplicissimo: *pedunculis* sub-terminalibus, polyfloris: radio sexfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, 10-pollicaris, erectus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, sessilia, sparsa. *Flos* integrè luteus, pedunculis polyfloris, sub-terminalibus. *Corollulæ* radii senæ. *Calyx* imbricatus, sub-clausus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus. Affinitatem habet cum Sol. Minutâ (Lin. sp. 12): differt maximè pedunculis polyfloris.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

GENUS XXXI. CINERARIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis. Lin. sy. pl. G. 1036.

† Sp. 1. CINERARIA REPANDA. β Cau li măn.

Differ. spec. Cin. *paniculâ* diffusâ: *foliis* ovato-lanceolatis, serrato-repandis, glabris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, teres, glaber, 4-pedalis, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, serrato-repanda, glabra, alterna. *Flos* luteus, terminalis, paniculâ diffusâ: *calyce* simplici, polyphylo, oblongo, æquali. *Corollulæ* radii 2 circiter, fœmineæ,

502 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA:

neæ, ligulatæ; 2-fidæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.
Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Observ. Affinis est Ciner. Palustris, & Aureæ: a quibus differt foliis & caule glabris, atque paniculâ diffusâ.

GENUS XXXII. SENECIO.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex. *Calyx* cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis. Lin. fy. pl. G. 1033.

Sp. 1. SENECIO DIVARICATUS. β Kām sūn lin.

Differ. spec. Sen. *corollis* nudis: *foliis* lanceolatis, dentatis, scabris: *ramulis* floriferis divaricatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, ramosus: *ramis* superioribus floriferis, divaricatis. *Folia* lanceolata, dentata, venulosa, tomentosa, sparsa. *Flos* spicis longis, simplicibus, terminalibus. *Flosculi* disci pallidi: radii nudi. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum. Osbeck. Iter ad Sinas.

GENUS XXXIII. TUSSILAGO.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* squamæ æquales, discum æquantes, sub-membranaceæ. Lin. fy. pl. G. 1032.

Sp. 1. TUSSILAGO FARFARA. β Koan tūm hōa. α Khoan doung hoa.

Differ. spec. Tuss. *scapo* imbricato unifloro: *foliis* sub-cordatis, angulatis, denticulatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Planta* acaulis, herbacea: *radice* perenni, tereti, tortuosa, repente. *Folia* radicalia, sub-rotunda, sub-cordata, inæqualiter sub-lobata, denticulata, nervosa, subtus tomentosa, magna, post florem exurgentia, petiolis longis, erectis. *Flos* purpurascens, terminalis, solitarius: *scapo* erecto, squamoso, crasso, foliis brevior. *Calyx* communis imbricatus, sub-cylindricus, lævis. *Corollule* disci hermaphroditæ, tubulosæ: radii femineæ, ligulatæ, erectæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat inculta in locis Borealibus imperii Sinensis.

Gmel. Sibir. 2. pag. 140. *Tussilago* vulgaris. Bauh. Pin. pag. 197. n.

1. Hill. Brit. herb. pag. 446. tab. 63. fig. 14, 15.

Virtus: totius plantæ, imprimis florum. Pulmonica, Expectorans. Prodest in tussi, asthma, phthisi, faucium inflammatione, & dolore.

Sp. 2. TUSSILAGO ANANDRIA. β Lũ chũu Kõan tũm hõa. α Khoan doung hõa.

Differ. spec. Tuss. scapo unifloro squamolo, erecto: *foliis* lyrato-ovatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* nullus. *Radix* perennis, radiculis ramosis; longè repentibus. *Folia* radicalia, sub-ovata, sub-lyrata, venosa, petiolis longis erectis. *Scapus* 1-florus, crassus, foliis brevior, squamis acutis imbricatis. *Flos* luteus, calyce erecto, sub-aperto. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat agrèstis loca Borealia apud Sinas.

Tussilago scapo unifloro, calyce sub-aperto. Gmel. Sibir. 1. pag. 1434 tab. 67. fig. 2.

Virtus fere eadem, quæ præcedentis.

GENUS XXXIV. ASTER.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Corollæ* radii plures
10. *Cal.* imbricati squamæ inferiores patulæ. Lin. sy. pl. G. 1034.

Sp. 1. ASTER INDICUS. β Mã lân hõa.

Differ. spec. Ast. *foliis* ovato-oblongis, ferratis: *floralibus* ovali-lanceolatis, integerrimis: *ramulis* unifloris. Lin. sp. 27.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, striatus, glaber, ramosus. *Folia* lato-lanceolata, serrata, floralia integerrima, glabra, sub-petiolata, superius obscure, inferius pallidè viridia. *Flos* terminalis, solitarius: *calyce* hæmisphærico imbricato, squamis subsquarrosis, obtusis. *Corollulæ* disci flavæ, hermaphroditæ, tubulosæ: radii cærulescentes, fæmineæ, ligulatæ, patentés, multæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneus, cultusque apud Sinas.

Burm. Ind. pag. 181. Thunb. Japon. pag. 316.

Virt. Sub-adstringens; Stomachica.

Observ. Aster a Linnæo, & aliis dictus Chinenfis a me non visus.

Suspicio, quod confundatur cum Chrysanthemo Indico; cujus flores pulcherrimi, & magni, præ cæteris Syngenesis a Sinenfis studiosè coluntur. Utriusque habitus, prout a Linnæo expositus parum differt. Ast in Chrysanthemo pappus nullus: estne, qui viderit in Astore Chinenfi pappum pilosum, Generis proprium?

GENUS XXXV. TAGETES.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* aristis 5, erectis. *Cal.* 1-phyl-
SII ii
lus,

304. SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA:

lus, 5-dentatus, tubulosus. *Flosculi* radii 5, persistentes. Lin. sy. pl. G. 1044.

Sp. 1. TAGETES PATULA. α Cüc van tho. p. . . .

Differ. spec. Taget. *Caule* sub-diviso, patulo. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, sub-divisus, sub-erectus, glaber, diffusus. *Folia* profunde pinnatifida, laciniis lanceolatis, ferratis, glabris, obscuro-virentibus. *Flos* solitarius, terminalis, aureus, pulcher, graveolens, magnus, pedunculo longo, erecto. *Calyx* 1-phyllus, oblongus, 8-fulcatus, apice 8-dentatus, lævis. *Corollula* disci tubulosæ, hermaphroditæ: radii 30 circiter, femineæ, ligulatæ, magnæ, sulcato-plicatæ, patentes. *Semina* linearia, compressa, longa, sub-nigra: *pappo* aristato. *Receptaculum* nudum.

Habitat ubique culta in hortis Cochinchinæ: etiam in Chinâ, & in multis Indiæ locis.

Burm. Ind. pag. 182. Thunb. Japon. pag. 320. Tagetes minor, flore fulvo, maculato. Dill. Elth. 273. tab. 279. fig. 361.

GENUS XXXVI. SIEGESBECKIA.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* exterior 5-phyllus, proprius patens. *Radius* dimidiatus. Lin. sy. pl. G. 1057.

Sp. 1. SIEGESBECKIA ORIENTALIS. α Nu so rîa.

Differ. spec. Sieg. *petiolis* sessilibus: *calycibus* exterioribus linearibus, maioribus, patentibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, teres, erectus: *ramis* paucis, assurgentibus. *Folia* sub-ovata, utrinque acuminata, serrato-incisa, tomentosa, in petiolos decurrentia, opposita. *Flos* flavus, pedunculis longis, solitariis, 1-floris, sparsis. *Calyx* communis 5-phyllus, expansus: *foliis* spathulatis, obtusis, papillofis, longis: *propriis* singulis flosculis spathaceus, ovatus, concavus, papillis pedunculatis similiter confitus, flosculo maturo brevior, a latere dehiscens. *Corolla* composita semiradiata: *corollulis* hermaphroditis 10 circiter in disco: *femineis* 4 in radio. *Propria* hermaphroditis infundibuliformis, 5-fida, minuta. *Faminea* ligulata, 3-fida. *Filamenta* hermaphroditis capillaria brevissima. *Antbera* cylindracea. *Germen* oblongum. *Stylus* sub-longior staminibus. *Stigmata* 2, reflexa. *Pericarpium* nullum. *Calyx* immutatus. *Semina* omnibus turbinato-oblonga, incurva, scabra, pedicellata: *pappo* nullo. *Receptaculum*, pedicellis feminum remanentibus, hispidum, cæteroque nudum, minimum.

Habitat

.A. SYNGENESIA. PODYGAMIA SUPERFLUA. 80505

Habitat ubique inculta in hortis Cochinchinae: apud quodam etiam in Chinâ, sed ibi mihi non obvia. *Burm. Ind. pag. 183. Thunb. Jap. pag. 321. Hort. Cliff. pag. 412. tab. 22.*

Observ. Juxta systematis Linnæani principia existimo hanc plantam adscribi debere ordini Polygamiae segregatae, cum in eâ singuli flosculi propriis calycibus instruantur, ac distinguantur. Differentia specifica Linnæana nec satis conformis, nec perspicua.

Char. Gener. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus. *Corollula* dif-
ci 4-fidæ. Lin. *fy. pl. G. 1056.*

Sp. 1. ECLIPTA ERECTA. *α* Co muc. *fy. pl. G. 1056.*
Differ. spec. Ecl. *Caulis* erecto: *foliis* basi deflexis; *sessilibus*. Lin.
fy. pl. G. 1056.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus; 1-pedalis; erectus; teres, hispidus, ruber, succosus: *ramis* paucis, obliquis: *Folia* lanceolata, sub-integerrima, rugosa, obscure-viridia; subtus tomentosa, opposita, sub-sessilia, deflexa. *Flos* albus, sub-terminalis; pedunculis 1-floris, solitariis, longis; erectis. *Calyx* hemisphaericus; squamis acutis, corollam superantibus. *Flosculi* disci tubulosi hermaphroditi: radii ligulati, foeminei, breves, 4-fidi. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus.

Habitat inculta in hortis Cochinchinae.
Eclipta Daun. Rumph. Amb. l. 10. c. 31. tab. 18. fig. 1.

Observ. *Eclipta* Cochinchinensis, quæ Amboinensi proxima, nec habet folia nervosa, nec propriè ferrata, aut sessilia, neque etiam flores geminos, unde dubito an eadem cum Americanâ dici valeat.

Usus. Succus herbæ utilis ad tingendos capillos hominum, vel pilos animalium colore nigro; ideo ab indigenis vocatur herba atramenti.

Sp. 2. ECLIPTA POSTRATA. *α* Cay nu ao thon.
Differ. spec. Ecl. *caule* prostrato: *foliis* sub-undulatis, sub-petiolatis.
Lin. *sp. 2.*

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sub-erectus; multiplex, sæpius repens, teres, pilosus, ruber. *Folia* ovato-lanceolata, obtusè ferrata, sub-undulata, tomentosa, sub-petiolata, opposita. *Flos* flavus, axillaris, solitarius, pedunculis longissimis. *Calyx* ovatus, imbricatus, squamis lanceolatis. *Flosculi* disci hermaphroditi; tubulosi: radii foeminei, ligulati, pauci, sæpe nulli. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus.

Habitat

7606 . SYNGENESIAI POLYGAMIAI SUPERFLUA.

Habitat inculta in hortis Cochinchinae. Thunb. Jap. pag. 321. Chrysanthemum Maderaspatanum menthae arvensis folio, & facie; floribus bigemellis ad alas, pedunculis curvis. Pluk. Alm. 100. tab. 118. fig. 5. Nunquid species a nostra di-

GENUS XXXVII. BUPHTHALMUM.

Char. Gener. Recept. paleaceum. Pappus margo obsoletus. Sem. latera, praesertim radii marginalia Stigma flore. hermaphroditorum indivisum. Lin. sy. pl. G. 1059.

Sp. 1. BUPHTHALMUM OLERACEUM. Differ. spec. Buph. calycis foliolis acutis, lateraliter connexis: foliis oppositis, lanceolatis, recurvis.

Hab. & nota. Caulis herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, albicans, levis, ramosus. Folia liniari-lanceolata, inaequaliter dentata, glabra, recurva, opposita, succosa, crassa, cinerea. Flor. radiatus, magnus, solitarius. Calyx imbricatus, haemisphaericus, foliolis acutis, membranula laterali mutuo connexis. Corolla discus planus, flosculis flavis, tubulosis, hermaphroditis. Radius amplius, expansus, corollulis foemineis, ligulatis, 3-fidis, albis, multis. Receptaculum planiusculum, paleis minimis confutum. Pappus seminum marginatus. Stigma flosculi hermaphroditi simplex.

Habitat cultum in hortis Cochinchinae, & Chinae. Usus. Planta odora, cujus folia intertolera computantur ab indigenis.

GENUS XXXIX. VERBESINA.

Char. Gener. Recept. paleaceum. Pappus aristatus. Calx duplici ordine. Flosculi radii circiter 5. Lin. sy. pl. G. 1058.

Sp. 1. VERBESINA CALENDULACEA. Differ. spec. Verb. foliis oppositis, lanceolatis, obtusifuscis: pedunculis longis, 1-floris: calycibus simplicibus. Lin. sp. 6.

Hab. & nota. Caulis herbaceus, annuus, 1-pedalis, sub-erectus, multiplex, glaber, albicans. Folia lanceolata, sub-obtusa, integerrima, glabra, opposita. Flor. luteus, terminalis, pedunculo 1-floro, longissimo. Calyce hemisphaerico simplici. Radius 10-florus, foemineus, ligulatus. Semina pappo aristato, brevi. Receptaculum convexum, paleis tubo flosculorum aequalibus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum. Burm. Ind. pag. 184. Caltha flore solitario ex alis foliorum longissimo

SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA: 80507
pedunculo prodeunte. Burm. Zeyl. pag. 52. tab. 22. fig. 1.

- † Sp. 2. VERBESINA SPICATA. α Cúc ăn rau. β Thien cái tsai.
Differ. spec. Verb. *foliis* palmato-incisis, ferratis; *spicis* linearibus, terminalibus.
Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, 4-pedalis, sub-erectus, aliquando repens, ramosus, striatus, fulco-ruber. *Folia* inferiora palmato-incisa, superiora ovato-lanceolata, omnia serrata, subtus tomentosa, obscuro-viridia, odora, succosa, alterna: petiolis longis, rubris. *Flos* albissimus, radiatus, minutulus: *spicis* linearibus; congestis, longis, erectis, terminalibus. *Calycis* foliola subulata, erecta, bino ordine disposita. *Fluseculi* disci tubulosi, hermaphroditi, breves, multi: *radii* feminei, 5 circiter, ligulati, ad unum latus vergentes, ligula calycem non excedente. *Receptaculum* sub-nudum, raris paleis confutum. *Pappus* nullus. *Semina* turbinata, obtusè tetragona, brevia.
Habitat culta in hortis Cochinchinae, & Chinae: & cum acetariis mensis apponitur.
Observ. Pappo nullo convenit cum Verb. Muticâ (Linnæi sp. 9.): sed nostræ calyx, & corolla characterem Generis ad amissum servant, non illa.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

GENUS XL. GORTERIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* lanatus. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus, squamis spinosis. Lin. sy. pl. G. 1064.

- Sp. 1. GORTERIA SETOSA. β . . .
Differ. spec. Gort. *foliis* lanceolatis, decurrentibus, adnatis, ciliato-spinosis: *floribus* terminalibus, pedunculatis. Lin. sp. 4.
Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus, multiplex, ramosissimus. *Folia* lanceolato-ovata, serrato-spinosa, utrinque glabra, alterna. *Flos* luteus, pedunculis polyfloris, erectis, terminalibus. *Calycis* squamæ imbricatæ, inermes. *Corollule* disci hermaphrodite, tubulosæ: *radii* neutre, ligulatæ, breves. *Receptaculum* nudum. *Pappus* sub-nullus.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.
Lin. Mant. pag. 287.

GENUS XLI. CENTAUREA.

Char. Gener. Recept. setosum. Pappus simplex. Cor. radii infundibuliformes, longiores, irregulares. Lin. fy. pl. G. 1066.

Sp. 1. CENTAUREA PHRYGIA. α Βαγ δαυ λουγ.

Differ. spec. Cent. *calycibus* recurvato-plumosis: *foliis* indivisis, oblongis, scabris. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 1-pedalis, erectus, hirsutus, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, indivisa, tomentosa, nec scabra.

Flos luteus, paniculis terminalibus. *Calyx* sub-rotundus, squamis subulatis, imbricatis, in senectute recurvatis, plumosis, argenteis.

Flosculi omnes tubulosi: disci hermaphroditi: radii neutri. *Pappus* seminum pilosus.

Habitat inculta in Cochinchina.

Cyanus, *foliis* sub-hirsutis, ovato-lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis: plumulis calycinis reflexis. Hall. Helv. n. 188. *Jacea latifolia*, & *angulifolia*, capite hirsuto. Bauh. Pin. pag. 271. n. 7, 8.

GENUS XLII. COREOPSIS.

Char. Gener. Recept. paleaceum. Pappus bicornis. Cal. erectus, pollyphyllus, basi radius patentibus cinctus. Lin. fy. pl. G. 1062.

† Sp. 1. COREOPSIS LEUCORRHIZA. β Fâm sũm. α Phaong phung

Differ. spec. Cor. *foliis* pinnatis, 5-phyllis, ferrato-incisis: *radio* sexfloro: *pappo* 3-corni.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, 4-gonus, sulcatus: *radice* simplici, perpendiculari, sub-fusiformi, albâ, carâ.

Folia 5-nata, lanceolata, ferrato-incisa. *Flos* integrè croceus: pedunculis paucifloris, terminalibus. *Corollula* disci hermaphroditæ, tubulosa, multæ: *radii* 6, neutræ, ligulatæ, ovatæ, integerimæ. *Seminum* pappus 3-cornis, setis inversis ramosis. *Calyx* erectus, pollyphyllus. *Receptaculum* paleaceum.

Hab. at agrestis propè Cantonem Sinarum.

Ob. cv. Sunt alliæ species *foliis* ternatis, & trifidis, quæ a Sinis eodem nomine indicantur.

† S. 2. COREOPSIS BITERNATA. α Cã ap chioc.

Differ. spec. Cor. *foliis* biternatis, ovato-lanceolatis, ferratis: *paniculâ* diffusâ: *radio* sexfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, 4-sul-

SYNGENESIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 509

diatus, integrè luteus: *paniculâ* sparsâ, terminali. *Radii* corollæ 6, neutræ. *Pappus* bicornis, ramosus. *Receptaculum* planiusculum nudum.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

GENUS XLIII. HELIANTHUS.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum, planum. *Pappus* diphyllus. *Cal.* imbricatus, sub-squarrosus. Lin. sy. pl. G. 1060.

Sp. 1. HELIANTHUS ANNUUS. γ . . .

Differ. spec. Hel. *foliis* omnibus cordatis, trinervatis: *pedunculis* incrassatis: *floribus* cernuis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* 7-pedalis, annuus, sub-simplicissimus, rectus, angulatus. *Folia* omnia cordata, acuta, 3-nervia, serrata, scabra, alterna, petiolata, magna. *Flos* aureus, maximus, diametro 5-pollicari: *pedunculis* basi incrassatis, 1-floris, cernuis, foliariis, longis, sub-terminalibus. *Flosculi* radii neutri, ligulati, multi. Ab Heliantho Indico vix differt.

Habitat cultus in insulâ Africanâ Mozambico.

Burm. Ind. pag. 187. Hel. radice annuâ. Hort. Cliff. pag. 419.

Sp. 2. HELIANTHUS GIGANTEUS. α Hoa Kù. β Hoâm quèi hōa.

Differ. spec. Hel. *foliis* alternis, lanceolatis, scabris, basi ciliatis: *caule* stricto, scabro. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 6-pedalis, rectus, crassus, scaber, ramis paucis. *Folia* lanceolata, integerrima, enervia, scabra, alterna, magna. *Flos* aureus, magnus, terminalis, solitarius. *Calyx* imbricatus, patens, squamis oblongis, sub-squarrosis. *Flosculi* radii longissimi, neutri, multi: *disci* plures, breves, tubulosi, hermaphroditi. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* 2-aristatus.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Mill. Dict. n. 5. Chrysanthemum Virginianum elatius, angustifolium, caule hirsuto, viridi. Pluk. Phyt. tab. 159. fig. 5.

POYGAMIA SEGREGATA.

GENUS XLIV. SPHÆRANTHUS.

Char. Gener. *Calyx*. 8-flori. *Corollulæ* tubulosæ hermaphroditæ, & obsolete fœmineæ. *Recept.* squamosum. *Pappus* nullus. Lin. sy. pl. G. 1083.

SYNO SYNGENESIA. POLYGAMIA SEGREGATA

† Sp. I. SPHÆRANTHUS COCHINCHINENSIS. α Co bō xlt. β . . .
Differ. spec. Sphær. foliis decurrentibus, oblongis, integerrimis: ca-
pitulis cordato-ovatis, sub-fessilibus, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, gla-
ber, albicans, ramis ascendentibus, paucis: decurrentiâ foliorum
triquetrum mentiens. *Folia* oblonga, obtusa, integerrima, undula-
ta, sub-rugosa, sessilia, alterna, lanuginosa. *Flos* albicans, parçâ
purpurâ conspersus: *capitulis* cordato-ovatis, terminalibus, solita-
riis, parvis, pedunculis brevibus.

Habitat spontaneus inter legetes, & in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Observ. Sphæranthus Amaranthoides (Burm. Ind. pag. 186.) fortasse
est idem, vel parum differt. Similiter dicerem de Sphær. Chinesi
(Lin. sp. 3.), si non haberet folia pinnatifida, cum noster habeat
integerrima.

Virtus: totius herbæ. Emolliens, Refrigerans, Resolvens. Usus potif-
simus externus: cataplasma in doloribus, & tumoribus mamillarum
resolvendis, succus expressus in Ophthalmiâ, gargarisma decocti in
faucium inflammatione proficiunt.

† GENUS XLV. ENYDRA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis 4-phyllus, patens, magnus: foliolis ovatis, duobus
oppositis minoribus.

Partialis 1-phyllus, 1-florus, in tubum convolutus, apice polyfido
connivente.

Cor. Composita: hermaphroditis in disco, fœmeninis in radio.

Propria: hermaphroditis tubulosa, calyce proprio brevior: limbo 5-fi-
do, erecto. Fœmininis tubulosa, calyce proprio brevior: limbo 3-
fido.

Stam. Filamenta 5, capillaria, brevissima. Anthera Cylindracea, con-
nata.

Pist. Hermaphroditis: Germen ovatum. Stylus filiformis longitudine
staminum. Stigma 2-fidum, erectum.

Fœmineis: Germen ovato-oblongum. Stylus filiformis, calyce, & co-
rollâ longior. Stigma 2-fidum, reflexum.

Peric. nullum. Calyx immutatus.

Sem. Omnibus ovata. Pappus nullus.

Recept. convexum, nudum.

Nom. (Ένυδρος aquaticus) a loco, in quo planta vivit.

Char:

Char. Gener. *Cal.* communis 4-phyllus, partialis 1-florus. *Coroll.* omnes tubulosæ: radii 3-fidæ. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus.

† Sp. 1. ENYDRA FLUCTUANS. α Rau ngu óng.

Differ. spec. En. *foliis* sub-hastatis, serratis, oppositis: *radice* repente; *Hab. Caulis* herbaceus, perennis, sub-erectus, teres, inanis, glaber, ramosus: *radice* repente. *Folia* sub-hastata, serrata, glabra, opposita: *petiolis* brevissimis, semi-plexicaulis *Flos* albus, sub-terminalis, pedunculis 1-floris.

Habitat spontanea in paludibus Cochinchinæ.

MONOGAMIA.

GENUS XLVI. IMPATIENS.

Char. Gener. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis: *nectario* cucullato. *Caps.* supera, 5-valvis. Lin. sy. pl. G. 1093.

Sp. 1. IMPATIENS CHINENSIS. β Hùm thâu kiõ.

Differ. spec. Imp. *pedunculis* unifloris, solitariis: *foliis* oppositis, ovatis: *nectariis* arcuatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, erectus, teres, ramosus. *Folia* oblongo-ovata, serrato-denticulata, glabra, sessilia, opposita.

Flos rubro-purpureus, pedunculis axillaribus, unifloris, sub-solitariis. *Nectarii* calcar subularum, crassum, valde arcuatum, mediocre. Habitat spontanea cultaque Cantone Sinarum.

Burm. Ind. pag. 187.

Sp. 2. IMPATIENS CORNUTA. α Cây Nác nê.

Differ. spec. Imp. *pedunculis* unifloris, aggregatis: *foliis* lanceolatis: *nectariis* flore longioribus. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, sub-teres, diffusus. *Folia* ovato-lanceolata, serrata, hispida, alterna, petiolata, magna, suavèolentia, obscuro-viridia. *Flos* albus (in aliis purpurascens) pedunculis 1-floris, paucis, longis, axillaribus. *Corolla* 5-petala, irregularis, calcar triplo longiore, sub-arcuato. *Capsula* ovata, acuminata, hispida, 5-valvis, 1-ocularis, polysperma.

Habitat ubique spontanea in hortis Cochinchinæ.

Balsamina Latifolia, floris calcar longissimo. Burm. Zeyl. pag. 41. tab. 16. fig. 1.

Ufus. Decocto foliorum solent indigenæ crines, & caput abluere; qui-

quibus hæc herba, cæteroquin vilis, & trivialis, suavissimum odorem conciliat.

Sp. 3. IMPATIENS BALSAMINA. α Maông tay co.

Differ. species Impat. *pedunculis* unifloris, aggregatis: *foliis* lanceolatis, superioribus alternis: *nectariis* flore brevioribus. Linn. spec. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, teres, hispidus, aquosus, albicans: *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata, serrata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* ruber, (in aliis albus) pedunculis axillaribus, longis, unifloris, sub-aggregatis; *nectario* corollâ breviori: *capsulâ* ovato-oblongâ, lanuginosâ, 5-valvi, elasticè deficiente, polyspermâ.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 327. Lacca herba. Rumph. Amb. 1. 8. cap. 52. tab. 90.

† Sp. 4. IMPATIENS MUTILA. α Maông tay tàu.

Differ. spec. Impat. *pedunculis* unifloris: *foliis* lanceolatis, ferratis, oppositis: *nectariis* mutilis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres: *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata, serrata, glabra, opposita. *Flos* coccineus, pedunculis unifloris, subsolitariis. *Calyx* biphyllus, parvulus, coloratus, deciduus. *Corolla* petala 5, inæqualia, patentia: *nectario* cucullato, obtuso, mutilo. *Filamenta* 5, brevia: antheris coalitis. *Capsula* 1-locularis, polysperma: valvis 5, elasticis, ad tactum se contraherentibus, semina expellentibus.

Habitat culta in Cochinchinâ, puto, quod a Sinis translata,

† Sp. 5. IMPATIENS COCHLEATA. β T sien chí hùm.

Differ. spec. Imp. *pedunculis* unifloris: *foliis* oblongis, sub-ferratis, oppositis: *nectariis* cochleatis: *radice* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, erectus, geniculatus, ruber, sub-simplicissimus: *radice* repente. *Folia* oblonga, obtusa, sub-ferrata, parva, glabra, crassa, sessilia, opposita. *Calyx* 2-phyllus, coloratus, foliolis parvulis, sub-rotundis, concavis, deciduis. *Pedunculi* axillares, 1-flori, longi, sub-solitarii. *Corolla* 5-petala, inæqualis: *nectaria* magno, compresso, in spiram convoluta. *Flos* coccineus, pulcherrimus, inodorus. *Capsula* elastica, carnosa, 5-valvis, polysperma: *seminibus* sub-rotundis, receptaculo elongato affixis.

Habitat culta Cantone Sinarum.

Observ. Ex omnibus istis speciebus, quas examinavi, nullam invêni, quæ

SYNGENESIA. MONOGAMIA.

513

quæ constanter habeat pedunculos florum vel solitarios semper, vel semper aggregatos; adeoque perperam distinguuntur per numerum pedunculorum.

GENUS XLVII. VIOLA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis; posticè cornuta. *Capsf.* supera, 3-valvis, 1-locularis. Lin. fy. pl. G. 1092.

Sp. 1. VIOLA ODORATA. *L.* & Kiet tuong hĩa.

Differ. spec. Vi. acaulis: *foliis* cordatis: *stolonibus* reptantibus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Planta* acaulis, semipedalis: *stolonibus* filiformibus, repentibus, perennantibus. *Folia* radicalia, cordata, apice, & auriculis sub-acuta, crenata, glabra, sub-rugosa, obscuro-viridia: *petiolis* longis, canaliculatis, sub-erectis. *Flos* cæruleo-purpurens, parvus, odore gratissimus: *pedunculis* filiformibus, erectis, folio sub-æqualibus. *Cal.* 5-phyllus, foliolis ovato-oblongis, incurvis, persistentibus. *Corollæ* petala 5, inæqualia, patentia: *nectario* subulato, brevi, curvo.

Habitat Cantone Sinarum in hortis, & prope vias: inde in Cochinchinam delata, ubi raro culta.

Thunb. Jap. pag. 326. *Viola* acaulis, *stolonibus* teretibus, reptantibus, *pedunculis* radicalibus. Hort. Cliff. pag. 427.

Virtus: foliorum Emolliens. Florum Pectoralis, Anodyna. Seminum Purgans, Diuretica, sub-Emetica.

Sp. 2. VIOLA PRIMULIFOLIA. *L.* . . .

Differ. spec. Vi. acaulis: *foliis* oblongis, sub-cordatis: *petiolis* membranaceis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Planta* acaulis, annua. *Folia* oblongo-ovata, sub-cordata, glabra, crenata, leviter decurrentia in petiolos longos, erectos. *Flos* purpureus, odoratus: *pedunculis* longis, radicalibus, 1-floris. A *Viola* Odorata non multum differt, forsitan illius variatio.

Habitat inculca prope Cantonem Sinarum.

Gronov. Virgin. pag. 135.

GENUS XLVIII. LOBELIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Capsf.* infera, 2, 3-locularis. Lin. fy. pl. G. 1091.

Sp. 1.

† Sp. 1. LOBELIA CHINENSIS. β Puón fuén lién.

Differ. spec. Lob. *foliis* lanceolatis, integerrimis: *floribus* solitariis, terminalibus: *caule* repente.

Hab. & notæ. *Caulis* herbaceus, filiformis, annuus, procumbens, repens: *ramis* erectis, 5-pollicaribus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, æterna, sessilia. *Flos* dilute cæruleus, pedunculatus, solitarius, terminalis. *Calyx* 5-fidus, laciniis brevibus, subulatis, interruptis, patulis. *Corolla* tubus fissus: limbus 5-partitus, laciniis lanceolatis, inæqualibus. *Filamenta* 5, plana, longa, tubum antherarum sustentantia. *Stigma* 2-fidum, revolutum. *Capsula* 2-locularis, ovata, apice dehiscens: *seminibus* sub-rotundis, plurimis, minimis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Observ. *Foliis* integerrimis, & pedunculis florum terminalibus differt tam a Zeylanicâ, (Lin. sp. 23.) quam ab Erinoidè, (Thunb. Jap. pag. 326.) quamvis utraque & solo natali, & habitu non valde differt a Chinensî.

† GENUS XLIX. SOLENA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium superum, urceolatum, 5-dentatum, persistens.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum tubus cylindricus, crassus, brevis, superius patulus, calyci insidens. Antheræ linea farinifera, supra os tubi sursum, deorsumque repens, flexu triplici.

Pist. Germen oblongum. Stylus crassus, calyce brevior, tubo stamineo circumdatus. Stigmata 3, inversè sagittata, magna.

Peric. Bacca oblongo-ovata, acuminata, flaccida, glabra, 1-locularis, polysperma, cortice tenui.

Sem. Aliqua, ovata, sub-compressa, lævia, nidulantia.

Nom. (Σώλην tubus) ab stamine tubuloso.

Char. Gener. Cal. 5-dentatus. Cor. 0. Bacca infera, polysperma.

† Sp. 1. SOLENA HETEROPHYLLA. α Cù nhang. β Khũ leu: Tiên hĩa fuén.

Differ. spec. Sol. *scandens*: *foliis* inferis cordatis, superis hastatis, denticulatis.

Hab. *Caulis* suffruticosus, multiplex, longus, tenuis, scandens, *cir-
cibus* solitariis. *Folia* inferiora cordata, superiora hastata, omnia den-

SYNGENESIA. MONOGAMIA.

denticulata, alterna, petiolata, glabra. Flos pallidus, axillaris, pedunculatus, solitarius. Bacca coccinea, mediocris; seminibus nigricantibus. Radix tuberosa, fasciculata: tuberibus oblongis, sub-fusiformibus, farinaceis, albicantibus, edulibus.

Habitat in sylvis Cochinchinae, & Chinae.

Observ. Hæc planta annumeranda esset Cucurbitaceis, nisi flores, qui omnes sunt hermaphroditi, prohiberent, & a Monoicis distraherent.

Virtus: radicis, & seminum. Resolvens, Mundificans. Prodest in Phytisi, Dysenteria.

- 1. CERATA.
- 2. CALLISTA.
- 3. THYRSIPERNUM.
- 4. CALCEOLA.
- 5. RENANTHERA.
- 6. ARISTOTELIA.

DIAANDRIA

- 7. OXCHIS.
- 8. EPIDENDRUM.
- 9. AERIDES.

TRIAANDRIA

- 10. SALICIA.

CLAS:

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

* Flores superi, Monogyni.

- † 1. CERAIA. Cor. 5-fida, corniformis. Nectarium polyfidum, corollâ clausum.
- † 2. CALLISTA. Cor. 5-petala, ventricosa. Nect. labium exterius convolutum, integrum.
- † 3. THRIXSPERMUM. Cor. petala 5, linearia. Nectar. labium exterius ovatum, integrum.
- † 4. GALEOLA. Cor. petala 5, ovata. Nectar. integrum, galeaeforme.
- † 5. RENANTHERA. Cor. petala 5, biformia. Antheræ lobi reniformes, divaricati.
- † 6. ARISTOTELEA. Cor. petala 4: summum, & infimum 3-fida. Anthera simplex, conica.

DIANDRIA.

* Flores superi, Monogyni.

7. ORCHIS. Nectarium corniculatum.
8. EPIDENDRUM. Nectarium turbinatum.
- † 9. AERIDES. Cor. petala 5, ovata. Nectar. labium exterius incubans alteri.

TRIANDRIA.

10. SALACIA. 1-gyna. Cal. 5-partitus. Cor. infera, 5-petala. Anthera germini infidentes. Bacca 3-sperma.

TETRANDRIA

- † 11. BLASTUS. Polyg. Cal. 4-dentatus. Cor. infera, 4-petala. Germina antheris infidentia.

PENTANDRIA

12. PASSIFLORA. 3-gyna. Cal. 5-partitus. Cor. infera, 5-petala. Bacca pedicellata.

HEXANDRIA

- † 13. BRAGANTIA. 1-gyna. Cal. o. Cor. supera, regularis, 3-fida. Siliqua 4-locularis, polyperma.

14. ARISTOLOCHIA. 6-gyna. Cal. o. Cor. supera, 1-petala, irregularis. Caps. 6-locularis.

OCTANDRIA

- † 15. PHAIUS. 1-gynus. Cal. spatha. Cor. supera, petala 5, lanceolata. Nect. labium exterius convolutum.

DECANDRIA

16. HELICTERES. 1-gyna. Cal. 1-phyllus. Cor. infera, 5-petala. Capsula 5, 1-loculares, polysperma.

POLYANDRIA

17. POTHOS. Spatha. Cal. o. Cor. 4-petala. Bacca 1-sperma.

18. CALLA. Spatha. Cal. o. Cor. o. Stamina mixta pistillis.

19. ARUM. Spatha. Cal. o. Cor. o. Stamina supra pistilla.

MONANDRIA.

† GENUS I. CERAIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha brevis, laciniata, 1-flora, persistens.

Perianthium 1-phyllum, tubulosum, inæqualiter 5-fidum: laciniis erectis.

Cor. Monopetala, corniformis, supera: parte alterâ subulato-tubulosa, longiore: alterâ breviorè dilataâ, 5-fidâ: laciniis 3 lato-conicis: binis aliis lateralibus linearibus: omnibus longitudine æqualibus.

Nectarium parvum, polyfidum, inæquale, corollâ clausum.

Stam. Filamentum 1, filiforme, breve, elasticum, pistillo adhærens.

Anthera compresso-rotunda, 1-ocularis, operculata.

Pist. Germen florem sustinens inter perianthium, & corollam, lineare, curvum, 6-fulcatum. Stylus brevissimus, basi laciniæ mediæ nectararii, simul cum stamine adnatus supra Germen. Stigma obsoletum.

Peric. Abortiens.

Nom. (Κεραια Virgula in formam cornu inflexa) a formâ corollæ subulatae, sursum incurvatæ.

Char. Gener. Cor. 5-fida: tubo subulato, inflexo. Nectario polyfido, intus clauso.

† Sp. I. CERAIA SIMPLICISSIMA. * Tach hâc. p. XE hō.

Differ. spec. Cer. caule parasitico, erecto, simplicissimo: floribus lateralibus, solitariis.

Hab. Planta fruticosa, parasitica: radice fibrosâ, repente: caule simplicissimo, 10-pollicari, erecto, ancipiti, supra basim tumescente, sulcato, glabro, luteo. Folia oblonga, emarginata, plana, crassa, vaginantia, erecta, parva, pauca. Flos pallidus, sub-terminalis, solitarius, erectus, pedunculatus: medio latere cornu corollini horizontaliter infidens germi.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ, rupibus, ac arboribus in hærens.

Virt. In Medicinâ Sinesi valet contra Epilepsiam, & nervorum, artuumque debilitatem.

Observ. Cum Ceraiâ aliquantulum habet similitudinis Herba duplex quarta. Rumph. Amb. l. II. c. 9. pag. III. tab. 51. fig. 2.

† GE-

† GENUS II. CALLISTA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus, præter squamas ovato-lanceolatas, 1-floras, ante maturiscentiam floris imbricatas.

Cor. Petala 5, patentia, longitudine sub-æqualia: horum 3 sessilia; ovato-oblonga: 2 alia opposita unguiculata, latiora: infima basi turgida.

Nectarium bipartitum, magnum, infra basin petalorum receptaculo affixum: labio interiore oblongo, carnosio, basi bicorni: exteriori turbinate, integerrimo, villosio, magno, in formam infundibuli convoluto.

Stam. Filamentum 1, subulatum, planum, breve, apici nectarii interioris insidens. Anthera operculata, biloba, lobis oblongis, compressis, nitidis.

Pist. Germen filiforme, contortum, florem sustinens. Stylus, & stigma nulla: nisi pro illis habeatur fulculus nectarii a stamine ad germen decurrens.

Peric. Abortiens.

Nom. (*Καλλίστα* pulcherrima) ex floris notabili pulchritudine.

Char. Gener. Cor. ventricosa, 5-petala: binis lateralibus unguiculatis. Nectarii labium exterius convolutum.

† Sp. I. CALLISTA AMABILIS. α *Nhánh gói* lon.

Differ. spec. Cal. parastitica, caule sub-erecto, sulcato: foliis lanceolatis, striatis: racemis simplicibus, reclinatis, sparsis.

Hab. Planta parasitica, perennis: bulbis linearibus, intricatis: caule sesquipedali, sub-erecto, crasso, tereti, sulcato; ad basin tumido.

Folia lanceolata, integerrima, striata, crassa, dura, apice reflexa, alterna, vaginantia. Flos candidus, nectario aureo, magno: racemis simplicibus, longis, reclinatis, lateralibus, sparsis.

Habitat in sylvis Cochinchinae, truncis arborum adhaerens.

† GENUS III. THRIXSPERMUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis amentiformis, linearis, compressus, carnosus: squamis alternis, acutis, monofloris. Perianthium nullum.

Cor. Petala 5, subulato-lineararia, longa, sub-æqualia, erecta.

Nectarium bipartitum, inter duo petala inferiora receptaculo affixum: labio interiore 3-fido, intra petala recepto, laciniis lateralibus obtusis, brevibus, mediâ longiore, conicâ, ascendente: labio exterioro ovato integro, extra petala infima exerto.

Stam. Filamentum 1, filiforme, breve, pistillo inhærens. Anthera ovata, 2-locularis, operculata.

Pist. Germen filiforme, rectum, florem sustinens. Stylus crassus, inæqualis, basi nectarii insidens. Stigma simplex.

Peric. Capsula oblonga, trigona angulis acutè emarginatis, 3-valvis, 1-locularis, polysperma.

Sem. Multa, longa, tenuissima, piliformia.

Nom. (Οριξ pilus: σπέρμα semen) ex seminibus piliformibus.

Char. Gener. Cor. petala 5, linearia, erecta. Nectarii labium exterius ovatum, exertum.

Sp. 1. THRIXSPERMUM CENTIPEDA. α. Nhánh gỏi rít.

Differ. spec. Thrix. Caulis parasitico, lateraliter radicante: foliis lanceolato-linearibus: spicis distichis, axillaribus.

Hab. Planta parasitica: caule longo, compresso, perenni: radicibus simplicibus, brevissimis, lateraliter adrepentibus. Folia lanceolato-lineararia, integerrima, reflexa, parva, vaginantia. Flos pallido-luteus, nectario rubescente: spicis amentiformibus, rectis, lateralibus.

Habitat in Cochinchinâ, ad arbores sylvestres adrepens.

† GENUS IV. GALEOLA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus, præter squamas parvas acutas.

Cor. Petala 5, ovata, sub-acuta, sub-æqualia, patentia.

Nectarium magnum, sub-globosum, integerrimum, galeæforme, partes generationis occultans: basi interiori corollæ adnatum.

Stam. Filamentum 1, membranaceum, conicum, breve, apice pistilli coalitum. Anthera oblonga, bilocularis, operculata, incumbens.

Pist. Germen lineare, teres, æquale, longum, florem sustinens. Stylus crassus, incurvus, tubulosus. Stigma concavum, inæquale.

Peric. Abortiens.

Nomen. Galeola, quasi parva galea: ex formâ Nectarii.

Char. Gener. Cor. petala 5, ovata. Nectarium sub-globosum, integrum.

† Sp. 1.

† Sp. 1. GALEOLA NUDIFOLIA. a Cley Nu deci.

Differ. spec. Gal. *Caule* scandente, nudifolio: *racemis* laxis, lateralibus.

Hab. *Caulis* fruticosus, 15 pedes longus, scandens: *cirrhis* crassis, solitariis. *Folia* nulla. *Flos* luteus, racemis compositis, magnis, laxis, lateralibus: *bractea* parva, carnosa, acuta, racemum totum fulcrite. *Radix* simplex, lignosa, longa, præmorsa, radiculis crassis, paucis. *Caule* aphyllis, & racemis accedit ad Orchem Aphyllam. Forsk. Arab. pag. 156. sp. 2.

Habitat in sylvis Cochinchinae.

† GENUS V. RENANTHERA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha sub-rotunda, monoflora, persistens.
Cor. Petala 5, oblonga, longitudine sub-æqualia, *expalla* & duo superiora obtusa, undulata: tria inferiora lanceolato-lineararia, plana. Nectarium bipartitum: labio interiore oblongo, carnoso, integro: exteriori 3-fido, laciniis lateralibus rotundatis, mediâ lanceolata, reflexâ, longiore.

Stam. Filamentum 1, breve, apici nectaris interioris insidens. Anthera biloba, operculata, magna: lobis reniformibus, divaricatis, lateraliter dehiscentibus.

Pist. Germen lineare, sulcatum, rectum, *florem* sustinens. Stylus planiunculus, ventricosus, incurvus, stamini annexus. Stigma obsolete rotundum.

Peric. Abortiens. Nomen Renanthera ob lobos antheræ reniformes patentes.

† Sp. 1. RENANTHERA COCCINEA. a Quæc lon dieca & c.

Differ. spec. Ren. *Caule* parastico, longo, lateraliter radicante: *foliis* oblongo-ovatis, emarginatis: *racemis* sub-simplicibus, sparsis.

Hab. *Caulis* perennis, parasticus, 5-pedalis, sub-simplicissimus, teres: *bulbis* linearibus, longis, lateralibus, radicanibus. *Folia* oblongo-ovata, emarginata, plana, crassa, vaginantia. *Flos* coccineus, magnus, pulcherrimus, *racemis* longis, sub-terminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinae per arbores repens.

+ GENUS VI. ARISTOTELEA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha acuta, 1-flora, persistens.

Cor. Petala 4, erecta: bina lateralia lanceolata, minora: summum, & infimum 3-fida, incurva, apice sub-reflexa.

Nectarium 1-phyllum, oblongum, integerrimum, sub-incurvum, carnosum.

Stam. Filamenta nulla. Anthera 1, lato-conica, 1-ocularis, operculata, apici interiori Nectarii infidens.

Pist. Germen longiusculum, florem sustinens. Stylus 0. Stigma fossula exigua ad basim antherae.

Peric. Capsula oblonga, contorta, 1-ocularis, 3-valvis, polysperma.

Sem. Plurima, ovata, minima.

Nom. ab Aristotele Philosopho, sectae Peripateticae Coryphæo, qui binos libros de Plantis nobis reliquit.

Char. Gener. Cor, petala 4, summum, & infimum trifida. Nectarium integrum, curvum. Anthera sessilis, conica.

† Sp. VI. ARISTOTELEA SPIRALIS. β. Hoañ lóm.

Differ. spec. Arista scapo sub-nudo: foliis subulatis, 3-nerviis: spicâ spirali.

Hab. Planta sub-acaulis, annua. Radix bulbi oblongi, fasciculati.

Folia radicalia, subulata, 3-nervia, curva, erecta. Scapus 8-pollicaris, teres, sub-nudus, terminatus spicâ erectâ, in spiram contortâ: floribus purpurascens, sessilibus, inodoris.

Habitat inculta, prope Cantonem Sinarum.

Observ. Assimilatur Ophri Spirali (Lin. sp. 3.): sed stamine, corollâ, & nectario; quod in nostrâ non est carinatum, neci grenulatum tam specie, quam genere longè differunt: bulbis vero, & formâ spicæ coherent.

DIANDRIA.

GENUS VII. ORCHIS.

Char. Gener. Nectarium corniforme pone florem. Lin. fy. pl. G. 1094

Sp. I. ORCHIS SUSANNÆ. β. Má chác lân.

Differ. spec. Orch. bulbis indivisis: nectarii alis amplioribus, ciliatis.

Lin. sp. 5.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, teres, simplicifolius, totus foliosus. *Radix* bulbus oblongus, crassus, indivisus. *Folia* lanceolata, glabra, alterna, vaginantia. *Flores* albi, magni, 4, 5 ad caulis apicem. *Nectarii* labium oblongum, integerrimum, recurvum: alis obrufis, fimbriatis, amplis, patentibus: *cornu* postico tereti, longissimo. *Filamenta* 2, breviter: *antheris* ovatis, operculatis. *Capsula* infera, oblonga, 6-gona, 1-locularis, polysperma: *feminibus* tenuissimis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.
Flos Susannæ. Rumph. Amb. l. 8. c. 70. tab. 99. Thunb. Japon. pag. 25.

Sp. 2. ORCHIS MORIO. *a* Cui deâi chon.
Differ. spec. Orch. *bulbis* indivisis: *nectarii* labio quadrifido, crenulato: *cornu* obruso, ascendente: *petalis* obrufis conniventibus. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* sesquipedalis, erectus, teres, simplex, foliosus, annuus: *radice* perenni, bulbo sub-rotundo, emarginato. *Folia* lanceolata, crassa, vaginantia. *Flos* albus, terminalis: *spicâ* simplici, erectâ, pauciflorâ. *Nectarii* labium obrufissimum, crenatum, reflexum. *Calcar* obtusum, breve. *Petala* obtusa, conniventia.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.
Orchis Morio femina. Bauh. Pin. pag. 82. n. 4.

Sp. 3. ORCHIS LATIFOLIA. *a* Hoàng môn.
Differ. spec. Orch. *bulbis* sub-palmatis, rectis: *nectarii* cornu conico: *labio* 3-lobo, lateribus reflexo: *bracteis* flore longioribus. Lin. sp. 22.

Hab., & notæ. *Radix* perennis, bulbi duo, oblongi, sub-recti. *Caulis* 1-pedalis, erectus, annuus. *Folia* lato-lanceolata, pauca. *Flos* rubescens, *spicâ* longâ, terminali: *bracteis* flore sub-longioribus. *Nectarii* cornu conicum: *labium* 3-lobum, lateribus reflexum.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ ad loca Borealia.
Orchis palmata palustris latifolia. Bauh. Pin. pag. 86. n. 12.

GENUS VIII. EPIDENDRUM.

Char. Gener. *Nectarium* turbinatum, obliquum, reflexum. Lin. fy. pl. G. 1101.

Sp. 1. EPIDENDRUM TUBEROSUM. *a* Hoa Lon tĩa.
Differ. spec. Ep. *foliis* lato-lanceolatis, nervosis, membranaceis, bulbo innatis: *scapo* vaginato: *nectario* cymbiformi, bifido. Lin. sp. 24.
Hab., & notæ. *Planta* terrestris, 1-pedalis: *caule* annuo, crasso, striato,

lucido, simplicissimo, erecto: *bulbo* radicali perenni, compresso-rotundo, fusco, solido, aliquando multiplici, radiculis plurimis, linearibus; longis. *Folia* radicalia, caulinaque, lato-lanceolata, plicato-sulcata, integerrima, glabra, erecta, vaginantia, dura, magna, pauca. *Flos* rubro-purpureus, inodorus, conspicuus, pedunculatus, racemo simplici, erecto, terminali. *Corolla* petala 5, oblonga, rotundata, sub-aequalia, sub-concava, patentia. *Nectarium* bipartitum, oblongum, nec turbinatum. *Filamenta* 2. *Capsula* infera, oblonga, 1-locularis, polysperma.

Habitat cultum in hortis Cochinchinae, & Chinae.

Angræcum Terrestre primum. Rumph. Amb. l. 11. c. 10. tab. 52. fig. 1. Epidendrum Tuberosum. Burm. Ind. pag. 190.

Sp. 2. EPIDENDRUM ENSIFOLIUM. A. Lân hōa. z. Hoa Lon tau.

Differ. spec. Ep. caule tereti, levi: *foliis* ensiformibus, striatis: *petalis* lanceolatis, glabris: *labio* recurvato, latiore. Lin. sp. 26.

Hab., & notæ. *Planta* terrestris, perennis, sub-acaulis: *radicibus* fasciculatis, rectis, parvis. *Folia* radicalia, ensiformia, striata, congesta, erecta, glabra, duriuscula, obscuro-virentia. *Scapus* sesquipedalis, sub-nudus, teres, tenuis, erectus, desinens in racemum simplicem, laxum, erectum, oblongum. *Flos* pedunculatus, luteo-viridis, lineolis rubris virgatus, odoris suavissimi. *Calyx* spatha parva, acuta, 1-flora, persistens. *Corolla* petala 5, lanceolata, plana, duo inferiora minora. *Nectarium* bipartitum: *labio* interiore oblongo, curvo, carnoso, staminifero: *exteriore* longiore, oblongo, undulato, reflexo, *petalis* maioribus æquali. *Filamenta* 2, brevia, elastica, nectario insidentia. *Anthera* simplices, lentilares, operculatæ. *Germen* lineare, contortum, florem sustinens. *Stylus* brevissimus, ad apicem labii carnosii nectarii intus adhærens. *Stigma* obsoletum. *Pericarpium* capsula oblonga, acutè trigona, 3-valvis, monolocularis, polysperma: *seminibus* plurimis, scobiformibus.

Habitat curiosè cultum in hortis Chinae, & Cochinchinae. Gaudet aliquibus varietatibus, quarum ea, quæ emitit flores integrè albos, omnium pretiosissima; quia odorem suavissimum, quamvis tenuem, nocte spirat.

Osbeck. (Itin. ad Sinas) floris spatham pro bractea, & labium nectarii pro sexto petalo habuit.

Observ. Genus Epidendrum 30 speciebus ditatum apud Linnæum valde obscurum manet, nec juxta characterem nimis vagum elucubrari potest: quod censeri debet de Nectario turbinato. De aliis speciebus alii autoptæ judicent: ego in binis acuratè observatis Nectarium turbinatum non inveni.

† GENUS IX. AERIDES.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha ovata, parva, persistens.

Cor. Petala 5, ovata, plana, expansa, sub-æqualia.

Nectarium 2-phyllum: labio interiore horizontali, oblongo, carnosissimo, concavo: exteriore operculiformi, incubante, hinc tubuloso, attenuato, ascendente, inde dilatato, 3-fido, laciniis lateralibus obtusis, mediâ conicâ, brevioribus.

Stam. Filamenta 2, brevia, elastica, apici nectarii interioris insistentia. Antheræ totidem, lenticulares, operculatæ.

Pist. Germen trigonum, tenue, incurvum, florem sustinens. Stylus nullus. Stigma fossula minuta ad basim staminum, ducens ad Germen.

Peric. Abortiens.

Nomen. Aerides dicitur, quasi aeris filia, in quo nascitur & nutritur.

Char. Gener. Monogyna. Cor. petala 5, ovata, plana. Nectarii labiura exterius claudens alterum.

† Sp. I. AERIDES ODORATA. α Phaong lon. β Fum lan.

Differ. spec. Aer. *foliis* linearibus, reflexis: *racemis* simplicibus, axillaribus.

Hab. *Planta* fruticosa, parasitica: *bulbis* radicalibus linearibus, longis, intricatis, plurimis. *Caulis* sub-erectus, 1-pedalis. *Folia* linearia, emarginata, crassa, magna, sub-incurva, reflexa: *petiolis* brevibus, vaginantibus. *Flos* pallidus, sub-carnosus, suaveolens: *racemis* simplicibus, longis, reclinatis, axillaribus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ, arboribus inhærens, vel ex illis pendula.

Observ. Mirabilis hujus plantæ proprietas est, quod ex sylvis domum delata, & in aere libero suspensa, absque ullo pabulo vegetabili terreo, vel aqueo in multos annos duret, crescat, floreat, & germinet. Vix crederem, nisi diurnâ experienciâ comprobassem.

TRIANDRIA.

GENUS X. SALACIA.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Anthera germinis apici insidentes. Lin. fy. pl. G. 1105.

† Sp. 1. SALACIA COCHINCHINENSIS. α Cây Trác mau.

Differ. spec. Sal. *Caulis* fruticoso: *foliis* sub-ferratis, oppositis: floribus congestis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, sub-erectus, 6-pedalis: *ramis* multis, tortuosis. *Folia* ovata, sub-acuminata, sub-ferrata, glabra, petiolata, opposita. *Flos* luteo-ruber, axillaris, congestus, parvus. *Bacca* sub-rotunda, inæqualis, rubescens, mediocrius, edulis. *Calyx* inferus, 5-partitus, patens, coloratus. *Corolla* petala 5, sub-rotunda, concava, patentia, calyce longiora. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 3, sub-rotundæ, bilobæ, germinis humeris insidentes, invicem distantes. *Germe*n compresso-rotundum. *Stylus* nullus. *Stigma* punctum minimum. *Pericarpium* Bacca 1-locularis, 3-sperma. *Semina* sub-rotunda, lævia. Salaciam Chinesem non vidi: dubito an sit eadem. Habitat in dumetis Cochinchinæ.

TETRANDRIA.

† GENUS XI. BLASTUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 4-gonum, quadridentatum, scabrum, erectum, inferum, persistens.

Cor. Petala 4, subulata, patentia; calyci infra dentes inhærentia, ipso longiora.

Stam. Filamenta 4, breviora, fundo calycis insidentia. Antheræ totidem, subulato-lineares, magnæ, versus stylum curvatæ: conyexitate stylo adpressæ.

Pist. Germina 20 circiter, ovata, lævia, glanduliformia, tergis antherarum sparsim adhærentia. Stylus subulatus, crassus, sub-tetragonus, corollâ longior. Stigma obsoletum.

Peric. Nullum, præter calycem conniventem, rotundatum, incrassatum, induratum, ore patulum, femina foventem.

Sem. Totidem, quot germina, oblongo-ovata, nuda, adhærentia receptaculo sub-quadrangolo, formato ex antheris, & stylo mutuo appressis, marcescentibus, persistens. Nom.

Nom. (Βλαστός γέρμεν) a Germinibus plantæ exoticis.

Char. Gener. Polygynus. Cal. 4-dentatus. Cor. infera, petala 4, lanceolata. Germina antheris infidentia.

- † Sp. 1. BLASTUS COCHINCHINENSIS. a Cay Mua rùng.
 Differ. spec. Bl. foliis lanceolatis, 3-nerviis: pedunculis polyfloris.
 Hab. Arbor parva, 6-pedalis, ramosissima. Folia lanceolata, acumine longo, 3-nervia, integerrima, opposita. Flos albus, pedunculis sparsis, polyfloris.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Rarum quidem est, quod antheræ infident germini: at profusum singulare in hac solâ plantâ inventum, quod germina, & nuda semina antheris inhæreant.

PENTANDRIA.

GENUS XII. PASSIFLORA.

Char. Gener. Trigyna. Cal. 5-phyllus. Nectar. Corona. Bacca pedicellata. Lin. sy. pl. G. 1110.

- Sp. 1. PASSIFLORA PALLIDA. a Cay Côm lang.

Differ. spec. Pass. foliis indivisis, ovatis, integerrimis: petiolis biglandulosis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Caulis perennis, longus, teres, ramosus, scandens: cirrhis solitariis. Folia ovata, indivisa, integerrima, glabra, opposita: petiolis biglandulosis. Flos pallidus, magnus, axillaris, binatus: corollâ 5-petalâ, planâ: nectario coronario: bacca ovatâ parvâ, 1-loculari, polyspermâ, pedicellatâ.

Habitat in æmētis Cochinchinæ.

Clematis Indica alia, flore minore, pallido. Plum. Amer. pag. 74. tab. 89. Murucuja quinta. Pfl. Brasil. l. 4. cap. 60. pag. 248. fig. ibi.

- Sp. 2. PASSIFLORA CÆRULEA. a Ú òi hoã.

Differ. spec. Pass. foliis palmatis integerrimis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. Caulis perennis, teres, scandens, longus, cirrhosus, ramosus. Folia palmata, 5-partita, integerrima, glabra, alterna: petiolis biglandulosis. Flos luteo-viridis, axillaris, solitarius, magnus: calyce 3-phyllis: corollâ 10-petalâ: nectario coronario, cæruleo: bacca ovatâ, pedicellatâ, polyspermâ.

Habitat prope Cantonem Sinarum, agrestis.

Passiflora foliis palmatis, quinque-partitis, integerrimis: involucri cordatis, triphyllis. Hort. Cliff. pag. 432. Granadilla polyphylla, fructu ovato. Tournef. Inst. pag. 24. sp. 10.

HEXANDRIA.

† GENUS XIII. BRAGANTIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus

Cor. Monopetala, supera: tubo globoso, 10-sulcato: limbo parvo, 3-fido, reflexo, laciniis obtusis, æqualibus.

Stam. Filamenta nulla. Antheræ 6, oblongæ, inflexæ, medio stylo in orbem adhaerentes, exterius dehiscences.

Pist. Germen lineare, inferum. Stylus crassus, corollæ brevior. Stigma concavum, integrum, erectum.

Peric. Siliqua longa, quadrangularis, 4-valvis, 4-locularis, polysperma.

Sem. oblonga, trigona, simplici ordine disposita.

Nomen plantæ communicavit Augustissimæ Domus Brigantiæ Soboles, Dom. Joannes de Bragança, Alafoniæ Dux, Academiae Regiæ Scientiarum Ulyssiponenfis Præses, decus, & columen.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 0. Cor. supera, æqualiter 3-fida. Siliqua 4-locularis, 4-valvis.

† Sp. I. BRAGANTIA RACEMOSA. α Hoa Den mpuac.

Differ. spec. Brag. foliis lanceolatis, integerrimis; racemis axillaribus.

Hab. Frutex 5-pedalis, sub-erectus, ramosus. Folia lato-lanceolata; integerrima, venosa, magna, alterna. Fløs fulco-ruber, racemis parvis, axillaribus.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS XIV. ARISTOLOCHIA.

Char. Gener. Hexagyna. Cal. 0. Cor. 1-petala, lingulata, integra. Caps. 6-locularis, infera. Lin. sy. pl. G. LIII.

Sp. I. ARISTOLOCHIA INDICA. α Cây Khoai cà.

Differ. spec. Ar. foliis cordatis, acutiusculis: caule volubili; pedunculis multifloris. Lin. sp. 13.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, teres, tenuis, multiplex, ramulosus, longus, intricatus. *Folia* cordata, oblonga, acuta, integerrima, glabra, periolata, alterna. *Flos* fusco-purpureus: *pedunculis* multifloris, axillaribus. *Calyx* nullus. *Corolla* supera, ligulata. *Antheræ* 6, *stylo* crasso, brevissimo insidentia. *Capsula* sub-rotunda, infera, hexagona, 6-locularis, polysperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, maximè in montibus dictis *Nguon nboung*.

Burm. Ind. pag. 191. Radix Pulononica. Rumph. Amb. l. 9. cap. 81. tab. 177. Aristol. Indica Odorata. Burm. Zeyl. pag. 32.

Virtus: radice, Atrenuans, Deobstruens. Prodest in Colicâ, cibi inappetentia, febribus intermittentibus, obstructionibus, hydrope. Sapor totius plantæ amarus. Odor tenuis.

OCTANDRIA.

† GENUS XV. PHAIUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha ovato-lanceolata, magna, persistens, 1-flora.

Cor. Petala 5, lanceolata, striata, crassa, expansa, sub-æqualia.

Nectarium 2-partitum: labium interius cymbæforme, carnosum: exterius magnum, convolutum, sub-infundibuliforme, margine reflexâ, undulatâ, basi emarginatâ, appendicularâ.

Stam. Filamenta nulla, præter membranam oblongam, horizontalem, rugosam, coloratam, styli basi adhærentem. Antheræ 8, sub-ovatæ, operculatæ, inæquales, dictæ membranæ bino ordine instratæ.

Pist. Germ. oblongum, curvum, 6-sulcatum, florem sustinens. Stylus planus, brevis, inflexus, apici interioris nectarii insistens. Stigma simplex: apex ejusdem styli coloratus.

Peric. Capsula oblonga, 6-lobata, curva, 1-locularis, polysperma.

Sem. Plurima, scobiformia.

Nom. (*Phaios*, fuscus) a colore floris, sub-nigro.

Char. Gener. Monogynus. Cal. spatha. Cor. petala 5 lanceolata, superâ. Nectar. lab. convolutum, undulatum.

† Sp. 1. PHAIUS GRANDIFOLIUS. *Hæc* linn. *β*.
Differ. spec. *Pha. foliis* lanceolatis, plicato-sulcatis, *capo* nudo, polyfloro.

Hab.

Hab. *Planta* terrestris, caule sesquipedali, simplicissimo, tereti, crasso, erecto. *Folia* lato-lanceolata, magna, plicato-sulcata, glabra, erecta, pauca, amplexicaulia: *Scapus* nudus, teres, polyflorus, caulem æquans. Color floris a facie sub-niger, a tergo albus. Odor nullus.

Habitat cultus in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, pulchritudine floribus æstimabilis.

DECANDRIA.

GENUS XVI. HELICTERES.

Char. Gener. Pentagyna. *Cal.* 1-phyllus, obliquus. *Petala* 5. *Nectarium* foliolis 5. *Caps.* 5, intortæ. Lin. sy. pl. G. 1114.

Sp. 1. HELICTERES ANGUSTIFOLIA. 3 Sān chí mǎ.

Differ. spec. Hel. *foliis* lanceolatis, integerrimis: *fructu* ovato, recto. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus, ramosus. *Folia* lanceolata, integerrima, facie nitida, tergo venosa, tomentosa, petiolata; alterna. *Flos* dilute purpureus, pedunculis 2-floris, axillaribus. *Calyx* tubo longo, curvo: limbo brevi, 4-fido, lacinia summa emarginata. *Corolla* petala 5, rotundata, parva, ad basin denticulo aucta. *Filamenta* 10, brevissima, omnia in tubum longum coalita, vel, si velis, tubo insistentia: *antheris* incumbentibus. *Stylus* 1, sub-æqualis staminibus. *Capsule* 5, coalite in unam oblongo-ovatum, rectam, pedicellatam: seminibus plurimis, angulatis.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Osbeck. Tr. ad Sinas.

† Sp. 2. HELICTERES HIRSUTA. 2 Cáy súi Chonq.

Differ. spec. Hel. Decandra: *foliis* cordatis, serratis: *fructu* 5-loeulari, recto, hirsutissimo.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 6-pedalis, erectus, teres, pilosus: ramis diffusis. *Folia* sub-cordata, apice acuta, serrata, tomentosa, alterna, petiolata, magna. *Flos* obscuro-purpureus: *pedunculis* polyfloris, axillaribus. *Calyx* 1-phyllus, tubo longo, curvo, piloso, colorato: limbo brevi 4-fido, lacinia suprema emarginata. *Corolla* petala 5, turbinato-oblonga, inæqualia, conniventia, supra basin denticulo appendiculata ex utraque parte: *unguibus* longis receptaculo inhaerentibus. *Filamenta* 10, breviora, sub-æqualia, omnia in tubum longum, curvum, receptaculo insidentem inferius terminata:

ta: *antheris* ovatis, bilocularibus, incumbentibus. *Germen* ovatum; 5-gonum, superum, pedicello longo ad os tubi staminei elevatum. *Stylus* filiformis, tenuis, longior staminibus, germinis apici insistentis. *Stigma* crassiusculum, minimum. *Pericarpium* Capsula oblonga, pedunculata, 5-valvis, 5-locularis, polysperma, obtusa, recta, hirsutissima, pilis longis ramosis, duriusculis, plurimis. *Semina* ossea, angulata.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ.

Observ. In hac, & præcedente specie stamina non sunt Gynandra, sed potius Monadelphia: nec pedicellus elevans germen (ab staminibus prorsus liber) pro receptaculo haberi potest.

† Sp. 3. HELICTERES UNDULATA. a Cay Úsi deã lá.

Differ. spec. Hel. Decandra: *foliis* lanceolatis, undulatis: *floribus* congestis: *Siliquis* 5, stellatis.

Hab., & notæ. Arbor mediocris; *ramis* patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, undulata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* parvus, rubro-viridis, congestus, sub-terminalis. *Calyx* nullus. *Corolla* 5-petala. *Anthera* 10, sessiles, biloculares, germini ad basim insistentes. *Germen* pentagono-rotundum, pedunculatum, superum. *Stylus* filiformis, reflexus. *Stigma* orbiculatum, 5-partitum. *Pericarpium* siliquæ 5, oblongæ, crassæ, coccineæ, superius rectæ, subius convexæ, in formam stellæ horizontaliter ordinatæ. *Semina* pauca, ovata, lævia, fusca, carnosa, utriusque valvæ pedicellis propriis adhærentia.

Habitat in Sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 4. HELICTERES PANICULATA. a Cay Úsi tlõn lá.

Differ. spec. Hel. Polyandra: *foliis* ovatis, acutis: *floribus* paniculato: *siliquis* 5, stellatis.

Hab., & notæ. Arbor magna: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, sub-acuminata, integerrima, plana, glabra, alterna, petiolata. *Flos* rubescens, paniculis laxis, sub-terminalibus. *Calyx* nullus. *Corolla* 5-petala, patentissima. *Anthera* sessiles ultra 20, medio germini lateraliter adhærentes. *Stylus* filiformis, curvatus: *stigmatibus* convexo, emarginato. *Siliquæ* 5, oblongæ, bivalves, rubræ, polysperma, in orbem radiatæ.

Habitat in Sylvis Cochinchinæ.

POLYANDRIA.

GENUS XVI. POTHOS.

Char. Gener. *Spatha* *Spadix* simplex. *Cal.* o. *Petala* 4. *Stam.* 4.
Bacca 2-spermæ. Lin. sy. pl. G. 1122.

Sp. I. POTHOS SCANDENS. 2. Cây Ráy leo.

Differ. spec. Pot. *petiolis* latitudine foliorum : *caule* radicante. Lin.
 sp. I.

Hab., & notæ. *Planta* sub-parasitica, perennis : *radice* terrestri : *caule* tereti, longo, multiplici, parum ramoso, per arbores adrepente, *radiculis* lateralibus, brevibus, tenuibus. *Folia* oblonga, acuta, integerrima, glabra : *petiolis* longis semiaplexicaulibus, alternis, membranaceis. *Flos* pallidus, spadice oblongo, terminali, toto flosculis tecto : *spatha* communi : *perianthio* nullo : *corollâ* 4-petalâ. *Stamina* plerumque 4, *Bacca* rubra, sub-ovata, succosa, parva. 1-2-sperma. *Folia* multo latiora sunt petiolis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Appendix arborum. Rumph. Amb. l. 9. cap. 86. tab. 181. fig. 2.

Observ. Appendix duplo folio (Rumph. Amb. l. 9. pag. 490. tab. 184. fig. 1. 2. 3.) tanquam *Pothos Scandens* a Linnæo hoc loco citatur : quæ planta non est *Pothos*, sed *Flagellaria Repens* : prout jam supra diximus Classe sextâ, Genere 26. sp. 2. ubi videri potest.

GENUS XVIII. CALLA.

Char. Gener. *Spatha* plana. *Spadix* tectus flosculis. *Cal.* o. *Pet.* o.
Bacca polyspermæ. Lin. sy. pl. G. 1121.

† Sp. I. CALLA OCCULTA. 2. Cây Ôi.

Differ. spec. *Cal. foliis* cordato-ovatis : *Spatha* spirali : *spadice* supernè masculo.

Hab., & notæ. *Planta* 1-pedalis, perennis, sub-acaulis. *Folia* cordata, ovata, glabra ; multa, diffusa, petiolis longis, canaliculatis, basi dilatatis, interiores amplectentibus. *Spatha* longa, plana, in helicem voluta, flores (etiam in maturescentiâ) occludens. *Spadix* oblongus, totus tectus flosculis, inferius mixtis, ad apicem masculis. *Calyx* nullus. *Corolla* nulla. *Filamenta* brevia, sparsa. *Stigma* concavum, 3-fidum, sessile. *Bacca* 3-loba, 3-locularis, polysperma, lutea.

Habitat loca humida Cochinchinæ.

Dracunculus Amboinicus, *Anappur alba*? Rumph. Amb. 1. & c. 88. tab. III. fig. 2.

GENUS XIX. ARUM.

Char. Gener. *Spatha* monophylla, cucullata. *Spadix* supra nudus, infernè foemineus, medio stamineus. Lin. fy. pl. G. III9.

Sp. 1. ARUM DRACONTIUM. α Cú Chăóc: Bán há. β Puón há.

Differ. spec. Ar. *foliis* pedatis: *foliolis* lanceolatis; integerrimis; superantibus *spatham* *spadice* brevior. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Planta* 8-pollicaris, acaulis, annua: *radice* perenni, bulbo sub-rotundo, folido, extra, & intus albo, lævi. *Folia* pedata, petiolata, erecta: *foliolis* lato-lanceolatis; integerrimis; plerumque ternis. *Spadix* generis proprius, subulatus, tenuis; tam *spathâ*, quam *foliis* longior.

Habitat incultum in hortis, & agris Cochinchinæ, & Chinæ.

Ar. *Dracontium*, acaule, *foliis* pedatis, receptaculo *spathâ* longiore.

Thunb. Japon. pag. 233. *Arum*, sive *Arisarum Virginianum*, *Dracontii* folio, pene viridi, longo, acuminato. Pluk. Almag. pag. 52. tab. 271. fig. 2.

Virtus: radice. Exsiccans, Aperiens, Incidens. Prodest validè in morbis pituitosis: quod frequenti usu a Medicis indigenis probatum. Ut mitius operetur, sublatâ nimîâ acrimoniâ, per coctionem, vel infusionem in aquâ *Zingiberis* obrinetur, & leviter ad ignem torretur.

Sp. 2. ARUM TRIPHYLLUM. β Puón há. α Bán há tau.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* ternatis: *floribus* monoicis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Planta* 10-pollicaris, acaulis, annua: bulbo sub-rotundo, albo, perenni. *Folia* lanceolata, ternata. *Spatha*, & *Spadix* ut præcedentis. *Spica* unica, *floribus* inferioribus foemineis, superioribus masculis. A superiore differt *foliolis* distinctis, non pedatis: bulbo radice minore, ac magis globoso, simulque virtute Medicâ fortiore.

Habitat incultum in Chinâ, & Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 233. *Arum*, sive *Arisarum minus triphyllum*. Pluk. Amalth. pag. 39. tab. 376. fig. 3.

Sp. 3. ARUM PENTAPHYLLUM. β Tien nân sîn. α Nom tinh tau.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* quinatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Planta* 1-pedalis, sub-caulescens, erecta, annua: *radice* perenni, bulbo albo, compresso-rotundo. *Folia* quinata, lanceo-

ceolata, integerrima, glabra. *Spatha*, *spadix*, *strobili* generis proprii.

Habitat incultum in Chinâ.

Burm. Ind. pag. 192. Ar. Pentaphyllum Indicum. Morif. hist. 3. pag. 540. tab. 5. fig. 27.

Virtus: radicis. Calefaciens, Attenuans, Deobstruens. Prodest in Epilepsia, Convulsionibus, Uteri obstructionibus: humores crassos incidit: moribus animalium venenatis medetur.

Sp. 4. ARUM TRILOBATUM. α Nam tinh.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* sagittato-trilobis: *strobili* sessili. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Planta* 1-pedalis, acaulis, erecta, annua: *radice* perenni, bulbo sub-rotundo, compresso, glabro, semipollicari. *Folia* basi cordata, 3-loba, magna, pauca, lobis ovatis, sub-acutis: *petiolis* longis, angulatis, striatis, basi dilatatis, concavis. *Scapus* foliis brevior. *Spatha* latissima, plana, acuminata, fusco-rubra. *Spadix* sub-sessilis, subulatus, *spatha* brevior, apice masculus, basi foemineus, in medio consitus villis plurimis, longis, flexuosis, rubris.

Habitat in Cochinchinâ.

Arifarum Amboinicum. Rumph. Amb. l. 8. c. 86. tab. 110. fig. 2. Arum trilobato folio humilium, & minus, Zeylanicum. Herman. Parad. Bat. pag. 79. tab. 78.

Virtus: rad. Attenuans, Incidens, ferè eadem, quæ Ari Pentaphylli.

Sp. 5. ARUM SAGITTIFOLIUM. α Ráy tiá. β Tái lei thâu.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* sagittatis, triangulis: angulis divaricatis, acutis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 4-pedalis, erecta. *Folia* sagittata, basi bifida, divaricata, angulis omnibus acutis, fusco-viridia, magna: *petiolis* teretibus, rubro, & nigro maculatis. *Spatha* longa, cucullata. *Spadix* clavatus, brevior. *Scapi* breviores petiolis.

Habitat cultum, incultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Arum acaule, *foliis* sagittatis, triangulis, acutis: angulis extrorsum flexis. Cliff. pag. 345. sp. 3. Arum minus, sagittariæ foliis ex insulâ Barbados. Pluk. Phyt. tab. 149. fig. 2.

Ufus esculentus, minus frequens, quamvis cæteris mitius

Sp. 6. ARUM COLOCASIA. α Ráy Búc hà.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* peltatis, ovatis, repandis, basi emarginatis. Lin. sp. 5.

Hab.,

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 5-pedalis: *radice* magnâ; oblongâ, basi rotundatâ. *Folia* peltata, ovata, sub-acuminatâ, repandâ, marginatâ, cinerea, magna, basi semibifidâ, rotundatâ: *petiolis* crassis, erectis, sub-teretibus, albicantibus, inferius dilatatis. *Scapus* brevis, *spathâ* subulatâ, reflexâ, planâ. *Spadix* subulatus, *spathâ* brevior, flosculis Ari propriis.

Habitat cultum in Cochinchinâ.

Arum Ægyptium, & Caladium sativum. Rumph. Amb. l. 8. c. 84. tab. 109. Arum maximum, Ægyptium, quod vulgo Colocasia. Bauh. Pin. pag. 195. n. 6.

Ufus. Esca est salubris, & frequens, quamvis non delicata. Radix, & petioli cocti, folia tenera etiam cruda eduntur.

Sp. 7. ARUM ESCULENTUM. α Cay Môn. g Hai Yú.

Differ. spec. Ar. *foliis* ovatis, peltatis, integerrimis: basi emarginatis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 3-pedalis: *radice* bulbo magno, sub-ovato, fusco, solido: bulbis parvulis lateraliter accrescentibus. *Folia* peltata, ovata, integerrima, glabra, lætè viridîa: basi semibifidâ, sub-rotundâ: *petiolis* teretibus, ad basim dilatatis, interiores amplectentibus. *Spatha* recta, patens, non callata. *Spadix* brevior, apicè nudus, basi foemineus, medio masculus.

Habitat frequentissimè in Cochinchinâ, & Chinâ, maximè ad ripas fluminum, & paludum margines in aquâ non profundâ.

Thunb. Jap. pag. 234. Caladium aquatile, Kelady Xula. Rumph. Amb. l. 8. c. 85. tab. 110. fig. 1.

Ufus. Cibus est communissimus in utroque regno. Radix, & petioli teneriores eduntur semper cocti. Folia cum sale contusa tumores magnos resolvunt: contra morsus venenatos proficiunt.

Sp. 8. ARUM MACRORRHIZUM. α Ráy tláng. g Dea vú.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* peltatis, cordatis, repandis: basi bipartitis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 3-pedalis: *radice* simplici, longâ, obliquâ. *Folia* cordata, repandâ, peltata, basi bipartita, sub-rotundâ. *Spatha* cucullata, brevis. *Spadix* totus tectus, superne masculus, inferne foemineus. *Baccula* sub-rotundæ, rubræ. Habitat loca plana, præsertim humida in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 192. Arum Zeylanicum macrorrhizon. Burm. Zeyl. p. 34.

Sp. 9. ARUM ARISARUM. α Ráy hoang.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* cordatis oblongis: *spathâ* aperturâ ovatâ. Lin., sp. 157.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, sesquipedalis: *radice* oblongâ, crassâ. *Folia* oblonga, sub-acuta, basi cordata; aperturâ rotundatâ ad apicem petioli perductâ. *Spatha* erecta, supernè integra, cucullata, inflexa, foliis brevior. *Spadix* curvatus. *Baccula* 1-spermae, rubrae.

Habitat in sylvis, & sepibus Cochinchinæ.

Arifarum Latifolium maius. Bauh. Pin. pag. 196. n. 1. Hill. Brit. herb. pag. 336. tab. 49. fig. 11.

† Sp. 10. ARUM INDICUM. α Ráy Cáy.

Differ. spec. Ar. *Caulescens*, sub-erectum: *foliis* ovatis, basi bifidis, rotundantis: spadibus axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 5-pedalis, brachium crassus, plerumque erectus. *Folia* maxima, ovata, sub-acuminata, basi bifida, rotundata, costis multis, transversis, parallelis: *petiolis* longis, subulatis, erectis, amplexicaulibus. *Spathæ* axillares, parvæ, acute, rectæ, convolutæ. *Spadix* subulatus, erectus: flosculis foemineis ad basim insertis: *baccis* sub-rotundis, pallidis, parvis.

Habitat cultum in Cochinchinâ. Ejus caulis elixus esculentus est.

Arum Indicum fativum. Rumph. Amb. l. 8. cap. 81. tab. 106.

† Sp. 11. ARUM CUCULLATUM. β Chim mī vù.

Differ. spec. Ar. *Caulescens*, erectum: *foliis* peltatis, cordatis, auriculis cucullatis.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, caule erecto, 2-pedali: *radice* carnosa, magnâ, tereti, simplicissimâ. *Folia* peltata, cordata, acuminata, basim auriculis concavis: *petiolis* longis, teretibus. *Spadix* brevis, ferè totus tectus flosculis. Foeminei ad basim: *baccis* 4-spermis.

Habitat in Suburbis Cantonienfibus.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

1. ZANNICHELLIA. Masc. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
 Fœm. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Pist.* 4.
Sem. 4.
- † 2. NYMPHANTHUS. Masc. *Cal.* multiplex. *Cor.* nulla.
 Fœm. *Cal.* multiplex. *Cor.* nulla. *Stigm.*
 3. *Fructus* 3-locularis, 2-spermus.
- † 3. POLYPHEMA. Masc. *Spathæ* lunatæ, claudentes ament.
 ovatum, solidum, flosculis tectum. *Pe-*
riant. o. *Cor.* o.
 Fœm. *Spathæ*, & *Am.* ut Masc. *Periant.*
 o. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Bacca* 1-sperma, par-
 tialis.
- † 4. MORELLA. Masc. *Cal.* Amenti. *Cor.* o. *Anthera* sel.
 filis.
 Fœm. *Cal.* Am. *Cor.* o. *Stigm.* 2. *Drupa.*
5. CASUARINA. Masc. *Cal.* Amenti. *Cor.* Squamulæ bipar-
 titæ.
 Fœm. *Cal.* Am. *Cor.* o. *Styl.* 2-fidus. *Strabi-*
bilis.

DIANDRIA.

6. LEMNA. Masc. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o.
 Fœm. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Capf.*
 1-locularis.

TRIANDRIA.

7. ZEA. Masc. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis.
 Fœm. *Gluma.* 1-flora. *Gluma* 2-valvis. *Styl.*
 1. *Sem.* 1, nudum, sub-rotundum.
8. COIX. Masc. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis.
 Fœm.

MONŒCIA.

9. OLYRA. *Masc. Gluma 1-flora. Gluma 2-valvis. Styl. 2-fidus. Sem. 1, cortice oleo.*
Fœm. Gluma 2-flora. Gluma 2-valvis. Styl. 2-fidus. Sem. 1, cortice oleo.
10. TYPHA. *Masc. Gluma 1-flora. Gluma 2-valvis. Styl. 2-fidus. Sem. 1, nudum.*
Fœm. Gluma 1-flora. Gluma 2-valvis. Styl. 2-fidus. Sem. 1, nudum.
- † 11. RHAPHIS. *Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 0.*
Fœm. Cal. capillaris. Cor. 0. Styl. 1. Sem. 1, pappigerum.
- † 11. RHAPHIS. *Masc. Involucrum 3-florum. Cal. Gluma 2-valvis. Cor. Gluma 2-valvis.*
Fœm. Invol. Cal. Gluma 2-valvis. Cor. Gluma 2-valvis, una aristata. Styl. 2. Sem. 1, oblongum.
12. PHYLLANTHUS. *Masc. Cal. 6-partitus. Cor. 0.*
Fœm. Cal. 6-partitus. Cor. 0. Styl. 3. Fructus 3-locularis.

TETRANDRIA.

13. BUXUS. *Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 2-petala.*
Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. 3-petala. Stigm. 3. Caps. 3-locularis.
14. MORUS. *Masc. Cal. 4-partitus. Cor. 0.*
Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. Styl. 2. Sem. 1, baccatum.
15. CICCA. *Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. 0.*
Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. Styl. 4. Bac. 4-sperma.
- † 16. TRICARIUM. *Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. 0.*
Fœm. Cal. 4-partitus. Cor. 0. Stigma laciniatum. Drupa 3-locularis.
17. URTICA. *Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. Nectar. Cyathiforme.*
Fœm. Cal. 2-valvis. Cor. 0. Stigm. villosum. Sem. 1, ovatum.

PENTANDRIA.

- † 18. POLYCHROA. *Masc. Cal. 5-fidus. Cor. 0.*

- is. *Styl.*
 is. *Styl.*
 i. *Sem.*
 Gluma
 or. *Glum.*
 2. *Sem.*
Styl. 3.
 a. *Sti-*
 2. *Sem.*
 4. *Bac.*
 ma *la-*
 r. *Cya-*
 i. *villo-*
- Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stigma* 1.
Caps. 1-sperma.
19. AMARANTHUS. *Masc. Cal.* propr. 5-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 3; vel 5.
 Fœm. *Cal.* idem. *Cor.* o. *Styli* 3; *Caps.* circumscissa.
- † 20. HEXADICA. *Masc. Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 5-petala.
 Fœm. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Stigm.* 6.
Caps. 6-locularis.
- † 21. TREMA. *Masc. Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o.
 Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stigm.* 2.
Drupa foraminosa.
22. XANTHIUM. *Masc. Cal.* comm., polyphyllus, *Cor.* 5-fida. *Filam.* connexa.
 Fœm. *Cal.* o. *Cor.* o. *Styli* 2. *Drupa* 2-locularis.
- † 23. VANIERIA. *Masc. Receptac.* commune. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o.
 Fœm. *Receptac.* idem. *Cal.* ut *Masc.* *Cor.* o. *Styl.* 1; *Sem.* 1, nudum.

H E X A N D R I A.

- † 24. NEPHROIA. *Masc. Cal.* 5-partitus. *Cor.* 3-petala.
 Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 6. *Drupa* 6, reniformes.
25. COCOS PALMA. *Masc. Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
 Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 3. *Drupa* trigona, cortice fibroso.

P O L Y A N D R I A: *Stam.* plura, quam 7.

26. ARECA PALMA. *Masc. Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 9, five plura.
 Fœm. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Pist.* 1. *Drupa* ovata, folida.
27. CARYOTA PALMA. *Masc. Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* plurima.
 Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 2-fidum. *Drupa* globosa, folida.

28. SAGITTARIA. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 24 circiter.
 Fœm. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Pistilla* 100. *Semina* numerosa.
29. FAGUS. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0. *Stam.* 12 circiter.
 Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Caps.* 2-sperma.
30. QUERCUS. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0. *Stam.* 10 circiter.
 Fœm. *Cal.* integer. *Cor.* 0. *Styli* 5. *Glans* coriacea.
31. JUGLANS. Masc. *Ament.* imbricatum. *Cor.* 6-partita. *Stam.* 18 circiter.
 Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Styli* 2. *Drupa* coriacea.
- † 32. CLADODES. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 8.
 Fœm. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-locularis.
- † 33. PHYLLAUREA. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* 30 circiter.
 Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Bacca* 3-locularis.
- † 34. TRIDESMIS. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20.
 Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Styli* in 3 fasciculos collecti. *Caps.* 3-locularis.
- † 35. TRIPHACA. Masc. *Cal.* 0. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 15.
 Fœm. *Cal.* 0. *Cor.* 5-fida. *Styl.* 1. *Legumina* 3.
- † 36. DIAPHORA. Masc. *Cal.* Gluma 2-flora. 3-valvis: intima aristata. *Cor.* Gluma 2-valvis, mutica. *Stam.* 10.
 Fœm. *Cal.*, & *Cor.* ut Masc. *Stigm.* 3. *sessilia.* *Cem.* 1, triquetrum.
- M O N A D E L P H I A.
37. PINUS. Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* plurima.
 Fœm.

M O N O E C I A.

547

38. CUPRESSUS. *Fœm. Ament. strobilaceum. Cor. o. Pist. 2. Noces 2, alata.*
Masc. Amentum. Cor. o. Antheræ 4, seffiles.
Fœm. Ament. strobilac. Cor. o. Stigm. 2. Nax angulata.
39. THUJA. *Masc. Amentum. Cor. o. Antheræ 4.*
Fœm. Ament. strobilac. Cor. o. Pist. 2. Nuc cincta alâ.
40. CROTON. *Masc. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala: Stam. 15.*
Fœm. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Styli 3. Caps. 3-cocca.
41. RICINUS. *Masc. Cal. 5-partitus. Cor. o. Stam. multa.*
Fœm. Cal. 3-partitus. Cor. o. Styli 3. Capsula 3-cocca.
42. JATROPHA. *Masc. Cal. o. Cor. 5-fida. Stam. 10.*
Fœm. Cal. o. Cor. 5-petala. Styli 3. Caps. 3-cocca.
43. STERCULIA. *Masc. Cal. 5-partitus. Cor. o. Stam. 15 circiter.*
Fœm. Cal. 5-partitus. Cor. o. Stylos 1. Caps. 5-locul.
- † 44. VERNICIA. *Masc. Cal. 2-fidus. Cor. 5-petala. Stam. 10.*
Fœm. Cal. ? Cor ? Stigma obtusum, 3-fidum. Drupa, nuce 3-loculari.

S Y N G E N E S I A.

45. TRICHOSANTHES. *Masc. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida, cincinata. Filam. 3.*
Fœm. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida, cincinata. Stylus 3-fidus. Pomum oblongum.
46. MOMORDICA. *Masc. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida. Filam. 3.*
Fœm. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida. Styl. 3-fidus. Pomum elasticum.
47. CUCUMIS. *Masc. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida. Filam. 3.*
Fœm. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-fida. Styl. 3-fidus.

- 3-fidus. *Pomum* : *seminibus argutis*.
48. CUCURBITA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
Foem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Styl.*
3-fidus. *Pomum* : *sem. marginatis*.
49. BRYONIA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Fi-*
lam. 3.
Foem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita.
Styl. 3-fidus. *Bacca*.
50. MURICIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Fi-*
lam. 3.
Foem. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Styl.*
sub-integer. *Bacca* : *semin.* orbiculatis.

MONANDRIA.

GENUS I. ZANNICHELLIA.

Char. Gener. Masculi. Cal. o. Cor. o.

Feminei. Cal. 1-phyllus. Cor. o. *Germina* circiter 4. *Semina* totidem. Lin. fy. pl. G. 1124.

† Sp. I. ZANNICHELLIA TUBEROSA. α. Mạch môn nam.

Differ. spec. Zan. *foliis* ensiformibus, radicalibus: *floribus* spicatis: *radice* tuberosa.Hab., & notæ. *Planta* perennis: caule nullo. *Radix* tuberibus plurimis, fasciculatis, oblongis, utrinque acutis, albis. *Folia* ensiformia, 1½-pedalia, plana, striata, obscuro-viridia, glabra, sessilia. *Scapus* teres, nudus, erectus, foliis brevior: *spica* simplici, longâ. *Flos* masculus apetalus, *stamine* unico, *calyce* nullo. *Femineus* in eadem spica, *calyce* 1-phylo, 6-partito. *Bacca* ovato-oblongæ, monospermæ.

Habitat loca humida Cochinchinæ, non frequens.

† GENUS II. NYMPHANTHUS.

*Descriptio Naturalis.** *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-fidum, laciniis sub-rotundis, patentibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, crassum, subulatum, calyci æquale. Anthera ovata, magna, 4-locularis, erecta. Glandulæ 4, orbiculatæ ad basim staminis.

* *Femineus flos* in eodem ramo.Cal. Perianthium 6-phyllum, inferum, persistens: *foliolis* ovatis, patentibus.

Cor. nulla. Nectarium 6-fidum, laciniis emarginatis, marcidis.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus 1, crassus, calyce longior. Stigmata 3, bifida.

Peric. Capsula compresso-rotunda, obtusè trigona, trilocularis, bisperma.

Sem. hinc gibba, inde angulata.

Nom. (Νύμφη sponsa: ἄνθος flos.) ob flores in variis speciebus sic dispositos, ut singuli singulis desponderi videantur, Feminei Masculis.

Char. Gener. Masc. Cal. multiplex. Cor. o. Stamen 4-6-loculare.

Fœm. Cal. multiplex. Cor. o. Fructus 3-locularis, 2-spermus.

- † Sp. 1. NYMPHANTHUS SQUAMIFOLIA. Cay Bay oïc.
 Differ. spec. Nymph. foliolis sub-rotundis, imbricatis: floribus solitariis.
 Hab. Arbor magna: ramis ascendentibus: cortice fusco, crasso, fisco: ligno durissimo, gravi, fusco-rubro. Folia alternatim-pinnata, plurimi-juga: foliolis sub-rotundis, minimis, sub-sessilibus, imbricatis. Flos axillaris, solitarius, minimus: pedunculis brevibus, retro curvatis, fœminæ crassioribus, brevioribus, in eodem ramo, sparsis. Capsula 3-valvis, 3-locularis, 2-sperma.
 Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.
 Usus. Lignum ad ædificandum idoneum.
 Virtus: foliorum, florum, & fructuum. Resolvens, Emolliens, Anodyna. Usus præcipuè in affectionibus pectoris, renum, ac vesicæ.
- † Sp. 2. NYMPHANTHUS PILOSA. α Cay Bot mtoï.
 Differ. spec. Nymph. foliolis ovatis, acutis, utrinque pilosis: floribus geminis: fructu baccato, axillari.
 Hab., & notæ. Arbor medioeris, ramosissima, expansa. Folia alternè pinnata: foliolis ovatis, sub-acuminatis, integerrimis, utrinque pilosis. Flos geminus, apetalus, masculus, & fœmineus in eadem axillâ. Masculi calyx 6-phyllus, foliolis lanceolatis, erectis. Anthera 1, ovalis, sessilis, 6-locularis. Fœminei calyx similis. Stylus crassus, brevis: stigmatibus 3, longiusculis, erectis. Bacca parva, compresso-rotunda, 6-loba, 3-locularis, 2-sperma.
 Habitat in sylvis Cochinchinæ.
- † Sp. 3. NYMPHANTHUS CHINENSIS. β Siong chu tsao.
 Differ. spec. Nymph. foliis oblongis, acuminatis: floribus sub-ternis, masculis inferioribus: caule fruticoso.
 Hab., & notæ. Caulis fruticosus, 4-pedalis, erectus, ramosissimus. Folia oblonga, acuminata, integerrima, tomentosa, alterna, petiolata. Flos uterque apetalus, lateralis, 1-3-natus, masculus inferior, pedunculis longioribus. Anthera 6-locularis. Stylus nullus. Germen apice pertusum loco stigmatibus. Bacca 3-locularis, 2-sperma.
 Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.
- † Sp. 4. NYMPHANTHUS RUBRA. α Cay Do ðct.
 Differ. spec. Nymph. foliolis ovatis, glabris: floribus axillaribus, congestis, mixtis. Fructu capsulari.
 Hab.,

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus, ramulis rubris. *Folia* alternè pinnata, multi-juga: *foliis* ovatis, integerrimis, glabris. *Flos* apetalus, congestus, mas, & foemina in eadem axillâ. *Masculi calyx* cyathiformis, 6-fidus, laciniis brevibus, rotundatis, patentibus. *Filamentum* 1, cylindraceum, crassum. *Antheræ* 3, biloculares, oblongæ, filamento parallelæ, in longitudinem adhaerentes. *Femine calyx* rotatus, 6-fidus, coloratus, laciniis rotundatis, undulatis. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida, reflexa. *Capsula* sub-rotunda, 3-valvis, 3-locularis, 2-spermatosa. *Sides*.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Sp. 5. NYMPHANTHUS NIRURI. Cây Chó de. *Caulis* herbaceo: *foliis* ovato-oblongis: *floribus* geminis, pedunculis retortis: *fructu* capsulari.

Habitus, & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, teres, ramis paucis, erectis. *Folia* alternatim pinnata, multi-juga: *foliis* ovato-oblongis, integerrimis, obtusis, glabris, pallide virentibus, minusculis. *Flos* 2-natus, mas, & foemina in eadem axillâ: *pedunculis* post terga foliorum retortis. *Corolla* utriusque nulla. *Calyx* uterque campanulatus, patens, 5-partitus, laciniis lanceolato-ovatis, coloratis. *Filamentum* 1, crassum, calyce brevius. *antheris* 3, bilocularibus, sub-rotundis. *Nectarium* glandulis 5, circumdantibus stamen. *Femine nectarium* nullum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida, reflexa. *Capsula* sub-rotunda, 3-locularis, 3-valvis, 2-sperma. Habitat inculca in hortis, & agris Cochinchinæ.

Phyllanthus Niruri. Lin. sy. pl. v. 4. pag. 121. sp. 2. Herba mceroris alba. Rumph. Amb. l. 10. c. 30. tab. 17. fig. 1. Urinaria Indica, erecta, vulgaris. Burm. Zeyl. pag. 230. tab. 93. fig. 2. *M. Niruri*.
Virtus. Urinam, & menses violenter promovet, nec satis tutò. Rumphius, loco citato, prædicat hujus herbæ virtutem contra dysenteriam, colicam, epilepsiam puerorum, convulsiones, & alios morbos: pro quo fide-jussor non stabo.

Observ. Cum præcedentes 5 species Nymphanthi semper Monandras observaverim, huic ordini potius ascribendas censui, quam Phyllantho adjungere, quæ in Monoeciâ Triandriâ misceat, neque enim placere possunt Genera, quæ passim in charactere essentiali deficiunt, quamvis alioquin habitu, & aliis notis conveniant. In nostris fructus constanter invenitur trilocularis, bispermus. Flos semper apetalus: calyce quidem variante, numero nunc polyfido, nunc polyphylo, quod indicare volui termino *calyx multiplex*, cum alius clarior non occurreret. Maiorem varietatem invenimus apud Auctores in descriptione Phyllanthi: Emblicam, & Urinariam in eodem genere, & ordine servamus, quia Triandras invenimus.

GENUS III. POLYPHEMA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Spatha 1-phylla, acuta, lunata, includens Amentum ovatum, solidum, muricatum, flosculis testum: alitis spathis, & amentis successivè gravida.

Perianthium proprium nullum.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, subulatum, breve, insidens receptaculo proprio, brevè, carnosò, turbinato, 4-6-angulato. Anthera sub-rotunda, bilocularis.

* *Femineæ flores in diversis Amentis ejusdem plantæ.*

Cal. ut Masc.

Cor. nulla.

Pist. Germen oblongum, angulatum, inferum, Amento occultum.

Stylus subulatus, brevis, patens extra Amentum. Stigma simplex.

Peric. Bacca ovata, maxima, composita ex baccis partialibus, turbinatis, angulatis, 1-spermis, receptaculo communi, tereti affixis: intermixtis ligulis pluribus coriaceis, sub-æqualibus, ex germibus abortientibus residuis.

Sem. 1, oblongo-ovatum, muticum, cortice tenui obductum.

Nom. Polyphemam dixi a giganteâ Baccæ magnitudine: cujus stamen unicum in mâre, & pistillum in foeminâ quasi monoculam faciunt.

Char. Gener. Masc. *Spatha* lunata, continens Amentum ovatum, solidum, flosculis testum. *Perianthium* o. *Cor.* o.

Fœm. *Spatha*, & Ament. ut Masc. *Perianth.* o. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Bacca* partialis 1-sperma, inclusa.

† Sp. 1. POLYPHEMA JACA. α Cay Mit β Yá xú: Po lô mat.

Differ. spec. Pol. *foliis* ovalibus, integerrimis, alternis, lævibus.

Hab. *Arbor* magna: *cortice* scabro, crasso, fusco: *ramis* tortuosis, longis, sub-ascendentibus. *Folia* sub-ovalia, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata, semipedem longa, plana, nitida, costis transversis, parallelis. *Amentum*, flosculis maturefcentibus, 4 pollices longum, obtusum, scabrum, obscuro-viride: *Masculum* deciduum: *Femineum* in baccam compositam excrefcit, sub-ovatum, inæqualem, muricatam, sæpe binos pedes longam, unum, & amplius latam: *cortice* crasso, carnosò, fusco-viridi. *Bacca* partiales intus clausæ 100, vel plures, flavæ, carnosæ, dulcès, odo-

odoræ, edules. Fructus pedunculis brevibus, crassis pendentes ab imo trunco, usque ad maiores ramos. Omnes arboris partes manant humore albicante, tenacissimo.

Habitat frequentissime culta in totâ Cochinchinâ: raro in Chinâ.

Jaca. A-Costa. Aromat. cap. 40. Apud Clus. Exot. pag. 281. Saccus arboreus maior: Nanka. Rumph. Amb. l. 1. c. 25. tab. 30. Ubi optima icon, si Amentum cum spathis excipias.

Ufus. Lignum hujus arboris est optimum, durabile, & flavo colore pulchrum. Baccæ eduntur tam crudæ, quam elixæ: semina tosta.

Observ. Apud Linnæum Junioem (suppl. pl. pag. 61, & pag. 411.) invenitur genus novum Artocarpus, cujus speciem secundam facit hanc nostram Polyphemam vocans Artocarpum Integrifoliam, cum primam speciem dixisset Artocarpum Incisum, de quo judicare non possum, quia non vidi. At, supposito, quod Linnæana descriptio, & essentialis character Artocarpi comprobetur in ejus primâ specie, secundæ (quæ est nostra Polyphema) aptari nequit; siquidem in hac non observatur Amentum Cylindricum, nec Calyx bivalvis, au Drupa, fructusve multilocularis, seminibus pilo terminatis, stigmata duo, ac pedunculi pilis longis hirsuti. Omnia hæc, & singula desiderantur in Polyphemæ primâ specie jam descriptâ, sicut etiam in subsequenti nunc describendâ: quæ ambæ frequenter occurrunt in Indiâ.

† Sp. 2. POLYPHEMA CHAMPEDEN. a Cay Mit nar. JAC. 1. 2. †
Differ. spec. Pol. foliis oblongis, integerrimis, pilosis, rugosis, sparsis.

Hab., & notæ. Arbor supra mediocrem: trunco, & ramis rectis, ascendentibus. Folia oblonga, sub-acuta, integerrima, venosa, rugosa, pilosa, superius obscuro-viridia, subius flavescencia, sparsa, petiolis longis. Spatha sæpe repando-incisa. Amenta oblongo-ovata, scabra, flosculis propriis tecta, ut in Polyph. Jacâ. Baccæ compositæ vix pedem longæ, 4 pollices latæ, muricatæ, flavo-virides: baccis partialibus plurimis, ovatis, sub-angulatis, flavis, humefcentibus, parvis, edulibus, nimia dulcedine, & intenso odore parum gratis. Tota arbor humore lactescente scater. Fructus pendunt ex summo trunco, & ramis pedunculis longis.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ. Colitur etiam, & Champeden vocatur a populis Malais circa fretum Malaccense habitantibus.

Champidaca. Bont. Jav. l. 6. cap. 31. pag. 119. Saccus arboreus minor: Tsjampadaha. Rumph. Amb. l. 1. cap. 26. tab. 31.

Ufus. Lignum non minus utile, & durabile, quam præcedens: sed fibris crassioribus minus elegans, & colore minus pulchrum.

† GENUS IV. MORELLA.

Descriptio Naturalis.

*Masculi flores.

Cal. Amentum filiforme, strictum, imbricatum, squamis carnosis, trigonis, parvis.

Perianthium o.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum nullum. Anthera 1, sub-ovata, ad basim squamæ amenti.

*Feminei flores in eodem amento ad apicem.

Cal. Squama amenti, ut in Masculo. Perianthium nullum.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus o. Stigmata 2, subulata, patentia.

Peric. Drupa sub-rotunda, pulpâ vesiculari exterius distincta.

Sem. Nux sub-ovata, lacunosa, 2-locularis: nucleis compresso-ovatis.

Nom. Morella, quasi parvum Morum, cui fructus facie similis.

Char. Gener. Masc. Cal. Amenti. Cor. o. Anthera sessilis.

Fœm. Cal. Amenti. Cor. o. Stigmata 2, sessilia. Drupa nuce lacunosa, 2-loculari.

† Sp. 1. MORELLA RUBRA. β Yâm muel: Deang mai. γ Deau rou.
Differ. spec. Mor. foliis oblongis, sub-integerrimis, glabris, sparsis: amentis lateralibus.

Hab. Arbor 8-pedalis: caule tortuoso, fusco: ramis patentibus. Folia oblonga, sub-acuta, pleraque integerrima, aliqua interruptè serrata, glabra, sparsa, petiolata: Florum amenta lateralialia, brevialia, squamis 1-floris, apetalis. Drupa rubra, acida, diametro 3 lineas æquans, exterius vesiculis succosis: facie Moro similis, nuce cavernosa Persico, sapore, & colore Ceraso acido.

Habitat culta in China. Agrestis, fruticosa, & multo minor in Cochinchina.

Observ. Suspitor hanc esse Prunum Japonicam fructu purpureo, Moro simili. Kœmpf. Hist. Jap. l. 1. pag. 101. Neq. multum abhoret a Cudranò. Rumph. Amb. l. 7. cap. 14. tab. 16.

Ulus. Fructus tam palato, quam stomacho gravis est. Crudos edunt Sineses: Europæi saccharo condiunt, & faciunt placentas, Macai, & Cantone mensis apponendas. Cochinchinenses, vel semimatos coquunt cum piscibus, vel maturos ad tempus deponunt in vasis terreis, sinuntque fermentari, ut vinum eliciant sapore, odore, & colore non contemnendum.

GENUS V. CASUARINA.

Char. Gen. Masc. Cal. Amenti. Cor. Squamulæ bipartitæ.

Fœm. Cal. Amenti. Cor. 0. Stylus 2-fidus. Strobilus.

Lin. Jun. Suppl. pl. pag. 62. G. 1428.

† Sp. 1. CASUARINA AFRICANA. V.

Differ. spec. Cal. frondibus filiformibus, ad apicem tumescantibus, ibi floriferis: Strobilis sub-rotundis, axillaribus.

Hab., & notæ. Arbor supra mediocrem, ramis longis, diffusis, paucis: ramulis frondiferis, reclinatis. Frondes 1-pedales: sub-teretes, strictissimæ, vix folio Pini crassitie æquales, sub-articulatæ: foliolis tubulosis, longiusculis, integrè vaginantibus, 7-sulcatis, apice 7-fidis, laciniis acutis appressis. Flos Masculus apetalus, terminans frondem, ibi in Amentum incrassatam: Squamis foliolo similibus, crassioribus, brevioribus, vaginantibus, 7-partitis: laciniâ singulâ portante singulum filamentum filiforme, squamâ longius: Autherâ ovatâ, 2-loculari, itante. Flos fœmineus Amento brevi ad axillam frondis: Squamis crassioribus, 7-partitis, acutis, vaginantibus, Masculi similibus. Corolla nulla. Stylus 1-bifidus. Pericarpium Strobilis sub-rotundus, semipollicaris, lignosus, in 12 valvas perpendicularter dehiscens: fissurâ singulâ loculos 3-4, monospermos aperiente: valvulis partialibus acutis. Semen 1 sub-ovatum, alâ membranaceâ terminatum. Frondes ad apicem ramulorum calciculatæ, reflexæ.

Habitat litora arenosa continentis Africæ Orientalis.

Casuarina Equisetifolia (Lin. Jun. Suppl. pag. 412. ex Forst. gen. n.

52.) & Casuarina Litorea (Rumph. Amb. l. 4. cap. 58. tab. 67.) eundem habitum portant, & ab Africanâ specie non differunt, dummodo similes strobilos habeant, & frondium apices antumescentes in Amenta Macula Convertantur, prout in Africanâ observatur. Squamulæ Cor. 2-partitæ non vidi.

Usus. Lignum durissimum, & gravissimum hujus arboris non facile corruptioni sit obnoxium.

DIANDRIA

GENUS VI. LEMNA.

Char. Gen. Masc. Cal. 1-phyllus. Con. nulla.

Fœm. Cal. 1-phyllus. Cor. 0. Stylus 1. Caps. 1-locularis.

Lin. sy. pl. G. 1130.

Aaaa

Sp. 1.

Sp. I. LEMNA MINOR. 2 No tam.

Differ. Spec. Lem. *foliis* sessilibus, utrinque planiusculis: *radicibus* solitariis. Lin. sp. 2.

Hab., & nota. Planta minima, annua: radicula simplicissima. Folium unicum, ovatum, sub-acutum, integerrimum, planum, glabrum, pallidum, sessile. Florem non observavi.

Habitat ubique in aquis stagnantibus in Cochinchina.

Thunb. Jap. pag. 24. Lenticula Palustris. Bauh. Pin. pag. 362. h. 1.

TRIANDRIA.

GENUS VII. ZEA.

Char. Gen. Masc. in distinctis spicis. *Cal.* Gluma 2-flora, mutica. *Cor.* Gluma mutica.

Fcem. *Cal.* Gluma 2-valvis. *Cor.* Gluma 2-valvis. *Styl.* 1, filiformis, pendulus. *Sem.* solitaria, receptaculo oblongo immersa. Lin. sy. pl. G. 1133.

Sp. I. ZEA MAYS. 2 Cay Bap. 2 Páo tuc: Lem.

Differ. Spec. Zea *Cabno* simplicissimo, solido: *floribus* Masculis terminalibus, paniculatis: *Femineis* axillaribus, sessilibus.

Hab., & nota. *Culmus* annuus, 6-pedalis, erectus, crassus, solidus, simplicissimus. *Folia* subulata, aspera, magna, reflexa, amplexicaulia. *Flos Masculus* terminalis, spicis compositis, laxis: *Femineus* axillaris, spicis densis, subulatis: *fosculis* sessilibus, *stilo* pendulo omnium longissimo: *seminibus* sub-rotundis, flavis, rubris, vel albis: *receptaculo* crassissimo, 6 pollices longo, foveis excavato undique affixis.

Habitat late culta in Cochinchina, & China.

Usus Esculentus, Nutriens, Innocuus: pro frumento habetur.

Thunb. Jap. pag. 37. Mays. Tournef. Inst. pag. 531. tab. 303, 304, 305.

GENUS VIII. COIX.

Char. Gener. Masc. in spicis remotis. *Cal.* Gluma 2-flora, mutica. *Cor.* Gluma mutica.

Fcem. *Cal.* Gluma 2-flora. *Cor.* Gluma mutica. *Styl.* 2-partitus. *Sem.* calyce ossificato tectum. Lin. sy. pl. G. 1135.

Sp. 1. COIX LACHRYMA. α Cay Bo ho: Y di nhen. 4 Y Y gr.
Differ. spec. Co. *culmo* ramoso: *foliis* rugosis: *feminibus* ovatis. Lini
sp. 1.

Hab., & notæ. *Culmus* 6-pedalis, perennis, sub-teres, solidus, articu-
latus, erectus, ramosus. *Folia* lanceolata, integerrima, longa,
subtus rugosa, reflexa, amplexicaulia. *Flos* axillaris, pedunculo
communi longo, tenui, sub-erecto: *Masculus* ad apicem, multus,
spiculâ sub-ovata: *Calyce*, & *Corollâ* bivalvibus, muticis: *Filamen-
tis* 3, capillaribus, *antheris* oblongis. *Femineus* ad basim, soli-
tarius: *calyce* bivalvi, sub-ovato, concavo, duriusculo *Corollam*
non vidi. *Styli* 2, capillares, prorsus distincti: *stigmatibus* longis,
villosis. *Calycis* glumæ in maturescentiâ conniventes *Germini* coe-
lescunt, sitque semen ovatum, hinc convexum, inde planiusculum,
sub-acuminatum, fusco-rufum, nitidum, intrinsicus album, farina-
ceum, cortice oleo vestitum.

Habitat frequenter culta in Cechinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 37. Lachryma Job Indica: Salee. Rumph. Amb. 1. 8.
c. 28. tab. 75. fig. 2. Catriconda. Rheed. Malab. part. 12. pag. 133.
tab. 70.

Virtus: feminum. Corroborans, Nervina, sub-Diuretica. Prodest in ul-
ceribus pulmonum, Hydrope, artuum, ac præcordiorum debilita-
te. Usus vulgaris esculentus.

Observ. Planta Rumphio dicta *Ova piscium* non est hujus Generis,
ubi a Linnæo perperam citatur.

† Sp. 2. COIX AGRESTIS. α Bo ho hoong.

Differ. spec. Co. *culmo* simplicissimo: *foliis* lævibus: *feminibus* sub-
rotundis.

Hab., & notæ. *Culmus* 3-pedalis, cespitosus, simplicissimus, teres,
solidus, articulatus, glaber: *radice* perenni, repente. *Folia* lanceo-
lato-linearia, acuminata, integerrima, lævia, sub-erecta, alterna,
amplexicaulia. *Flos* pedunculis polyfloris, longis, erectis, axillari-
bus, Masculis, & *Femineus* ex eadem axillâ. *Glumæ* ut in supe-
riore specie. *Semen* sub-rotundum, fuscum, nitidum, minusculum.

Habitat agrestis in locis humidis: nec esculenta.

Lithospermum Amboinicum: Salee Uran. Rumph. Amb. 1. 10. cap. 16.
tab. 9. fig. 1. Lachryma Job paludosa, minor. Burm. Zeyl. pag. 138.

GENUS IX. OLYRA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* Gluma 1-flora, aristata. *Cor.* Gluma mutica.

Fœm. *Cal.* Gluma 1-flora, patula, ovata. *Stylus* 2-fidus.

Sem. cartilagineum. Lin. sy. pl. G. 1136.

Aaaa ii

† Sp. 1.

- † Sp. 1. **OLYRA ORIENTALIS.** α Cây Lách khén.
 Differ. spec. Ol. *culmo* triquetro: *spicis* compositis: *feminibus* trigonis, scabris.
 Hab., & notæ. *Culmus* 4-pedalis, trigonus, erectus. *Folia* subulata, longa, femiamplexicaulia. *Flos* spicis-compositis: *spiculis* partialibus distichis, oblongis, erectis. *Flores* Masculi plures ad basim cuminumque. *Fœminæ*. *Calyx* Masculi gluma 1-flora, aristata: *staminibus* tribus. *Semen* trigono-rotundum, asperum, album, magnum: medulla cartilaginea, non compacta.
 Habitat ægrestis in Cochinchina.

GENUS X. TYPHA.

- Char. Gen. Masc. *Amentum* Cylindricum. *Cal.* obsolete 3-phyllum.
Cor. 0.
 Fœm. *Amentum* Cylindricum infra masculos. *Cal.* capillo villoso. *Cor.* 0. *Sem.* 1, insidens pappo capillari.
 Lin. sy. pl. G. 1131.

- Sp. 1. **TYPHA LATIFOLIA.** α Bò hoàng. β Pù hoàm.
 Differ. spec. Typh. *foliis* sub-ensiformibus: *spica* mascula, fœmineaque approximatis. Lin. sp. 1.
 Hab., & notæ. *Planta* palustris, radice repente: *culmo* tereti, recto, 3-pedali. *Folia* sub-ensiformia, glabra, erecta. *Flos* terminalis: *amento* cylindrico, crasso, solido, lutescente, villoso: *fœmineus* inferior: *masculus* eidem contiguus ad apicem.
 Habitat in paludibus Chinae, & Cochinchinae.
 Typha palustris maior. Bauh. Pin. pag. 20. n. 1. Typha vulgaris. Hill. Brit. herb. pag. 506. tab. 71. fig. 28.
 Virtus. Sub-adstringens. Usus in dysenteria, & Gonorrhœa, orisque ulceribus: sanguinis crassitiem resolvit, urinam promovet.

† GENUS XI. RHAPHIS.

Descriptio Naturalis.

- * *Masculi flores* 2, pedunculati, involucreo communi tecti.
Cal. Gluma monoflora, bivalvis: valvis subulatis, coloratis, muticis; sub-æqualibus.
Cor. Gluma bivalvis: valvis lanceolatis, membranaceis, ciliatis, muticis, calyce brevioribus.
Stam. Filamenta tria, brevia. Antheræ oblongæ.

* Fœ-

* *Famineus flos* 1, sessilis, infra masculos, in eodem involucrio, piloso, brevi, monophyllo.

Cal. ut masculi, illo brevior.

Cor. Gluma bivalvis, calyci sub-æqualis: una aristata, aristâ acutissimâ, longiusculâ.

Pist. Germen ovatum. Styli duo, breves. Stigmata plumosa.

Peric. nullum, præter glumas permanentes.

Sem. 1. oblongum, compressum.

Nom. (*Paris acus*) ab aristâ corollæ vestes viatorum penetrante.

Char. Gen. Masc. *Involucrum* 1-phyllum, 3-florum. *Cal.* Gluma 2-valvis, colorata. *Cor.* Gluma 2-valvis, ciliata.

Fœm. *Invol.* idem. *Cal.* ut Masc. *Corollæ* 2-valvis Gluma 1, aristata. *Styli* 2. *Sem.* 1, oblongum.

† Sp. 1. RHAPHIS TRIVIALIS. α Co may. β . . .

Differ. spec. Rhaph. *culmo* tereti, sub-nudo: *spicâ* laxâ, terminali.

Hab. *Herba* annua, radice repenti, *Culmus* 1-pedalis, sub-nudus, teres, tenuis, erectus, glaber, sub-simplicissimus. *Folia* sub-radicalia, lanceolata, breviter, sessilia, amplexicaulia. *Flos* spicâ terminali, solitariâ, conicâ, laxâ, pedunculis longis, rectis, assurgentibus.

Habitat ubique prope vias, hominibus valde incommoda in Cochinchinâ, & Chinâ; quia vestibis adhærens tædiosè avellitur, cum excuti nequeat.

Gramen aciculatum: Cuslu. Rumph. Amb. I. 10. c. 8. tab. 5. fig. 1.

Observ. Nescio a quo inductus Cel. Linnæus hanc plantam Rumphianam conjunxit cum Panico Colonum (Sy. pl. 1. pag. 155. sp. 8.).

Hæc certè (etiam prout a Rumphio describitur, & pingitur) nihil commune habet cum Panico præter stamina.

GENUS XII. PHYLLANTHUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 6-partitus, campanulatus. *Cor.* 0.

Fœm. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 3, bifidi. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* solitaria. Lin. sy. pl. G. 1142.

Sp. 1. PHYLLANTHUS EMBLICA. α Cay Boung ngot. β Hac min sân.

Differ. spec. Phyl. *foliis* pinnatis, floriferis: *caule* arboreo: *fructu* baccato. Lin. sp. 6.

Hab. & notæ. *Arbusecula* 8-pedalis: ramis diffusis. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, glabra, alternatim pinnata, multi-juga. *Bacca* parva sub-pyriformis, carnosa, sub-acida, edulis, 3-locularis, 2-
spic-

sperma. *Calyx* utriusque floris sub-rotatus, 6-fidus: laciniis obtusis, crassis. *Corolla* nulla. *Filamenta* nulla. *Antherae* 3, receptaculi trigoni angulis insidentes. *Flores* Masculi, & Foeminei in eodem folio, sparsi. *Germen* 3-gonum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida. *Bacca* in Sinis exsucca.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ.

Mirobalanus Emblica. Boa Malacca Nilikai. Rumph. Amb. Auct. c. 2. tab. 1. Nelli-Camarum. Rheed. Malab. part. 1. pag. 69. tab. 38. Myrobalanus in Javâ. Bont. Jav. l. 6. c. 24. fig. pag. 110.

Sp. 2. PHYLLANTUS URINARIA. α Cỏ sua. β Fi yong tráo.

Differ spec. Phyl. *foliis* pinnatis, floriferis: *floribus* sessilibus: *caule* herbaceo, procumbente. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, multiplex, diffusus, sub-procumbens, hispidus. *Folia* pinnata, multi-juga: *foliis* ovato-lanceolatis, pilosis, fusco-viridibus, oppositis. *Flos* congestus, axillaris, multus, subsessilis, Masculus Foemineis mixtus. *Stamina* 3. *Styli* 3, bifidi. *Capsula* trigona, trivalvis, tricoeca. Tota herba lactifera: caule, foliis, & calyce rubescentibus.

Habitat, & a me observata in Cochinchinâ, Cantone Sinarum, & in Africâ Orientali.

Burm. Ind. pag. 196. Urinaria Indica supina, cauliculis rubentibus. Burm. Zeyl. pag. 231. Herba mœroris rubra (Rumph. Amb. l. 10. cap. 30 tab. 17. fig. 2.) non satis convenit.

Virtus: totius herbæ. Emmenagoga, Diuretica.

TETRANDRIA.

GENUS XIII. BUXUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 2. *Germinis* rudimentum. Foem. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Caps.* 3-rostris, 3-locularis. *Sem.* 2. Lin. sy. pl. G. 1148.

Sp. 1. BUXUS SEMPERVIRENS. α Huynh duong. β Hoâm tuôn.

Differ. spec. Bux. *foliis* ovatis alternis: *floribus* axillaribus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbuseula* 3-pedalis; *ramis* ascendentibus. *Folia* ovalia, obtusa, integerrima, glabra, plana, nitida, parva, sparsa, sub-petiolata. *Flos* albus, lateralis, sparsus. Masculi *Calyx* 3-phyllus, *corolla* 2-petala, *stamina* 4. Foeminei *calyx* 4-phyllus. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-sperma.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ, & Chinæ.

Thuub. Jap. pag. 77.

GENUS XIV. MORUS.

Char. Gener. Masc. Cal. 4-partitus. Cor. o.

Æcem. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Styli 2. Cal. baccatus.

Sem. 1. Lin. sy. pl. G. 1150.

Sp. 1. MORUS ALBA. β Xia pē xū. α Deau tau.

Differ. spec. Mor. foliis obliquè cordatis, lævibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: cortice albicante, cannabino: ramis patentibus. Folia lato-lanceolata, obliquè cordata, sub-ferrata, indivisa, lævia, petiolata, sparsa. Flos Monoicus. Bacca lateralis, fuscoca, pallida, oblonga, composita bacculis r-spermis.

Habitat culta, incultaque in Chinâ, raro in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 198. Thunb. Jap. pag. 71. Morus fructu albo. Baulh.

Pin. pag. 459. n. 2.

Usus: foliorum ad nutriendos bombyces.

Virtus: corticis radicis. Aperiens, Mundificans, Diuretica, Anthelminthica. Prodest in Hydrope, Tussi, Oris ulceribus, morsu serpentum, vermibus, & tæniâ. Foliorum succus juvat contra febres tertianas, & quartanas.

Sp. 2. MORUS RUBRA. α Deau Moi.

Differ. spec. Mor. foliis cordatis, subtus villosis: omentis cylindricis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: cortice cinereo, lævi: ramis longis, debilibus, patentibus. Folia cordata, acuta, serrata, magna, pallida, subrus villosa, mollia, petiolata, alterna. Bacca cylindracea, pollicem longa, axillaris, 1-2-nata, pedunculata, rubra acridulcis, edulis.

Habitat agrestis apud Molos populos, Cochinchinæ tributarios, ad occasum sitos: colitur etiam ad nutriendos bombyces, minus frequenter.

Miller. Diction. n. 4. Morus Virginienſis arbor, loti arboris instar ramosa, foliis amplissimis. Pluken. Alm. 253. tab. 246. fig. 4.

Sp. 3. MORUS INDICA. α Deau de de tam.

Differ. spec. Mor. foliis ovato-oblongis, utrinque æqualibus: inæqualiter ferratis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. Frutex 6-pedalis, sub-erectus, tenuis: cortice fusco, cannabino, ramis paucis, longis, debilibus. Folia ovato-oblonga, acuta, inæqualiter ferrata, pleraque indivisa, aliqua lobata, glabra, petiolata, alterna. Bacca compositæ, sub-rotundæ, fusco-rubræ, hif-
pi-

pidæ, parvæ, dulces, edules, axillares, solitariae. Bacculae r-spermae.

Habitat latissimè culta in Cochinchinæ agris, præcipuè ad ripas fluminum.

Burm. Ind. pag. 198. Thunb. Jap. pag. 76. Rumph. Amb. Auct. cap. 13. tab. 5.

Ufus. Foliis hujus Mori præ aliis nutriunt Cochinchinenses bombyces, e quibus extrahunt quotannis immensam serici quantitatem. Quolibet triennio has plantas eradicant, sectaque virgulta iterum plantant, ut novi fructices delicatorem escam præbeant bombycibus, & tenuiora fila producantur.

GENUS XV. CICCÀ.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o.

Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Styli 4. Caps. 4-cocca.

Lin. sy. pl. G. 1146.

† Sp. I. CICCÀ RACEMOSA. a. Cay Tam byot.

Differ. spec. Cic. Caule arboreo: floribus racemosis: corollis 4-partitis.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: ramis ascendentibus. Folia ovata, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata, disticha. Flos. racemis compolitis, brevibus, sub-terminalibus: Masculus, & Fœmininus in distinctis ramis. Calyx utriusque nullus. Corolla campanulata, 4-partita, laciniis ovatis, patentibus, colore rubra, albo punctata. Filamenta 4, corollâ breviora: antheris 2-locularibus, stantibus. Styli 4, stigmatibus simplicibus. Bacca sub-rotunda, semipollicaris, pallida, glabra, acida, edulis, 4-sperma: seminibus ovatis.

Habitat frequens in regno Champavâ: colitur rarè in metropoli Cochinchinæ.

Observ. Linnæus de Ciccâ agit sy. pl. 4. pag. 125. & Mant. pag. 124. Item Lin. Jun. Suppl. pl. pag. 416. Apud utrumque Ciccæ calyx est 4-phyllus, corolla nulla. Quam nos diximus corollam, nullatenus posset calyx dici, quia tam color, quam tenuitas membranacea, quam observavimus, calycis propria non sunt.

† GENUS XVII. TRICARIUM.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-phyllum, foliolis ovatis, sub-patentibus, coloratis, apice conniventibus.

Cor. nulla. Nectarium glandulis 4, ovatis, procumbentibus.

Stam. Filamenta 4, calyce breviora. Antheræ sub-rotundæ.

* *Feminei flores.* Masculis permixti in eadem planta.

Cal. Perianthium 4-partitum, inferum, laciniis ovatis, minimis.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus nullus. Stigma laciniatum.

Peric. Drupa sub-rotunda, carnosa, 3-locularis, 1-sperma.

Sem. Noces 3, sub-rotundæ, 3-furcata.

Nom. (Касуу) a triplici nuce pericarpii.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Nectar. glandulis 4.

Fœm. Cal. 4-partitus. Cor. o. Stigma. laciniatum. Drupa 3-cocca.

† Sp. 1. TRICARIUM COCHINCHINENSE. Cay Tram, ang.

Differ. spec. Tric. foliis ovatis, spicis congestis, sub-terminalibus.

Hab. Arbor mediocris, ramis ascendentibus. Folia ovata, integerrima, glabra, alterna, parva. Flos ruber, sub-terminalis, racemis simplicibus, longis, tenuibus, congestis. Drupa mediocris, lutea, glabra, esculenta.

Habitat in sylvis Cochinchinae.

GENUS XVII. URTICA.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Nectar. centrale, cyathiforme.

Fœm. Cal. 2-valvis. Cor. o. Sem. 1, nitidum. Lin. sy. pl. 149.

Sp. 1. URTICA INTERRUPTA. Cay Nanghai, & Pâm-mai.

Differ. spec. Urt. foliis alternis, ovato-cordatis, serratis, petiolo sub-brevioribus; spicis solitariis; interruptis. Lin. sp. 17.

Hab. & notæ. Caulis herbaceus, annuus, 2-pedalis, sub-teres, hispida, ruber, aliquando repens. Folia cordata, ovata, serrata, utrinque

que hispida, alterna, petiolis longis folio sub-aequalibus. *Flos* rubescens, spicis longis, solitariis, interruptis: *Masculus*, & *Foemineus* in distinctis spicis. *Calyx* in *Masculis* saepius invenitur 5-phyllus, quam 4-phyllus: *stamina* quoque saepius numerantur 5. *Cor.*
o. *Semen*. 1.

Habitat agrestis in Cochinchina, & China.

Urtica Pilulifera, foliis maioribus longissimis pediculis. Burm. Zeyl. pag. 231. tab. 110. fig. 1. Batti-Schorigeram. Rheed. Malab. part. 1. pag. 75. tab. 40.

† Sp. 2. URTICA GEMINA. α Nang hai lonh. h.
Differ. spec. Urt. foliis alternis, glabris, involucris 2-floris, solitariis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, simplex, teres, striatus, 1-pedalis. *Folia* ovato-lanceolata, crenata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* axillaris, geminus, *Masculus*, & *Foemineus* sub eodem involucre foliaceo-cordato, solitario. *Masculi perianthium* 4-phylum: *Foeminei* nullum. *Corolla* nulla. *Stamina* 4. *Stigmata* 3, villosa, sessilia. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma: *seminibus* ovatis.

Habitat agrestis in Cochinchina.

† Sp. 3. URTICA PILOSA. α Nang hai loung.
Differ. spec. Urt. foliis alternis, pilosis, lato-lanceolatis: *spicis* axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus. *Folia* lato-lanceolata, serrata, pilosa, alterna. *Flos* spicis axillaribus simplicibus: *Foemineus* ad basim, calyce 1-phyllo, turbinato, 12-fido. *Stigma* laciniatum. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma.

Habitat agrestis in Cochinchina.

Observ. Hæc, & præcedens species, cum habeant capsulas 3-loculares, improprie adscribi Urticis cognosco. Si ad *Tragias* reducere placeat, non repugnabo, maxime, quia de numero *Staminum* ultimæ speciei dubius maneo.

Sp. 4. URTICA NIVEA. α Cay gai. α Pá má.
Differ. spec. Urt. foliis alternis, sub-orbiculatis, utrinque acutis, subtus tomentosis. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, biennis, erectus, teres, 5-pedalis. *Folia* sub-orbiculata, apice (non basi) attenuata, acumine tenui, longo, crenata, superius obscure-viridia, hispida, subtus tomentosa, albicantia, alterna, petiolis longis. *Flos* racemis parvis, multis, lateralibus: uterque in eodem racemo, *Foemineus* ad apicem,

cem. Masculi *Calyx* 4-phyllus. *Cor.* nulla. *Filamenta* 4, subulata, flexuosa, calyce triplo longiora. *Fœminei calyx*, & *corolla* nulli. *Germen* sub-rotundum, filamentis multis sterilibus circumdatum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 2, oblonga, villosa. *Semen*, aut pericarpium maturum non vidi.

Habitat, & abundanter Colitur in Cochinchinâ, & Chinâ. Burm. Ind. pag. 197. Thunb. Jap. pag. 71. *Urtica Racemifera maxima Sinarum*, foliis subtus argenteâ lanugine villosis. Pluk. Amalt. pag. 212.

Ufus. Herba ista dat optima fila cannabina, ex quibus torquentur funes omnis generis, retiaque longo tempore duratura.

PENTANDRIA.

† GENUS XVIII. POLYCHROA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores*, inferiores, pedunculo communi longo.

Cal. Perianthium campanulatum, 5-fidum: laciniis sub-ovatis, incurvis, carinatis, coloratis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 5, ventricosa, diaphana, divergentia, calyce longiora. Antheræ toridem, sub-sagittatæ, rubescentes.

* *Fœminei flores* superiores, sub-sessiles in eadem plantâ

Cal. Perianthium 5-partitum, inferum, erectum, persistens: laciniis subulatis.

Cor. nulla.

Pist. *Germen* longiusculum. *Stylus* nullus, stigma obtusum.

Peric. Capsula ovata, 1-sperma.

Sem. Ovatum, glabrum.

Nom. (Πολύ multum: Χρῶμα color) ex multiplici foliorum colore.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-fidus. Cor. 0.

Fœm. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Stigma 1, sessile. Caps. 1-sperma.

† Sp. 1. POLYCHROA REPENS. z. Boò τὰδ. β . . .

Differ. spec. Pol. *caule* repente: *foliis* cordatis, crenatis: *floribus* axillaribus.

Hab. Herba perennis: *caule* repente, tereti, rubro, succoso, ramoso, radiculis brevibus lateralibus. *Folia* cordata, oblonga, sub-crenata,

nata, alterna, versicolora, albo, rubro, & viridi discretata, apice obtuso, basi inæquali: *stipulis* geminis, acutis. *Flos* albo-ruber, racemis parvis, axillaribus.

Habitat inculcra, coliturque ob pulchritudinem, latè repens per scopulos fontanos in Chinâ, & Cochinchinâ.

GENUS XIX. AMARANTHUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 3, five 5-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 3, five 5.

Fcem. *Cal.* maris; *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.* 1-ocularis, circumscissa. *Sem.* 1. *Lin.* 1y. pl. G, 1157.

Sp. 1. AMARANTHUS TRICOLOR. β Hùm hiên. α Hông hiên.

Differ. spec. Amar. *glomerulis* triandris, axillaribus, sub-rotundis, amplexicaulis: *foliis* lanceolato-ovatis, coloratis. *Lin.* sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, erectus, teres, ruber, glaber. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, coccinea: in aliis rubro, pallido, & viridi tricolora: *petiolis* longis, erectis. *Flos* glomerulis verticillatis, triandris, coloratis.

Habitat cultus in Chinâ, & Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 199. Thumb. Jap. 57. *Amaranthus* folio variegato. Bauh. Pin. pag. 121. n. 5.

Sp. 2. AMARANTHUS POLYGAMUS. α Rau gen táng. β Pê hiên.

Differ. spec. Amar. *glomerulis* diandris, sub-spicatis, ovatis: *floribus* hermaphroditis, femineisque: *foliis* lanceolatis. *Lin.* sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 3-pedalis, erectus, albicans, crassus, tener, glaber, striatus, ramosus. *Folia* sub-ovata, utrinque attenuata, sub-rugosa, pallida, petiolata. *Flos* polygamus, diandrus, verticillis axillaribus, & terminalibus, in spicas breves interruptè accrescentibus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ tam cultus, quam spontaneus.

Burm. Ind. pag. 199. *Blitum* Indicum, album. Rumph. Amb. 1. 8. c. 42. pag. 231. tab. 82. fig. 1.

Ufus. Ex omnibus *Amaranthi* speciebus, quæ in Indiâ edi solent, hæc est salubrior, & suavior; proindeque præ aliis usitator.

Sp. 3. AMARANTHUS TRISTIS. α Rau gen dát. β . . .

Differ. spec. Amar. *glomerulis* triandris, rotundatis, sub-spicatis: *foliis* ovato-cordatis, emarginatis, petiolo brevioribus. *Lin.* sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, multiplex, ramosus, diffusus, sub-erectus, teres, tenuis, rubescens, sesquipedalis. *Folia* sub-ovata, sub-acuta, emarginata, tomentosa, parva, alterna, longè petiolata.

Flos

Flos glomerulis triandris, rotundatis, axillaribus: ad apicem ramorum in spicas prolongatis. *Flosculi* aristati. *Folia* nec cordata, nec maculata.

Habitat ubique incultus in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, esculentus. Burm. Ind. pag. 199. Blitum Terrestre, seu repens. Rumph. Amb. l. 8. c. 42. pag. 232. tab. 82. fig. 2.

Sp. 4. AMARANTHUS OLERACEUS. α Rau gen mdoi.

Differ. spec. Amar. *glomerikus* triandris, pentandrisque: *foliis* ovatis obtusissimis, emarginatis, rugosis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 5-pedalis, crassus, sulcatus, teres, erectus, glaber, ramosus. *Folia* ovata, integerrima, rugosa, pallida, alterna, petiolata. *Flos* glomerulis lateralibus, terminalibusque in spicas elongatis. *Masculi stamina* 3, sive 5. *Fœminei stigmata* 3. *Capsula* circumscissa: *Semine* 1, nigricante.

Habitat cultus, nec frequens in Cochinchinâ. Mill. Dict. n. 15. Blitum album maius. Bauh. Pin. pag. 118. n. 1.

Sp. 5. AMARANTHUS CRUENTUS. α Rau gen tia.

Differ. spec. Amar. *racemis* pentandris, decompositis, remotis, patulo-nutantibus: *foliis* lanceolato-ovatis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 4-pedalis, erectus, ruber, parum ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, sub-dentata, glabra, petiolata, partim fusco-viridia, partim cruento-rubra. *Flos* pentandrus, glomerulis axillaribus, spicisque terminalibus, longis, nutantibus.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ: mensis parum gratus. Burm. Ind. pag. 200. Mill. Dict. n. 117. Amaranthus Sincensis, foliis variis. Mart. Cent. 6. tab. 6.

Sp. 6. AMARANTHUS SPINOSUS. α Rau gen gaf.

Differ. spec. Amar. *racemis* pentandris, cylindricis, erectis: *axillis* spinosis. Lin. sp. 13.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres, crassus, glaber, albicans, ramosus: *aculeis* axillaribus, longis, rectis. *Folia* lanceolata, repanda, glabra, obscuro-*viridia*, costis multis obliquis, albicantibus: *petiolis* longis, sparsis. *Flos* pentandrus, spicis longis, tenuibus, continuis, terminalibus.

Habitat spontaneus loca minus culta Cochinchinâ. Non esculentus. Amaranthus Indicus, spinosus, spica herbacea. Herm. Lugdb. 31. tab. 33. Blitum spinosum. Rumph. Amb. l. 8. cap. 43. tab. 83. fig. 1.

† GENUS XX. HEXADICA.

*Descriptio Naturalis.** *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 5-phyllum : foliolis obtusis, brevibus, patentibus.

Cor. Petala 5, ovata, concava, patentia.

Stam. Filamenta 5, corollâ breviora. Antheræ ovatæ, bilobæ, stantes.

* *Feminei flores* in diverso ramo ejusdem plantæ.

Cal. 6-phyllus : foliolis obrufis, brevissimis, persistentibus.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum, superum. Stylus nullus. Stigmata 6, concava, conniventia.

Peric. Capsula globosa, 6-valvis, 6-ocularis, monosperma.

Sem. oblonga, angulata.

Nom. (Ἑξάδικος senarius) a senis oculis pericarpium.

Char. Gener. Masc. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.

Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 0. Stigmata 6. Caps. 6-ocularis, 1-sperma.

† Sp. 1. HEXADICA COCHINCHINENSIS. n. Cay Bii den.

Differ. spec. Hex. foliis ovato-oblongis : floribus fasciculatis.

Hab. Arbor mediocris : ramis patentibus. Folia ovato-oblonga, obtusa, integerrima, glabra, alterna. Flos albus, parvus, fasciculatus, sub-terminalis. Capsula parva, nigricans.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS XXI. TREMA.

*Descriptio Naturalis.** *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 5-phyllum : foliolis lanceolatis, patentibus.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 5, calyce longiora. Antheræ sub-rotundæ.

* *Feminei flores* in eadem plantâ ad apicem.

Cal. ut Masc., persistens.

Cor. Nulla.

Pist. Germen sub-rotundum, verticaliter compressum. Stylus nullus, Sti-

Stigmata 2, brevia, villosa.

Peric. Drupa sub-rotunda, sub-compressa, 1-sperma, supera.
Sem. Nucula minuta, foraminosa.

Nom. (Τρημα foramen) a nucleâ foraminibus pertusâ.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-phyllus. Cor. 0.

Fœm. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Stigmata 2. Drupa sub-rotunda: nuce foraminosâ.

† Sp. 1. TREMA CANNABINA. α Cáy Rach chiêo.

Differ. spec. Trem. foliis lanceolatis, serratis: pedunculis polyfloris, axillaribus.

Hab. Arbor mediocris: cortice cannabino: ramis ascendentibus. Folia ovato-lanceolata, acumine longo, ferrata, tomentosa, alterna.

Flos pedunculis polyfloris, axillaribus. Drupa flava.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XXII. XANTHIUM.

Char. Gener. Masc. Cal. comm. imbricatus. Cor. 1-petalæ, 5-fidæ; infundibuliformes. Recept. palaeaceum.

Fœm. Cal. involucrem 2-phyllum, 2-florum. Cor. 0.
Drupa sicca muricata, 2-fida. Nucleus 2-locularis.
Lin. sy. pl. G. 1152.

Sp. 1. XANTHIUM STRUMARIUM. α Cáy Ké: Ngau bang. B...

Differ. spec. Xant. caule inermi: foliis cordatis, trinervatis. Lin. sp. 1.

Hab. & notæ. Planta annua, 3-pedalis: caule sub-erecto, crasso, tortuoso: ramis multis diffusis, inermibus. Folia cordata, lobata, 3-nervia, inciso-ferrata, tomentosa, magna, pallida, petiolata, sparsa. Flos albus, polynatus, terminalis, & axillaris, Masculus, & Fœmineus in eodem ramo. Fructus drupa echinata, ovato-oblonga, 2-locularis, 1-sperma.

Habitat agreste in agris, & sepibus Cochinchinæ, & Chinæ, passim obvium.

Hort. Clifort. pag. 443. Xanthium foliis semitribolatis, aculeis uncinatis Hall. Helvét. n. 1621. Xanthium, sive Lappa. Matth. in Diosc. l. 4. cap. 133. fig. pag. 834.

Observ. Cum hæc planta in Indiâ per me observata non differat ab Europæâ, fatendum est eam esse speciem Strumariam non Orientalem 2 Cel. Linnæo dictam; & præcipue, quia in eâ clarè videntur folia basi cordata.

Virt.

Virt. Seminum. Attenuans, Resolvens. Valer contra tumores, aut inflammationem capitis, colli, & oculorum, sicut etiam contra scabem, & variolas.

+ GENUS XXIII. VANIERIA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi Flores.*

Cal. Perianthium 4-partitum: laciniis ovatis, erectis, carnosis, conniventibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta sub-nulla. Antheræ 5, bilobæ, lobis reniformibus, compressis, pellucidis, calyci infra medium inhaerentes.

* *Femineæ flores* Masculis mixti in eadem Baccâ compositâ.

Cal. ut Masc.

Cor. nulla.

Pist. Germen superum, compresso-rotundum. Stylus capillaris, tenuissimus, corollæ æqualis. Stigma simplex.

Peric. nullum, præter calycem persistentem, baccatum.

Sem. 1, lenticulare, glabrum, stylo remanente caudatum.

Recept. commune ovatum, septum flosculis 10-20, compresso-angulatis, plerumque coalitis, formantibus Baccam compositam, sub-rotundam, carnosam, exterius tuberculosam, parvis hiatibus interpositis.

Nom. Ab amœnissimo Plantarum in Prædio Rustico Descriptore Jacobo Vanierio.

Observ. Huic generi affinis videtur Conocarpus. Lin. Gen. pl. ed. novæ. n. 253. Nec fortasse magis differt Kofaria. Forsk. Arab. cent. 6. pag. 164. Scopol. Introd. pag. 125. Gen. 390. Istaque differentia augetur ex eo, quod flores conglobati, & viscosi (quamvis non lactiferi) nec facilem separationem permittant, nec accurato examini se exponant.

Char. Gen. Masc. Recept. commune. Cal. 4-partitus, carnosus. Cor. o. Fem. Recept., & Cal. ut Masc. Stylus. 1. Sem. 1. nudum.

† Sp. 1. VANIERIA COCHINCHINENSIS. & Cay Vang lo.

Differ. spec. Van. caule aculeato: foliis alternis.

Hab. Frutex, erectus, 3-pedalis, caule multiplici, ramoso, tereti, lævi: aculeis multis, longis, rectis. Folia ovato-lanceolata, integerrima, glabra, alterna. Bacca composita sub-rotunda, diametro

8-linearis, ruberrima, dulcis, edulis: *pedunculo simplici, binato, axillari.*

Habitat in dumetis Cochinchinæ: ex eâque duci solent *minores sepe*

† Sp. 2. VANIERIA CHINENSIS. 8 Hông hông Xlong.
Differ. spec. Van. *caule inermi: foliis fasciculatis.*

Hab., & notæ. *Frutex 15 pollices altus, erectus, ramosus, inermis. Folia lanceolata, integerrima, glabra, fasciculata. Flos capitulo globofo, pedunculo simplici, longo, solitario, erecto, axillari. Calyx 4-partitus, carnosus, connivens. Stamina 5. Receptaculum commune, oblongum, paleaceum. Fœmineum florem cum Pistillo non invêni; ideoque plantam esse Dioicam existimavi.*

Habitat in dumetis provinciæ Cantonienfis apud Sinas.

HEXANDRIA.

† GENUS XXIV. NEPHROIA.

Descriptio Naturalis.

* *Masc. flores*: racemis oblongis.

Cal. Perianthium 5-phyllum, patens: foliolis ovatis, acutis, incurvis: duobus alternis minoribus: omnibus coloratis.

Cor. Petala 3, subulata, curva, patentia, calyce longiora.

Nectarium foliolis 6, oblongis, incisif.

Stam. Filamenta 6, capillaria, erecta, corollâ breviora. Antheræ biloculares, sub-rotundæ.

* *Fœminei flores* in diverso ramo ejusdem plantæ: pedunculis sub-trifloris.

Cal. ut Masc.

Cor. ut Masc.

Pist. Germen superum, sub-ovatum, 6-sulcatum. Stylus sub-nullus. Stigmata 6, oblonga.

Peric. Drupæ 6, minutæ, carnosæ, sub-reniformes.

Sem. Nuculæ rotidem, reniformes, scabræ, 1-loculares.

Nom. (Nephros) ob Drupas reniformes.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-phyllus. Cor. 3-petala.

Fœm. Cal. 5-phyllus. Cor. 3-petala. Stigmata 6. Drupæ 6, reniformes.

† Sp. 1. NEPHROIA SARMENTOSA. 8 Deci Xanb.

Differ. spec. Neph. *caule scandente: foliis ovatis, emarginatis: floribus axillaribus.*

Cccc

Hab.

Hab. *Caulis* fruticosus, scandens, acirrhus, teres, pilosus, longus, ramofus. *Folia* ovata, plana, glabra, emarginata. *Flos* albus, axillaris: *Masculus* racemis oblongis: *Fœmineus* pedunculis sub-trifloris, in diversis ramis ejusdem plance. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XXV. *COCOS PALMA*.

Char. Gen. *Masc. Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6.
Fœm. Cal. 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 3. *Drupa* coriacea. Lin. sy. pl. G. 1338.

Sp. 1. *COCOS NUCIFERA*. & Cây Dừa, & Yai Xu.

Differ. spec. *Coc. inermis*, *frondibus* pinnatis: *foliis* replicatis, ensiformibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* simplicissima, prolifera, 60 pedes alta, 1 circiter diametro crassa, erecta, recta, circulis parallelis ex frondibus decidentibus notata. *Fronde* pinnatæ, reflexæ, 12 pedes longæ, rachi exteriori rotundatâ, interiori, sub-excavatâ: *aculeis* nullis: *foliis* oppositis, plurimis, 3-pedalibus, subulato-ensiformibus, lævibus, simpliciter plicatis. *Flos* axillaris, *spathâ* magnâ, acutâ, striatâ, monophyllâ: *spadice* spicato, reclinato: *spicis* plurimis linearibus, rectis stoculis: *fœmineis* uno, vel altero ad basim, cæteris masculis. In utroque *calyx* semper 3-partitus: *corolla* 3-petala. *Stamina* 6. *Stigmata* 3, sessilia. *Drupa* trigono-ovata, 8 pollices longa: *cortice* exteriori crasso, fibroso, non coriaceo: interiore tenuiore, osseo: *medullâ* albissimâ, duriusculâ, inani, plerumque aquâ dulci plenâ.

Habitat culta in terris planis, non paludosis, Cochinchinæ: minus frequenter apud Sinas in Insulâ Hai-nan, & in paucis locis ad Antrum sitis. Nullibi in eâ invēni flores hermaphroditos.

Palma Indica maior: Calappa. Rumph. Amb. 1. 1. cap. 1. tab. 1. 2. Tenga. Rheed. Malab. 1. pag. 1. tab. 1, 2, 3, 4. *Palma Indica*, *Coccifera*, angulosa. Burm. Zeyl. pag. 182.

Usus. *Arbor* ista est omnium utilissima Indiarum incolis. Truncus dat tigna, & columnas ad pauperum domos extruendas. Frondibus teguntur eadem domus. Foliis pro chartâ utuntur ad scribendum: eisdem texunt cistas, stercas, & parietes. Fructus cortex fibrosus torquetur in rudentes, & funes omnis generis, quibus etiam parantur naves Europææ. Ex putamine osseo tornantur, vel aliter sunt vascula, & utensilia multa domestica, quorum aliqua pulcherrima. *Drupæ* intima pars candida dat gratum cibum, & potum aquosum, jucundam, & salubrem: præterea ex eâ fit saccharum,

lac, oleum, vinum, acetum: ac plurima condimenta, Europæis etiam in deliciis habita. In Medicinâ Oleum hujus Palmæ recenter expressum ex fructu non est inferius Oleo Olivarum.

† Sp. 2. **COCOS NYPA**, a Cay Dua nioe. Differ. spec. Coc. inermis, frondibus pinnatis: spadicebus Masculis teretibus: Fœmineis sub-rotundis: *Drupa* fulcata.

Hab., & notæ. *Palma* crassissima, 4-pedalis, sapius brevior, aut sub-acaulis. *Fronde*s inermes, 15-pedales, sub-erectæ, inordinate pinnatæ, rachi sub-tereti. *Foliola* 4-pedalia, subulato-ensiformia, acumine longo, simpliciter plicata, basi distantia, glabra, coriacea. *Flos* terminalis, pedunculo longo, erecto, crasso, ramoso, bracteat: *spadicebus* Masculi lateralibus, teretibus, reflexis, flosculis undique testis: *spadice* Fœmineo sub-rotundo, flosculis circumdato. *Spatha* nulla, præter bracteas sub-acutas, breves, distantes. *Drupa* ovato-turbinata, compresso-lobata, polysudcata, 3-4 pollices longa: cortice exteriori fibroso, crasso, levi, fusco: interiore putamine osseo, sub-rotundo, diametro 2-pollicari. *Medulla* albissima, crassa, aquam in vacuo continens. Florem examinare non potui, quamvis a longè sæpe viderim. Existimo (non assero) speciem esse Coci a Nucifera differentem, talemque judicant indigenæ. In utraque frondes, & fructus satis conveniunt: non ita spadices.

Habitat frequentissima in aquis salis ad maris litora, & ostia fluminum cœnosa Cochinchinæ, Cambodiæ, Philippinarum, freti Malaccensis, &c.

Nypa. Rumph. Amb. l. I. cap. 16. tab. 16. Sasa, & Nipa. Harp. Voyag. IV. 4. pag. 330.

Ufus. Ex hac palmâ (sicut ex Nucifera) extrahitur magna quantitas vinum, & aceti, quamvis inferioris notæ. *Drupa* adhuc teneræ, & rubentes edules sunt, non sapidæ. *Fronde*s ad defendenda recta a sole, & pluviam commodiores sunt, & longius durant, quam Nucifera.

POLYANDRIA.

GENUS XXVI. ARECA PALMA.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 3-petala. *Stam.* 6j. *Cor.* 3-petala. *Drupa* calyce imbricato: *Bocm.* *Cal.* 3-petala. *Cor.* 3-petala. *Drupa* calyce imbricato: Liv. sy. pl. G. 1341.

Sp. Ar. **ARECA CATECHU**, a Cay Cau. Binh lang. a Pin lam. Differ. spec. Ar. frondibus pinnatis: foliis replicatis, oppositis, præmorsis. Lin. sp. i. pl. Cccc ii

Hab.

Hab., & notæ. *Palma* 40, aut 50 pedes alta, semipedem in diametro crassa: caule rectissimo, tereti, glabro, cinereo, annulis parallelis distincto. *Frondes* paucae, inermes, reclinatae, 6 pedes longae, pinnatae: *foliis* 3-plicatis, apice praemorsis, 3 pedes longis, oppositis, basi approximatis: *Flor* albus, suaveolens, minusculus: *spadicibus* axillaribus, spicatis, reclinatis: *spicis* linearibus flosculis masculis, & foemineis confuse mixtis. *Spatha* simplex, sub-acuta, palba, coriacea, tenuis, striata, decidua, defensa involutro amplo; ex basi frondis dilatata spadice, & spatham involvente. *Masculi* floris calyx 3-phyllus: *Foeminei* 6-phyllus, imbricatus, inaequalis. *Corolla* utriusque 3-petala, acuta, curva, erecta. *Stamina* 9, breviter. *Pistillum* 1, superum. *Drupa* ovata, laevis, parvo ovo gallinaceo vix aequalis: cortice fibroso, crasso: putamine osseo nullo: *nucleo* cordiformi, interdum sub-rotundo, vel ovato, solido, substantiae in maturitate corneae, rubescente, venis albicantibus.

Habitat vastissime culta in omnibus praedictis Cochinchinae, tam maritimis, quam montanis: raro in China Australi: nunquam in Boreali.

Faufel. *Garc. Arom. l. 1. c. 25.* Nux Faufel, seu Pinang, Bont. *Jav. l. 6. c. 2. f. pag. 90.* Pinanga Aréca. *Rumph. Amb. l. 1. c. 5. tab. 4.* ubi optima arboris icon: descriptio vero, quanquam veridica; nimium diffusa, ac tædiosa.

Ufus. Ex fructu tenero ab extrima pellicula libero, vel si recens non habeatur, ex nucleo maturo, & sicco, simul cum folio aromatico Piperis Betele, addito pauxillo calcis ex ostreis, fit masticatorium, assuetis gratissimum, quod omnes Indiani continuo volunt in ore, ut malus anhelitus corrigatur, dentesque, ac stomachus roborentur. Eorundem nucleorum decocto solent infectores, & fullores telas quascunque inbuere, ut colores diutius servant, & melius expriment. In quem usum quotannis aliquot naves Arcarios nucleos deferunt ex Cochinchina ad Chinam, & Indiam.

Virtus. nucleorum. Incidens, Lubricans. Prodest in pituita tenaci: alvo difficili: vermibus intestinorum. Corticis fibrosi decoctum Diuresim promovet. Ex his colligi potest terram Japonicam, seu Catechu non fieri ex Aréca, ut olim putabatur. Et quamvis hæc colores in telis retineat, hoc quidem perficit vi glutinante, non adstringente. Nomen Aréca Catechu non solum est improprium, sed erroneum. Perque libentius diceretur Aréca Hortensis.

† Sp. 2. ARECA SYLVESTRIS. α Cau rāng.

Differ. spec. Ar. foliorum *spadicibus* trigonis, inermibus: *foliis* triplicatis: *spadicis* singulo flore foemineo inter duos masculos.

Hab., & notæ. *Palma* 10 pedes alta, sesquipollicem in diametro crassa,

sa, rectissima. *Fronde* pinnatæ, inermes, 3-pedales: *stipitibus* trigonis, basi dilatatis, coriaceis, caulem, & fructificationem amplectentibus: *foliis* longis, oppositis, 3-plicatis, distantibus, apice nunc acutis, nunc præmorsis. *Spatha* membranacea, alba, stricta. *Spadix* spicatus, spicis linearibus, floribus ordinatè dispositis, singulis fœminis inter duos masculos. *Masculi* Calyx 3-phyllus, foliolis subulatis inæqualibus. *Corolla* 3-petala, sub-clausa, *Calyce* longior, acuta, erecta. *Filamenta* nulla. *Anthera* 24, lineares. *Fœminæ* Calyx 3-phyllus, persistens: *foliis* latis, obtusis, lateraliter se mutuo tegentibus. *Corolla* petala 3, rotundata, foliolis calycis minora. *Germen* oblongo-ovatum, clausum. *Stylus* nullus. *Stigma* 3-gonum, 3-fidum. *Drupa* oblonga, sub-acuta, 1-sperma: *cortice* lævi, fibroso: *nucleo* ejusdem formæ, solido, corneo, semipollicem longo.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Pinanga oryzæ-formis. Rumph. Amb. l. 1. c. 7. pag. 49. tab. 5. fig. 2, B. Frons vero ibi picta nec satis convenit cum descriptione Rumphianâ, nec etiam cum nostrâ observatione.

Ufus. Masticatur cum folio Betele sicut Hortensis. In Cochinchinâ fructus maiores sunt, quam in Amboinâ.

Observ. Hæc Palma inter Arécam, & Caryotam media est: habitus, & fructus Arécæ sunt proprii: stamina, & situs florum ad Caryotam declinant: corolla, & calyx masculus utriusque communes: fœmineus calyx foliolorum número differt.

GENUS XXVII. CARYOTA PALMA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* communis. *Cor.* 3-partita. *Stam.* plurima.

Fœm. *Cal.* idem. *Cor.* 3-partita. *Pist.* 1. *Bacca* 2-sperma.

Lin. sy. pl. G. 1343.

† Sp. 1. CARYOTA MITIS. & Cay Dung diah.

Differ. spec. Car. frondibus bipinnatis: foliorum *petiolis* nutantibus: *baccis* 1-spermis.

Hab., & notæ. Palma 15-pedalis, 2 pollices crassa, rectissima, æqualissima. *Fronde* 4-pedales, reclinatæ, bipinnatæ: *stipitibus* sub-teretibus, inermibus: *foliis* cuneiformibus, polynerviis, obliquè præmorsis: *petiolis* longis, tenuibus, nutantibus. *Spatha* communis, simplex, oblonga, sub-acuta. *Spadix* ramoso-spicatus, reflexus: *spicis* pluribus simplicibus, longis: *floribus* ordinatè dispositis, singulis fœmineis inter binos masculos. *Calyx* communis nullus, præter spatham universalem. *Masculis* *Perianthium* proprium 3-phyllum, foliolis obtusis, concavis. *Corolla* petala 3, conica, cur-

va, erecta, sub-clausa. *Filamenta* nulla. *Antheræ* lineares, plurimæ. *Fæmineis Perianthium* 5-phyllum, imbricatum, persistens: foliolis obtusis, concavis. *Corollæ* ut *Masculi*. *Germen* 3-gonum, superum. *Stylus* nullus. *Stigma* acutum, bifidum. *Bacca* rotunda, coriacea, lævis, nigra, globo sclopeti minoris æqualis: semine 1, globoso, pallido, molliusculo. Tam *Baccæ*, quam tota planta tactæ non urunt, aut pruritus afferunt: *Baccæ* tamen edules non sunt. Ad axillas frondium nascitur lanugo quædam crassa, & cinerea, quæ fomitem optimum præbet. Inter *Palmas* hæc omnium pulcherrima est; quando, fante aurâ leni motis petiolis, foliola volitare videntur. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Diversa species cenceri debet a *Caryotâ Urente* Linnæi, quæ sagualter maior dicitur a *Rumphio*, (*Amb.* l. 1. cap. 14. tab. 14.) habetque foliola sessilia, minimè nutantia, & *Drupam* sive *baccam* 2-spermam, urentem, perianthioque proprio caret, communi calyce gaudet.

GENUS XXVIII. SAGITTARIA.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Filam* ferè 24.
 Fœm. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Pist.* multa. *Sem.* multa, nuda. *Lin. sy. pl. G.* 1164.

Sp. 1. SAGITTARIA SAGITTIFOLIA. a *Gây Mác láng.*

Differ. spec. Sag. *foliis* sagittatis, acutis. *Lin. sp. 1.*

Hab., & notæ. *Planta* acaulis, 2-pedalis, palustris. *Folia* sagittata, magna, angulis tribus acutis, nervosis, æqualibus, patentibus: *petiolis* longis, crassis, polygonis, flaccidis, sub-erectis. *Scapus* nudus, *petiolis* similis, illis longior. *Flos* albus, spicis terminalibus, simplicibus, interruptis, longis, erectis: *Masculus* ad apicem spicæ. *Stamina* ultra 20. *Fœminei stigmata* simplicia, 200 circiter, insidentia totidem *Germinibus*, vestitis singulis squamis spathaceis, intus dehiscentibus. *Calyx* communis 3-florus: proprius 3-phyllus. *Petala* 3. *Semina* nuda, oblonga, compressa. *Receptaculum* sub-rotundum, colligens femina.

Habitat paludes, & loca canosa Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 201. *Sagittaria sagittata.* *Thunb. Jap. pag. 242.*

GENUS XXIX. FAGUS.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Cor.* 0. *Stam.* 12.
 Fœm. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capsula* (calyx antea) muricata, 4-valvis. *Sem.* 2. *Lin. G.* 1170.

Sp. 1.

Sp. 1. FAGUS CASTANEA. α Cày Dec gai. β Lie tsù.
Differ. spec. Fag. *foliis lanceolatis, acuminato-serratis, subtus nudis.*
Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor magna: ramis patentibus. Folia lanceolata, denticulis acuminatis serrata, prope basim integerrima, glabra, petiolata, alterna. Flos Masculus ad apicem ramorum, amentis filiformibus. Fœmineus inferior, calyce 4-dentato, corollâ nullâ. Capsula sub-rotunda, echinata: in Cochinchinâ plerumque 2-valvis, 1-sperma. Glans vulgari Europæâ dulpo minor, ejusdem formæ, coloris, & saporis.*

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ: in Chinâ colitur Europææ æqualis.

Thunb. Jap. pag. 195. Castanea Sylvestris, quæ peculiariter, Castanea. Bauh. Pin. pag. 419. n. 2.

Usus. Lignum ad ædificia optimum: fructus, quamvis edules, in Cochinchinâ raro colliguntur.

† Sp. 2. FAGUS COCHINCHINENSIS. α Xuong ed lôn-lâ.

Differ. spec. Fag. *foliis ovatis, confertis: capsulis 3-ocularibus, 3-valvibus.*

Hab., & notæ. *Arbustula 5-pedalis: ramis sub-ascendentibus. Folia ovata, obsolete serrata, glabra, congesta, petiolata. Flos Masculus amentis terminalibus; calyce 5-fido: corollâ 5-fidâ: staminibus 12. Fœmineus inferior in eodem ramo: calyce 5-fido: Corollâ nullâ: capsulâ muricatâ, 3-oculari, 3-valvi, 1-sperma. Semina Castaneas referunt formâ, & colore: magnitudine vix duas pollicis lineas æquantia. Masculi corolla est valde tenuis, & membranacea; ideo si Nectarium vocare magis placeat, non renuam. An Fagus Sylvaticæ Linnæi sp. 3?*

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XXX. QUERCUS.

Char. Gener. Masc. Cal. 5-fidus ferè. Cor. o. Stam. 5-10.

Fœm. Cal. 1-phyllus, integerrimus, scaber. Cor. o. Styl. 2-5. Sem. 1, ovatum. Lin. sy. pl. G. 1168.

Sp. 1. QUERCUS ILEX. α Dec gao.

Differ. spec. Querc. *foliis ovato-oblongis, indivisis, serratisque, subtus incanis: cortice integro.* Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Arbor mediocris: ramis sub-ascendentibus, inermibus: cortice fusco-rufo, integro. Folia oblongo-ovata, indivisa, serrata, subtus incana, tomentosa. Flos Monoicus, amentaceus, sub-*

sub-terminalis. *Glans* ovata, parva, edulis: *calyce* semi-ovato, aspero, persistente.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Hort. Cliff. pag. 448. *Ilex* oblongo, ferrato folio. Bauh. Pin. pag. 424. n. 1.

† Sp. 2. QUERCUS CORNEA. α Deē Sàng. β Chū.

Differ. spec. Querc. *foliis* oblongo-ovatis, repando-ferratis: *glandibus* 3-ocularibus, turbinatis, calyci æqualibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: ligno durissimo, gravi, fusco: *ramis* ascendentibus. *Folia* oblongo-ovata, repanda, ferrata, sub-acuminata, glabra, dura, alterna, petiolata. *Flos* uterque sessilis, amentis linearibus, longis, terminalibus. *Masculi stamina* 5. *Fœminei stigmata* 3, simplicia, sessilia. *Fruētus* sub-lignosus, turbinatus, truncatus, 3-ocularis, 1-spermus, ad humeros usque vestitus *calyce* crasso, aspero, segmentis polyedris ordinatè insculpto.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

† Sp. 3. QUERCUS CONCENTRICA. α Deē báp.

Differ. spec. Querc. *foliis* lanceolato-ovatis, integerrimis, incurvis: *calycibus* laxis, brevissimis, circulis concentricis excavatis.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolato-ovata, acuminata, integerrima, incurva, utrinque glabra, petiolata, sparsa. *Flos* Monoicus: *Masculus* amentis linearibus, congestis, erectis, terminalibus: *Fœmineus* in eodem amento inferior, pedunculatus. *Fruētus* oblongo-ovatus, acuminatus, glaber, rufus: *calyce* persistente, laxo, brevi, intus concavo, lanci simili, exterius excavato circulis quinque, parallelis.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ.

Observ. Hæc species, quamvis foliis similis videatur Quercui Moluccæ (Rumph. Amb. l. 4. c. 49. tab. 56.) ab eâ longè differt calyce, & curvaturâ foliorum.

Usus. Omnes tres species præbent lignum aptum ad magna opera tam nautica, quam domestica, & ruralia: at secunda species aliis prævalet in sustinendis ponderibus gravioribus.

GENUS XXXI. JUGLANS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 1-phyllus, squamiformis. *Cor.* 6-partita. *Et-lam.* 18.

Fœm. *Cal.* 4-fidus, superus. *Cor.* 4-partita. *Styli* 2. *Drupa* nucleo sulcato. Lin. sy. pl. G. 1169.

† Sp. 1. JUGLANS. REGIA. β Hồ táo. α Cây Hạch đào.

Differ. Spec. Jug. *foliis* ovalibus, glabris, subserratis, sub-æqualibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *ramis* longis patentibus. *Folia* imparipinnata, 3-juga: *foliis* sub-æqualibus, oblongo-ovatis, sub-intergerimis, glabris. *Flos* *Masculus* amentis pendulis, sub-terminalibus: *Fæmineus* sparsus, sæpe 2-3-natus in eadem planta. *Drupa* 2-pollicaris, ovata, coriacea, glabra: *nuce* inordinatè sulcata: *nucleo* 4-lobo, oleoso, eduli.

Habitat in provinciis Borealibus imperii Sinensis.

Nux Juglans. Matth. in Diosc. l. 1. c. 141. fig. ibi. Nux Vulgaris. Hill. Brit. herb. pag. 508. tab. 72. fig. 1.

† Sp. 2. JUGLANS CAMIRIUM. α Deâu lai.

Differ. Spec. Jug. *foliis* concis, repandis: *petiolis* longis: *racemis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *ramis* patentibus: *cortice* cinereo, glabro: *ligno* albo, levi, fragili, inutili. *Folia* basi rotundata, superius conica, repanda, glabra, magna, *petiolis* longis, sparsis. *Flos* albus, Monoicus, uterque in eodem racemo, terminali. *Masculus calyx* monophyllus, oblongus, irregulariter dehiscens, sæpius 2-fidus. *Corolla* petala 5, oblonga. *Filamenta* 18: *antheris* bilocularis, stantibus, longitudine corollæ. *Filamenta* 18: *antheris* rarior: *calyce*, & corollâ, ut *Masculi*. *Styli* 2, bifidi, stigmatibus simplicibus. *Drupa* ovalis, coriacea, glabra, Regiæ sub-æqualis: *nuce* ovata, sulcata, 2-loculari: *nucleo* albo, oleoso, eduli.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchina.

Camirium. Rumph. Amb. l. 3. c. 12. tab. 58. Icon, & descriptio Rumphiana aliquatenus discrepant a nostrâ, in quâ nec *Drupa*, nec *folia* sunt cordata.

Ulus. Ex nucleis abundans exprimitur oleum, quod in lampadibus clarâ lucem diffundit, sed citò consumitur, ideoque minus æstimatur.

† Sp. 3. JUGLANS CATAPPA. α Cây Mỏ cua.

Differ. Spec. Jug. *foliis* cuneiformibus: *petiolis* brevibus: *amentis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *ramis* sub-ascendentibus. *Folia* cuneiformia, apice rotundata, sub-acuminata, sub-repanda, glabra, magna, in senectute lætè rubentia: *petiolis* crassis, brevibus, sparsis, congestisque. *Flos* albus, Monoicus, amentis brevibus, simplicibus, laxis, sub-terminalibus, pendulis: *Masculus* ad basim amenti, sufful-

Dddd

sufful-

suffultus squamis lanceolatis : *filamentis* multis : *corollis* 6-partitis.
Fœminei calyx 4-partitus. *Drupa* ovato-oblonga, fibroso-coriacea,
 rubra : *nuce* ejusdem formæ, lacunoso-fulcatâ, 1-loculari : *nucleo*
 oblongo, simplici, eduli.

Habitat in sylvis Cochinchinæ montanis.

Catappa. Rumph. l. 1. c. 58. tab. 68.

Ufus. Lignum rubescens, nec admodum grave ædificiis infervit. Cor-
 tex, & folia nigro tingunt colore.

† GENUS XXXII. CLADODES.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-phyllum : foliolis ovatis, concavis.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 8, membranacea, plana, brevissima. Antheræ sub-
 rotundæ.

* *Fœminei flores* in diversis ramis ejusdem plantæ.

Cal. Perianthium 4-phyllum, inferum, persistens.

Cor. Nulla.

Pist. Germen trigonum. Stylus nullus. Stigmata 3, oblonga, reflexa.

Peric. Capsula sub-rotunda, 3-loba, 3-locularis, 3-valvis, 1-sperma.

Sem. hinc rotunda, inde angulata.

Nom. (Κλαδοδης ramosus) congruit arbusculæ ramosissimæ.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stam. 8, membranacea,
 Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stigmata 3, sessilia. Caps.
 3-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. CLADODES RUGOSA. a Cay Môt.

Differ. spec. Clad. *foliis* lanceolatis, serratis, rugosis : *racemis* spi-
 catis.

Hab. *Arbuscula* 5-pedalis, ramosissima. *Folia* lanceolata, serrata,
 glabra, rugosa, alterna. *Flos* terminalis, minimus : *racemis* laxis,
 in spicis desinentibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XXXIII. PHYLLAUREA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 5-phyllum: foliolis ovatis, concavis.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 30 circiter, brevissima, libera. Antheræ sub-rotundæ, biloculares, minimæ.

* *Fœminici flores in diverso racemo ejusdem plantæ.*

Cal. Perianthium 5-fidum, inferum, persistent: laciniis strictis, obtusis, parvis.

Cor. nulla.

Pist. Germen trigonum. Styli 3, filiformes, longi, reflexi. Stigmata simplicia.

Peric. Bacca sub-ovata, trigona, parva, 3-locularis, 1-sperma.

Sem. ovato-oblonga.

Nomen a foliis aereo colore discretis.

Char. Gener. Masc. Cal. 5-phyllus Cor. 0. Filam. 30 circiter.

Fœm. Cal. 5-phyllus. Cor. 0. Styli 3. Bacca 3-locularis, 1-sperma.

Sp. I. PHYLLAUREA CODIÆUM. a Hâynh bá lá. &c.

Differ. spec. Phyl. foliis lanceolatis, integerrimis, pictis: floribus spicatis.

Hab. *Caulis* arborefcens, 8-pedalis, erectus, teres, sub-divisus: ramis ascendentibus. *Folia* omnium pulcherrima, lanceolata, integerrima, petiolata, sparsa, glabra, plana, nitida, lætè viridia: maculis longis, aureis, irregularibus transversè virgata. *Flos* apetalus, parvus, racemis simplicibus, erectis, terminalibus.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ: puto, quod etiam agrestis.

Codiæum Chrysolicon. Rumph. Amb. I. 6. cap. 29. tab. 25. Croton Variegatum. Lin. sy. pl. 4. pag. 183. sp. 1. Burm. Ind. pag. 203. Thunb. Jap. pag. 270.

Observ. Hæc planta a Linnæo cum aliis Authoribus ad Genus Croton reducitur. Existimo recentem ab illis observatam non fuisse. Mihi in proprio horto culta aliter visa est; Rumphianaque descriptio probè convenit. Præter fructum 3-spermum, qui multis aliis Generebus, præcipuè Monoicis communis est, vix hîc aliam notam invêni Crotonis propriam: stamina vero 30, eaque libera, non Monadelphæ, Crotoni penitus adferantur. Simili ratione compulsus tam præcedens, quam subsequens Genus, quamvis 3-sperma, separanda

putavi. Minus Scientiæ nocebit numerum Generum ex propriis, & constantibus notis augere; quam incertis, & vagis confundendo minuire.

† GENUS XXXIV. TRIDESMIS.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 5-phyllum: foliis lanceolatis, pilosis, patentibus.

Cor. Petala 5, lanceolata, tomentosa, calyci sub-æqualia, receptaculo inserta.

Stam. Filamenta 20 circiter, corollâ breviora. Antheræ oblongæ, stantes.

* *Feminei flores* in eadem spicâ, ad basim.

Cal. Perianthium ut Masculi.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum, superum. Styli 15-20, filiformes, staminibus longiores, in 3 fasciculos collecti. Stigmata crassiuscula.

Peric. Capsula sub-rotunda, hispida, 3-locularis, 3-valvis, 1-sperma.

Sem. intus angulata, exterius gibba.

Nom. (*Δεσμῖς* fasciculus) ob ternos Stylorum fasciculos.

Char. Gener. Masc. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Stam. 20 circiter.

Fœm. Cal. 5-phyllus Cor. 0. Styli multi in 3 fasciculos collecti. Caps. 3-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. TRIDESMIS HISPIDA. *Α* Ki quâc yông.

Differ. spec. Trid. *foliis* utrinque hispida: *spicâ* brevi, terminali.

Hab. Frutex 10-pollicaris, erectus, simplex: *radice* simplicissimâ; longissimâ, verticali, tortuosâ, corticosâ. *Folia* ovata, sub-acuta, sub-ferrata, utrinque pilosa, sparsa. *Flos* spicâ simplici, brevi terminali.

Habitat in dumetis circa Cantonem Sinarum.

Virtus. Radicis decoctum dicitur corroborare tendines, & ossa.

† Sp. 2. TRIDESMIS TOMENTOSA. *Α* Ca xi mâ.

Differ. spec. Trid. *foliis* subtus tomentosis: *spicis* longis, terminalibus.

Hab. & notæ. Caulis frutescens, erectus, 4-pedalis: *ramis* multis, ascendentibus. *Folia* lanceolata, sub-ferrata, subtus tomentosa, alterna. *Flos* spicis longis, simplicibus, terminalibus. *Stamina* 10. *Styl.*

li 6, longi, in tres fasciculos per paria collecti. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma, pilosa.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Observ. Præternaturales apparent hi frutices stylis multis divisim fasciculatis, unicâ autem capsulâ gaudentes: nec commodè dici potest stylos esse 3, in plures lacinias terminatos; siquidem cum sint filiformes, longi, & æquales, basi leviter coaliti, integros potius stylos, quam eorum lacinias repræsentant.

† GENUS XXXV. TRIPHACA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. nullus.

Cor. Monopetala, semiquinquefida: laciniis acutis, in formam ovatam mutuo conniventibus.

Stam. Filamenta 15 circiter, brevissima, libera, receptaculo pedunculato insistentia. Antheræ sub-rotundæ, bilobæ.

* *Feminei flores* in eâdem Cymâ, Masculis mixti.

Cal. nullus.

Cor. Campanulata, patens, semiquinquefida: laciniis contorto-reflexis.

Pist. Germen sub-rotundum, 3-lobum, insistens receptaculo concavo polyfido, pedunculato. Stylus filiformis, tortuosus, corollæ sub-æqualis. Stigma obtusum, 3-fidum.

Peric. Legumina 3, inflato-ventricosa, acuminata, tomentosa, polyperma.

Sem. 4-5, oblongo-ovata.

Nom. (Φακὴ legumen: τρεῖς tres) a tribus leguminibus Pericarpium.

Char. Gen. Masc. Cal. 0. Cor. 5-fida, ovata. Stam. 15.

Fœm. Cal. 0. Cor. 5-fida, campanulata. Stylus 1. Legumina 3.

† Sp. 1. TRIPHACA AFRICANA. γ *Mutouha.*

Differ. spec. Triph. *foliis* cordatis, sub-rotundis: *cymis* lateralibus, & terminalibus.

Hab. Arbor magna, *trunco* crasso, brevi: *ramis* patentissimis. *Folia* cordata, sub-rotunda, acuminata, integerrima, glabra, sparsa, petiolis longis. *Flos* luteus, cymosus, lateralis, & terminalis. *Legumen* 3 pollices longum, binos in medio latum.

Habitat agrestis in continenti Orientali Africæ, contra Mocambicum.

† G E-

† GENUS XXXVI. DIAPHORA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores* in spicis, ad apicem.

Cal. Gluma 1-flora, 3-valvis: valvis acutis, brevibus, intimâ aristatâ.

Cor. Gluma 2-valvis, oblonga, mutica, calyce longior.

Stam. Filamenta sub-nulla. Antheræ 10, filiformes, inæquales: apice caudato, acuto, discolore: insistentes receptaculo confixo paleis multitis, corollæ æqualibus.

* *Feminei flores* in eadem spicâ, ad basim.

Cal. Gluma 1-flora, 3-valvis: valvis latiusculis, tertiâ aristatâ.

Cor. Gluma 2-valvis: valvis latis, acutis, carinatis, calyce longioribus.

Pist. Germen trigonum, superum. Stylus nullus. Stigmata 3, filiformia, longa.

Peric. nullum.

Sem. 1, sub-rotundum, trigonum.

Nom. (*Διαφορά* discrepantia) ob numerum flaminum, quo a familia Graminum discrepat.

Char. Gen. Masc. Cal. Gluma 1-flora, 3-valvis, tertiâ aristatâ. Cor. Gluma 2-valvis, mutica. Stam. 10.

Fœm. Cal., & Cor. ut Masculi. Stigmata 3. Sem. 1, triquetrum.

† Sp. 1. DIAPHORA COCHINCHINENSIS. *α* Lách Khén.

Differ. spec. Diaph. *culmo* triquetro: *paniculis* spicatis.

Hab. Planta graminea, 2-pedalis: *culmo* triquetro, folioso, erecto.

Folia subulata, aspera, basi pilosa. *Flos* axillaris, paniculis in spiculis desinentibus.

Habitat inculta in agris Cochinchinæ.

MONADELPHIA.

GENUS XXXVII. PINUS.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. Stam. plurima. *Antheræ* nudæ.

Fœm. Cal. strobili: squamâ 2-flora. Cor. 0. Pist. 1. *Nux* alâ membranaceâ excepta. Lin. fy. pl. G. 1175.

Sp. 1.

Sp. 1. PINUS SYLVESTRIS. α Cáy Thoung. β Sūn.

Differ. 1pec. Pin. *foliis* geminis, primordialibus solitariis, glabris.
Lin. sp. 1.

Hab. *Arbor* magna: *cortice* crasso, fisso, fusco: *ramis* ascendenti-
bus, tortuosis. *Folia* acerosa, semipedalia, gemina, primordialia
solitaria, tenuia, recta, glabra, duriuscula, plurima. *Flos* Monoic-
us, racemosus: *Famineus* inferior in eodem ramo. *Strobilus* ova-
to-conicus, lignosus, imbricatus. *Nux* oblonga, parva, fusca: nu-
cleo simplici.

Habitat agrestis in montibus Cochinchinæ, & Chinæ: colitur etiam.
Gmel. Sibir. 1. pag. 178. Thunb. Jap. pag. 274. Pinus Sylvestris. Bauh.
Pin. pag. 491. n. 2.

Virtus: resinæ, quæ terebinthina vulgaris. Diuretica, Mundificans.
Diutius cocta, aquâ sæpe mutatâ, prodest in Leprâ, & Phthisi.
Frequentissimus est usus externus in Unguentis, & emplastris.

Observ. Ad radices Pinorum Sylvestrium magnæ longævitatatis in pro-
vinciâ Boreali Chinensi *su chuyen* gigni solent quædam tubera,
sub-rotunda, magna, scabra, fusca, intus albissima, quæ ab Euro-
pæis vocantur *Radix Sinensis alba*, a Cochinchinensibus *Bach phuc*
linh, ab ipsis vero Sinensibus *Pè sū lin*. Horum tuberum decocto
fœliciter utuntur in praxi Medicâ, præcipuè in morbis pulmonum,
& vesicæ. Radix Sinensis rubra provenit ex diversâ plantâ, quæ a
Linneo dicitur *Smilax China*. De radice Sinensi albâ loquitur Rumph.
Amb. 1. 11. pag. 122. Certius antea locutus fuerat Martinius in
Atlante Sinensi pag. 65.

Sp. 2. PINUS ABIES. α Cáy Thoung tau. β Xãn mố.

Differ. spec. Pin. *foliis* solitariis, subulatis, mucronatis, lævibus, bi-
fariam versis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, *trunco* recto, altissimo: *cortice* fus-
co-cinereo, lævi: *ramis* oppositis, sub-ascendentibus. *Folia* lanceo-
lata, mucronata, integerrima, 2-pollicaria, plana, striata, glabra,
bifariam versa, subsessilia. *Flos* lateralis, apetalus: *Masculi* tami-
na connata: *Feminei strobilus* sub-rotundus, bipollicaris, squamis
rotundatis, bifloris: *nuculâ* alata, planâ, irregulari.

Habitat frequentissima in provinciis Australibus imperii Sinensis.

Thunb. Jap. pag. 275. *Dammara* alba fœmina. Rumph. Amb. 1. 3. c.
10. tab. 57. *Abietis* icon. Bellon. Obs. 1. 2. fig. p. 163.

Usus. Lignum hujus arboris, est album, leve, nec magnæ durationis:
vastum tamen, rectum, & cuilibet formæ aptum; ideo apud Sinas
vitatissimum ad extruenda tabulata tam navium, quam domorum.

GENUS XXXVIII. CUPRESSUS.

Char. Gen. Masc. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Antheræ* 4, sessiles.
 Fœm. Cal. Strobili: squama 1-flora. Cor. o. *Styli*? puncta concava. *Nux* angulata. Lin. fy. pl. G. 1177.

Sp. 1. CUPRESSUS SEMPERVIRENS. α Cay Duong. β Pé xú.

Differ. spec. Cupr. *foliis* imbricatis: *frondibus* quadrangulis. Lin. sp. 1.
 Hab., & notæ. *Caulis* 10-pedalis, erectus, arboreus: *ramis* patentibus, brevibus, multis. *Fronde*s lineares, quadragonæ, sparsæ: *folioli*s brevissimis, acutis, imbricatis, apice sub-reflexis, glabris, obscure virentibus. *Flos* apetalus, lateralis: *Masculus* amentis brevibus, squamis monofloris, antheris 4, sessilibus. *Fœmineus* strobilo sub-rotundo, polyvalvi: *seminibus* angulatis, pufillis, oëcis.

Habitat in Chinâ: inde in Cochinchinam delata, cultaque.
 Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas Plinii. Tourn. Inst. pag. 587. sp. 2. tab. 358. Berg. Mat. Med. pag. 809.

Sp. 2. CUPRESSUS THYOIDES. α Trác bá đượp. β . . .

Differ. spec. Cupr. *foliis* imbricatis: *frondibus* ancipitibus. Lin. sp. 3.
 Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis: *ramis*, sive frondibus ancipitibus, planis. *Foliola* acuta, brevissima, imbricata, appressa. *Flos* apetalus, monoicus, lateralis. *Masculus* amentis oblongis: *antheris* 4, sessilibus. *Fœmineus* strobilo sub-rotundo, semipollicari: squamis 1-floris, 1-spermis.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 202. Mill. dict. n. 4.

GENUS XXXIX. THUJA.

Char. Gen. Masc. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Stam.* 4.

Fœm. Cal. Strobili: squama 2-flora. Cor. o. *Pist.* 1. *Nux* una, cincta alâ marginatâ. Lin. fy. pl. G. 1176.

Sp. 1. THUJA ORIENTALIS. α . β . . .

Differ. spec. Thu. *strobilis* squarrosis: *squamis* acutis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, caule erecto: *ramis* patentibus.

*Fronde*s subdivisæ, sparsæ, plurimæ, lætè virides: *folioli*s imbricatis, minutis, acutis, appressis, Cupressi similibus. *Flos* Monoicus, uterque in eodem ramo: *corolla* nullâ. *Masculus* squamâ amenti defensus: *staminibus* 4. *Fœmineus* strobilo oblongo-ovato, squarroso: *squamis* 2-floris: *seminibus* oblongis, alatis.

Ha-

Habitat frequens in Chiná: colitur raro in Cochinchinâ.
Thunb. Jap. pag. 266. Encycl. Econ. tom. 15. pag. 132.

GENUS XL. CROTON.

Char. Gen. Masc. *Cal.* cylindricus, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 10-15.

Fœm. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* 0. *Styli* 3, bifidi. *Capsula* 3-locularis. *Sem.* 1. Lin. fy. pl. G. 1181.

† Sp. 1. CROTON PUNCTATUM. *α* Bạc thau rừng.

Differ. spec. *Crot. foliis* lanceolatis integerrimis, subtus incanis, nitidis, punctatis: *capsulis* furfurosis.

Hab. & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, subtus albicantia, nitida, punctata, alterna. *Flos* albus, terminalis, racemis simplicibus, oblongis: *Femineus* ad basim racemi. *Masculi calyx* 5-partitus, campanulatus: laciniis ovatus, concavis. *Corolla* petala 5, lanceolato-ovata, patentia, calyci sub-æqualia. *Filamenta* 14, filiformia, corollâ longiora: *Antheris* 2-locularibus, stantibus. *Feminei* floris calyx, & corolla, ut Masculi. *Germen* trigonum, superum. *Styli* 3, breves. *Stigmata* totidem, 4-fida: laciniis filiformibus, inflexis. *Pericarpium* Capsula 3-loba, 3-locularis, 1-sperma: cortice furfuroso: seminibus ovatis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Similitudinem habet cum *Crot. Cascarilla*. (Lin. sp. 2.) sed nostri folia nec sunt tomentosa, nec odorata: deque ejus virtute nihil scitur.

† Sp. 2. CROTON LANATUM. *α* Cây Tlai.

Differ. spec. *Crot. foliis* ovato-lanceolatis, integerrimis, glabris, oppositis: *Corollis* lanatis: *capsulis* 6-valvibus.

Hab. & notæ. *Arbor* magna, ramis patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* albus, racemis simplicibus, terminalibus. *Masculi* flores ad apicem. *Calyx* tubulosus, 5-partitus, erectus. *Corolla* petala 5, ovata, concava, intus lanosa, calyci æqualia. *Filamenta* 15, filiformia, corollæ æqualia, receptaculo inserta. *Antheræ* sub-rotundæ, bilobæ. *Feminei* floris in eodem racemo *Calyx* 5-phyllus, foliolis ovatis, acutis, patentibus, persistentibus. *Corolla* nulla. *Germen* ovatum, superum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, filiformia, brevia, bifida, reflexa. *Capsula* ovata, 6-valvis, 3-locularis, 1-sperma: *seminibus* ovatis, apice tuberculosis.

Eece

Habi-

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Ufus. Arboris lignum est album, grave, & longissimæ durationis: ideoque ad maiora ædificia, & pontium publicas idoneum.

† Sp. 3. CROTON CONGESTUM. β Pũ táu.

Differ. spec. *Crot. foliis* ovatis, inciso-ferratis, glabris, venosis: *floribus* congestis, nudis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 5-pedalis: ramis multis, reclinat. *Folia* ovata, ferrata dentibus magnis, inæqualibus, glabra, venosa, alterna. *Flos* Monoicus, uterque apetalus, congestus, axillaris. *Masculi stamina* 18. *Feminei Capsulae* 3-coccæ, pendulæ.

Habitat agreste circa Cantonem Sinarum.

Sp. 4. CROTON TIGLIUM. α Ba dàu tai. β Pũ téu.

Differ. spec. *Crot. foliis* ovatis, glabris, acuminatis, ferratis: *caule* arboreo. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris: ramis paucis, patentibus. *Folia* ovata, acuminata, sub-ferrata, glabra, sparsa, petiolis longis. *Flos* pallidus, racemis simplicibus, terminalibus. *Masculus* ad apicem: *Calyce* 5-fido: *Corollâ* 5-petalâ: *staminibus* 15. *Famineus* multus ad basim: *Corollâ* nullâ. *Capsula* trigono-ovata, 3-locularis, 1-sperma: *Seminibus* oblongo-ovatis.

Habitat incultum in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Granum Moluccum. Rumph. Amb. l. 6. cap. 48. tab. 42. Ricionoides Indica. Burm. Zeyl. pag. 200. tab. 90.

Virt.: seminum. Purgans, Emetica, Emmenagoga, acerrima. Mitior, quantum velis, fit, si hæc semina a pelliculâ interiori libera linteo involvas & contundas, ita ut totum oleum linteo adhæreat, massamque istam coquas aceto, & exsiccatam leviter torreas. Valet in obstructionibus rebellibus, præcipue uteri: in Hydrope, & Cacochymia ex humoribus crassis, & tenacibus, quos attenuat, & educit per alvum absque periculo

Sp. 5. CROTON LACCIFERUM. α Cây Kánh kién.

Differ. spec. *Crot. foliis* ovatis, tomentosis, serrulatis, petiolatis: *calycibus* tomentosis. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris: ramis paucis, longis, patentibus. *Folia* ovata, sub-acuminata inæqualiter dentata, tomentosa, sparsa, petiolis longis. *Flos* albus, subterminalis racemis simplicibus. *Masculus* ad apicem: *corollâ* 5-petalâ: *staminibus* 15-20. *Capsula* subrotunda, tomentosa, parva, 3-locularis, 1-sperma.

Habitat agreste in provinciis Australibus Cochinchinæ, & in Cambodiâ.

Lacca. Garc. Arom. l. 1. cap. 8. Halecus terrestris. Rumph. Amb. l. 5. cap. 43. tab. 127. Ricinoides aromatica, arbor Circææ foliis hirsutis, floribus spicatis maior. Burm. Zeyl. pag. 201. tab. 91.

Virtus: Corticis, & Gummi. Sub-astringens, Diuretica, Mundificans. Prodest in oris ulceribus, Gonorrhæa, Fluxu albo, Dysenteria.

Ufus. Laccam a formicis rufis formari mihi, & illius regionis indigenis haud dubium est; qui idcirco hoc gummi vernaculo nomine dixerunt *Rubrum formicarum*. Hæ pro materiâ accipiunt ex Crotone Laccifero (an etiam ex aliquâ aliâ arbore? non satis comperit) succum illum gummosum, quem, punctis arboris ramis, exsugunt, digestumque, ac fluido animali in ventre mixtum reponunt, eisdem inrustantes arboris ramos, nidofque pro futurâ prole ædificantes, more Apum. Laccâ utuntur Indiani ad tingenda serica colore carmesino, pulchro, & immutabili. Lignum arboris album, leve, & fragile inutile censetur.

Sp. 6. CROTON AROMATICUM. β Pa tau yong.

Differ. spec. Croton. *foliis* cordatis, scabris, sub-ferratis, petiolatis: *caule* arboreo. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus. *Folia* cordata, acuta, sub-ferrata, scabra, odorata, magna, sparsa, petiolis longis, reflexis. *Flos* albus, racemis simplicibus, brevibus, terminalibus, & lateralibus. *Famineus* stigmatibus tribus, sessilibus, ramosis; reflexis. *Capsula* compresso-rotunda, scabra, 3-locularis 1-sperma; seminibus compresso-rotundis. Odor plantæ non ingratus, ut in Amboinâ.

Habitat incultum circa Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 204. Halecus Litorea. Rumph. Amb. l. 5. cap. 42. tab. 126. Ricinoides arbor aromatica, Circææ foliis media. Burm. Zeyl. pag. 202.

Sp. 7. CROTON MOLUCCANUM. α Ba dâu nam.

Differ. spec. Croton. *foliis* cordatis angulatis, scabris, subtus tomentosus. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. *Arbor* 8-pedalis, ramis longis, reclinatis. *Folia* cordata, angulata, acuta, subtus tomentosa, magna, petiolis longis, sparsis. *Flos* albus, racemis brevibus: *Masculus* superior, *calyce* 5-fido, *Corollâ* 5-petalâ, obtusâ, reflexâ: *staminibus* 10. *Flos Famineus* binus, vel ternus ad basim, *calyce* 5-fido, *Corollâ* 5-petalâ, acutâ, erectâ. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma, lævis. *Nectarium* glandulis 5, ovalibus.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 205. Ricinus dulcis, arborefcens, foliis populi nigrae argenteis. Pluk. Alm. pag. 320. tab. 220. fig. 5.

Virtus : seminum. Purgans , Emerica , Deobstruens. Eadem fere , quæ Crot. Tigllii , sed minus vehemens , similibus præparatione lenior , & innoxia fit ; ideo apud Medicos Cochinchinenses crebrius usu venit.

GENUS XLI. RICINUS.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stam.* numerosa.
 Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3 , 2-fidi. *Caps.* 3-
 locularis. *Sem.* 1. *Lin. sy.* pl. G. 1184.

Sp. 1. RICINUS COMMUNIS. α Cay Du du deau. β Pí má : 'Hó má.
 Differ. spec. Ric. *foliis* peltatis , sub-palmatis , ferratis. *Lin. sp.* 1.
 Hab. , & notæ. *Caulis* biennis , 8-pedalis , erectus , teres , lævis : ramis paucis , patentibus. *Folia* peltata , sub-palmata , 8-partita , laciniis lanceolatis , ferratis , in orbem expansis : *petiolis* longissimis , rectis , glabris , inanibus , sparsis. *Flos* racemis terminalibus : *Masculus* inferior , *calyce* 5-partito , *corollâ* nullâ : *antheris* oblongis , albis , 100 circiter , in diversos fasciculos collectis , Polyadelphis. *Fœmineus* ad apicem racemi : *Calyce* sæpius 5-partito , *Corollâ* nullâ *Stigmata* 3 , filiformia , 2-fida , rubra. *Capsula* sub-rotunda , villosa-echinata , 3-locularis , 1-sperma. *Semina* ovata , nitida , nigra , punctis albis conspersa. Hujus duæ sunt varietates : prima caule , & petiolis albicantibus : altera rubris.

Habitat incultus , cultusque in Cochinchinâ , & Chinâ.

Ricinus albus , & ruber. Rumph. Amb. 1. 6. cap. 46. & 47. tab. 41.
 Ricinus vulgaris. Bauh. Pin. pag. 432. n. 1. Nhambu Guaçu. Pif. Brasil. pag. 180.

Virtus : seminum , vel olei expressi. Purgans , Anthelminthica , Antispasmodica , Diuretica. Valet in Volvulo , colicâ pictonum , & nephriticâ. Externè in convulsionibus , vermibus , hydrope , abdominalibus flatibus , & torminibus , doloribus podagræ. Videndus Clar. Berg. Mat. Med. pag. 822 : & fusiori calamo libellus Anglicus D. Pet. Canvane. Dissert. on the oleum Ricini. Lond. 1769. Ubi notabiliores hujus olei vires exponit.

Sp. 2. RICINUS TANARIUS. α Bách đản nam.

Differ. spec. Ric. *foliis* peltatis , repandis. *Lin. sp.* 2.

Hab. , & notæ. *Arbor* mediocris , ramis tortuosis , patentibus. *Folia* peltata , sub-ovalia , sub-acuminata , repanda , glabra , subter albicantia , odora , sparsa , petiolis longis. *Flos* hermaphroditus , apetalus : racemis simplicibus , longis , sub-terminalibus. *Periantbium* 3-phyllum , foliolis ovato-lanceolatis , curvis , patentibus , deciduis. *Car.* nulla. *Fi-*
la-

lamenta 30 circiter, receptaculo inhaerentia, calyce longiora. *Anthera* bilobæ, sub-rotundæ. *Germe*n trigonum, superum, *Stylus* crassus, brevis. *Stigmata* 3, filiformia, reflexa. *Capsula* 3-loba, glabra, 3-valvis, 3-locularis, 1-sperma: *seminibus* sub-rotundis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 207. Tanarius Minor. Rumph. Amb. l. 5. c. 37. tab. 121.

Observ. Descriptio Rumphiana floribus lateralibus a nostrâ differt.

Quot habeat stamina non declarat: ego numeravi 30, eaque libera, floresque omnes hermaphroditos. Ideo non proprio judicio, sed Linnæanum secutus Ricino annumeravi. Folium Mappæ (Rumph. l. 5. c. 24. tab. 108.) a Linnæo dictum Ricinus Mappæ, foliis etiam repandis delineatur a Rumphio, sicut Tanarius, nec aliam notam invenio, per quam specie differant.

† Sp. 3. RICINUS APELTA. β Xān pē xū.

Differ. spec. Ric. *foliis* basi petiolatis, conicis, integerrimis.

Hab., & notæ. *Frutex* 4-pedalis, ramosissimus. *Folia* non peltata, basi rotundata, inde conica, integerrima, glabra, subtus albicantia, sparsa, petiolis longis. *Flos* Monoicus, apetalus, uterque simul in eodem racemo terminali. *Masculi* stamina multa. *Feminei calyx* 3-partitus. *Stigmata* 3, sessilia, indivisa, lanosa, reflexa: *capsula* villosissima, 3-locularis, 1-sperma.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

GENUS XLII. JATROPHA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* o. *Cor.* 1-petala, infundibulif. *Stam.* 10: alterna breviora.

Fœm. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala, patens. *Styli* 3, bifidi. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* 1. Lin. G. 1183.

Sp. 1. JATROPHA JANIPHA. β Pē fū tsū. α Bāch phu tū.

Differ. spec. Jat. *foliis* palmatis, lobis integerrimis: intermedio utrinque sinu lobatis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Planta* fruticosa, 4-pedalis, caule recto, simplicissimo, inermi. *Folia* palmata, sub-9-loba: lobis lanceolatis, inæqualibus, integerrimis, interdum, sinuatis. *Flos* Monoicus: recentem non vidi. *Radix* tuberosa, fasciculata: tuberibus ovato-oblongis, acutis, carnosis, intus, & extra albis, 3-pollicaribus: sapore subdulci, sub-ardente.

Habitat inculta apud Sinas.

Jacq. Amer. pag. 256. tab. 162. fig. 1. Janipha frutescens. Lœfl. It. 309.

Virt:

Virtus: radicis. Calefaciens, resolvens. Assâ, non crudâ utuntur Medici.

GENUS XLIII. STERCULIA.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Filam. 15.

Fœm. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Germen columnæ infidens.

Caps. 5-locularis, polysperma. Lin. fy. pl. G. 1185.

Sp. 1. STERCULIA FŒTIDA. α Chim chim rãng.

Differ. Spec. Sterc. foliis digitatis.

Hab., & notæ. Arbor supra mediocrem, ramis patentibus, inermibus. Folia digitata, petiolo longissimo: foliolis lanceolatis, integerrimis, 7-9-natis, glabris, glaucis, in orbem dispositis, sessilibus. Flos Monoicus, apetalus, racemis sub-terminalibus, foetidis. Calyx uterque 5-partitus, glaber, magnus, patens, cinereo-glaucus. Stamina 15 circiter, connexa. Stylus unicus. Germen pedunculatum. Capsula sub-rotundo-ventricosa, sub-compressâ, corticosa, lævis, 5-locularis, 2-valvis, polysperma. Semina oblongo-ovata, multa, pedicellis propriis ex utrâque valvâ pendentibus in formam leguminis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Clompanus Maior. Rumph. Amb. l. 5. c. 22. tab. 107. Nux Zeylanica, folio multifido, digitato, flore stercus olente. Burm. Zeyl. pag. 169.

Virtus: foliorum, & præcipuè corticis. Aperiens, Pellens, Diuretica, Diaphoretica. Valet in Hydrope, Rheumatismo, Vermibus, Scabie. Semina sunt oleosa, in Cochinchinâ non edulia: imo, si incautè deglutiantur, afferunt nauseam, vertiginem, mentis turbationem.

Ufus. Lignum pallidum, & leve, longè durat, nec patitur fissuras; ideo maximè idoneum est ad tornanda quælibet vasa, quæ, superaddito vernice, pulchra reduntur, & utilia. Lignum non malè olet, ut flores.

† GENUS XLIV. VERNICIA.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Perianthium tubulosum, 2-fidum, laciniis rotundatis, erectis.

Cor. Petala 5, oblonga, campanulata, patentia, calyce longiora.

Stam. Filamenta 10, basi in fasciculum coalita, interiora longiora.

Antheræ rotidem, sagittatæ.

* Fœ-

* *Femineæ flores pauci in eodem ramo.*

Cal. ?

Cor. ?

Pist. Germen superum, sub-rotundum, trilobum. Stylus nullus, Stigma obtusum, 3-fidum.

Peric. Drupa mediocris, sub-rotunda, varicosa.

Sem. Nux ossæa, obtusè trigona, rugosa, 3-locularis, 1-sperma: nucleis ovato-oblongis.

Nom. ab oleo ex nucleis expresso, quo pro Vernice utuntur indigenæ.

Char. Gen. Masc. Cal. 2-fidus. Cor. 5-petala. Stam. 10, connexa.

Form. Cal. . . . Cor. . . . Stigma obtusum, 3-fidum. Drupa varicosa: nuce 3-gonâ, 3-loculari.

† Sp. 1. VERNICIA MONTANA. a Cay deau Lon. & Tong Xi.

Differ. Spec. Vern. *foliis sub-cordatis, acuminatis, undulatis: pedunculis polyfloris, terminalibus.*

Hab. *Arbor magna: ramis ascendentibus. Folia obsolete cordata, acuminata, integerrima, undulata, glabra, sparsa, petiolata, glandulis binis perforata ad insertionem petioli. Flos albus, pedunculis polyfloris, brevibus, terminalibus, absque Amento.*

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ, simul & in Chinâ.

Observ. Convenit cum Hippomane Linnæi Calyce bifido, & stigmate 3-fido: non vero corollâ, numero, & formâ staminum, nuceque 3-gonâ, 3-loculari. De Hippomanes Characteribus diversi Authores diversè loquuntur, omnes de Americanis, nullus, quem sciam, de Indianâ. Arbor Vernicis (Rumph. Amb. l. 3. c. 44. tab. 76.) cum nostrâ Verniciâ cohæret in aliquibus notis, non in omnibus. Ea vero arbor non est celebris Sinensium Vernix, vulgari

linguâ Cantonensi dicta *Tsât Xi*, quam nos Augiam vocatam supra descripsimus in Polyandriâ, Monogyniâ, Genere VI.

Usus. Verniciæ lignum parum utile est ad edificia. Ex nucleis drupæ extrahitur abundans oleum flavum, viscidum, pellucidum, mediocriter liquidum, quo oblinuntur ligna, & telæ, quæ tempestatibus aeris, & pluvie exponi solent. Miseri frequenter videtur cum verâ Vernice Sinicâ, (Augiâ) tum ut hujus nimia crassities minuat, ac magis ductilis fiat, tum ut quantitas, quæ carè venditur, augeatur. Lychnis inutile est, quia in flammam citò abit, & citò consumitur.

SYNGENESIA.

GENUS XLV. TRICHOSANTHES.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita, ciliata. *Filam.* 3.
 Feem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita, ciliata. *Stylus* 3-
 fidus. *Pomum* oblongum. Lin. *fy.* pl. G. 1190.

Sp. 1. TRICHOSANTHES ANGUINA. α Μυρρ Saoc. 3 . . .

Differ. spec. *Trich. pomis* teretibus, oblongis, incurvis. Lin. *sp.* 1.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, scandens, cirrhosus, ramosus. *Folia* cordata, sub-rotunda, lobata, dentata, petiolata, alterna. *Flos* Monoicus, albus, axillaris, pedunculis geminis. *Corolla* utraque 5-partita, terminata capillitio longo, cincinnato. *Filamenta* 3, antheris stantibus, connexis. *Stylus* 3-fidus. *Pomum* longum, tenue, utrinque acuminatum, teres, læve, tortuoso-convolutum, in longitudinem virgatum fasciis alternis albis, & viridibus.

Habitat culta, & esculenta in Cochinchina, & China.

Burm. Ind. pag. 207. Anguina Sinenfis flore albo, elegantissimo, fructu oblongo, intorto. Mich. G. 12. tab. 9. Petola Anguina. Rumph. Amb. 1. 9. cap. 43. tab. 148.

Sp. 2. TRICHOSANTHES CUCUMERINA. α Bât bát thau.

Differ. spec. *Trich. pomis* ovatis, acutis: *foliis* cordatis, angulatis. Lin. *sp.* 3.

Hab., & notæ. *Caulis* longissimus, scandens, herbaceus, ramosus. *Folia* lato-cordata, crenata, infera 3-lobata, supra palmata. *Flos* Monoicus, albus, ciliatus, axillaris. *Poma* ovata, acuta, lævia, coccinea, 5-locularia, polysperma, binos pollices longa. Non esculenta. Habitat sepes arundinum Bambus in Cochinchina.

Burm. Ind. pag. 208. Thunb. Jap. pag. 322.

† Sp. 3. TRICHOSANTHES PILOSA. α Cay Qua.

Differ. spec. *Trich. Caule*, & *foliis* pilosis: *spicis* axillaribus: *bracteis* lanceolatis, ferratis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, longissimus, sulcatus, pilosus, scandens cirrhis bifidis. *Folia* cordata, denticulata, pilosa, venosa, inferiora palmata, supra triloba. *Flos* albus, Monoicus: *spicis* longis, lateralibus: *bracteis* lanceolatis, ferratis, flores sustentibus. *Corolla* utraque 5-partita, ciliata cincinnis longis. *Poma* ovata, acuta, coccinea, 1-locularia: *seminibus* rhomboideis, compressis, lobatis, fuscis.

Habi-

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 4. TRICHOSANTHES TRICUSPIDATA. α Bât bát rùng.
Differ. spec. Trich. *foliis* tricuspидatis, glabris, polynerviis: *stipulis* sub-rotundis, crassis, crenatis: *spicis* axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, cirrhis trifidis. *Folia* cordata, polynervia, denticulata, glabra, in tres cuspides desinentia: *stipulis* sub-orbiculatis, crenatis, crassis. *Flos* albus, Monoicus, *spicis* axillaribus, bracteis magnis, dentatis. *Corolla* utraque ciliata. *Poma* parva, lutea, ovata, acuta, bilocularia, bisperma.
Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 5. TRICHOSANTHES SCABRA. α Dua nhà thỏi.

Differ. spec. Trich. *foliis* sub-rotundis, scabris, rugosissimis: *pedunculis* 1-floris.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, polysulcus, scandens, cirrhis bifidis. *Folia* cordata, sub-rotunda, rugosissima, scabra, pedunculata, alterna. *Flos* Monoicus, albus, ciliis brevibus: *pedunculis* monofloris, axillaribus. *Pomm* sub-rotundum, parvum, rubrum, 12-lobum, 5-loculare, polyspermum: *feminibus* planis, oblongis.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

G E N U S XLVI. M O M O R D I C A.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-partita. *Filam.* 3.

Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Pommum* elasticè diffiliens. Lin. sy. pl. G. 1191.

Sp. 1. MOMORDICA CHARANTIA. α Múop dãng. β Khú quã.

Differ. spec. Mom. *pomis* angulatis, tuberculatis: *foliis* villosis, longitudinaliter palmatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, tenuis, ramosus, cirrhis lateralibus scandens. *Folia* sinuato-palmata, rugosa, glabra, dentata, in orbem expansa, nervis pubescentibus, alterna; petiolata. *Flos* luteus, Monoicus, quandoque etiam hermaphroditus: *pedunculis* longis, axillaribus, 1-floris. *Calyx* utriusque profundè 5-partitus. *Corolla* plerumque 5-partita, interdum 6-partita: *staminibus* 3, connexis. *Pommum* oblongum, obtusè angulatum, tuberculatum, utrinque attenuatum, exterius album, flavum, aut viride, interius uterum, carnosum, elasticè diffiliens, 1-loculare: *feminibus* ovatis, planis, margine præmorsis.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Amara Indica. Rumph. Amb. l. 9. cap. 46. tab. 151. Pandi Pavel Rhed.

Rhed. Malab. 8. pag. 17. tab. 9. Momordica Zeylanica, fructu longiore. Tourn. Inst. pag. 103. tab. 30.

Ufus. Fructus, quamvis amari, ab indigenis in taleolas secti accerariis adhibentur. Cocti amaritatem deponunt, salubresque censentur, refrigerantes, ac stomachici. Balsamina, & Charantia potius varietates dicendæ videntur, quam diversæ species: utraque invenitur aliquando fructu sub-rotundo, semper tuberculis elongatis varicosa.

Sp. 2. MOMORDICA LUFFA. α Múop ngot. β Sū quā.

Differ. spec. Mom. pomis oblongis: *fulcis* catenulatis: *foliis* incisif. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, angulatus, ramosissimus, scandens claviculis bifidis, spiralibus. *Folia* 5-7-angulata, angulis acutis, medio duplò longiore, inæqualiter ferrata, venosa, rugosa, petiolis longis, alternis. *Flos* flavus, Monoicus: *Masculus* pedunculis polyfloris terminalibus: *corollâ* 6-partitâ, rugosâ, patente: staminibus tribus. *Femineus* lateralis, solitarius, superus: *corollâ* 5-partitâ, rest-xâ: *stilo* 3-fido. *Pomum* longitudinis pedalis, binos pollices crassum, sub-teres, sæpius utrinque attenuatum, pilosum, *fulcis* longitudinalibus catenulatis, 3-loculare, polyspermum: *pulpâ* alba, flaccidâ, esculentâ, saporis fatui: *seminibus* oblongis, compressis, lævibus.

Habitat latè culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Petola Tschina. Rumph. Amb. 1. 9. cap. 42. tab. 147. Pepo Indicus, reticulatus, seminibus albis. Burm. Zeyl. pag. 185.

Sp. 3. MOMORDICA CYLINDRICA. β Søy quā.

Differ. spec. Mom. pomis cylindricis, longissimis: *foliis* angulatis, acutis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, angulatus, scandens, cirrhosus, longus, ramosus. *Folia* cordata, 9-angulata, angulis intrantibus rotundatis, denticulata, scabra. *Flos* Monoicus, luteus, pedunculis longis, polyfloris. *Poma* longissima, bipedalia, & ultra, recta, pendula, sub-teretia, obtusa, reticulato-rugosa, edulia saporis fatui. *Masculi* floris Antheræ lineares, repentes, tres ab invicem separatae. *Semina* compressa, oblonga, lævia, nigra.

Habitat culta circa Cantonem Sinarum.

Pepo Indicus, reticulatus, seminibus nigris. Burm. Zeyl. pag. 186. Herm. Lugdub. pag. 482.

Observ. Momordica Luffa, & cylindrica non habent fructus elasticè dissilientes, Momordicæ generis proprios: imo nec dissilire possunt; siquidem in perfectâ maturitate constant fibris tenacissimis, intricatis, (prout bene notavit Rumphius) quæ vix magnâ violentiâ distrahi

trahi possunt. Hæ autem fibræ non inveniuntur in Balsaminâ, & Charantiâ, quæ vel elasticitate naturali rumpuntur, vel clausæ putrescunt, nullis relictis filamentis. Luffam Ægyptiacam non vidi, de Indianâ loquor.

G E N U S XLVII. C U C U M I S.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filam.* 3.
Fœm. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Pist.* 3-fidum. *Pomi* semina arguta. *Lin. sy. pl. G.* 1193.

Sp. 1. CUCUMIS SATIVUS. α Dua chyot. β Hoâm quâ.

Differ. spec. *Cuc. foliorum* angulis rectis: *pomis* oblongis, scabris.
Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, scandens, ramosus. *Folia* angulata, angulis sub-rectis, lævia, petiolata, sparsa. *Flos* luteus, Monoicus, solitarius, axillaris. *Pomum* oblongum, obtusum, subtrigonum, tuberculoso scabrum, in maturitate luteum, 3-loculare polyspermum: *seminibus* ovato-oblongis, argutis, compressis, lævibus, albicantibus. *Varietas* 1, & communior, fructu 5 pollices longo, saporis sub-fatui. *Varietas* 2 duplo maior, sapidior, & odoratior, dicta *Dua bà cai*.

Habitat latè culta in Cochinchinâ, simulque in Chinâ.

Thumb. Jap. pag. 324. Tournef. *Inst.* pag. 104. tab. 31.

Sp. 2. CUCUMIS MELO. α Dua gang. β Cãn quâ.

Differ. spec. *Cuc. foliorum* angulis rotundatis: *pomis* torulosis. *Lin. sp.* 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, procumbens, ramosissimus. *Folia* palmato-sinuata, angulis rotundatis. *Flos* luteus, Monoicus, lateralis, solitarius. *Pomum* ovatum, magnum, obtusum, torolofum, læve, luteum, odorum, carnosum, 3-loculare, polyspermum: *seminibus* argutis, pallidis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Forsk. Arab. pag. 168. n. 52. Tournef. *Inst.* pag. 104. tab. 32. Melo
Vulgaris. Bauh. Pin. pag. 310. n. 1.

Ufus. Esculentus. In Cochinchinâ, & in provinciis Chinæ Australibus nimis aquosi, & inspidi sunt; ideo frequentius comeduntur muriâ sub-acti, rarius recentes.

Sp. 3. CUCUMIS ACUTANGULUS. α Muóp Khên. β . . .

Differ. spec. *Cuc. foliis* rotundato-angulatis: *pomis* angulis 10, acutis. *Lin. sp.* 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, angulatus, cirrhosus, scandens, ramosus. *Folia* cordata, rotundato-angulata, dentata, pilosa. *Flos* luteus, Monoicus: Masculus terminalis, poliflorus: Fœmineus lateralis solitarius. *Pomum* ovatum, obtusum, acutè angulatum, 5 pollices longum, luteo-fuscum, læve, polyspermum: *seminibus* subovalibus, compressis, lævibus, nigris. Cortex fructus in maturitate fibrosus, sicut Mom. Luffæ, & Cylindricæ.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 209. Petôla Bengalensis. Rumph. Amb. I. 9. c. 44. tab. 149.

Operculum fructus nec apud Rumphium invēni, nec in ipsis plantis.

Ufus. Tener fructus, dum crudus, est fatui saporis: elixatus, & conditus mensis apponitur.

Sp. 4. CUCUMIS MADERASPATANUS. α Cung cang tlon thâi.

Differ. spec. Cuc. *foliis* cordatis, integris, denticulatis: *ovis* globosis, glabris. Lin. sp. II.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, tenuis, cirrhosus, ramosus, scandens. *Folia* cordata, sub-rotunda, integra, denticulata, glabra, petiolata, alterna, parva. *Flos* albus, axillaris, pedunculis polyfloris. *Pomum* globosum, semipollicare, læve, luteum, 3-loculare, polyspermum. Planta Melothriæ valde proxima.

Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Cucumis Maderaspatenfis, fructu minimo. Pluk. Almag. 123. tab. 170. fig. 2.

GENUS XLVIII. CUCURBITA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.

Fœm. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Pist.* 3-fidum. *Pomî* *semina* margine tumido. Lin. sy. pl. G. 1192.

Sp. I. CUCURBITA LAGENARIA. α Cây Bâu. β Hủ quã: Hủ ló.

Differ. spec. Cucurb. *foliis* sub-angulatis, tomentosis: basi subtus biglandulosis: *ovis* lignosis. Lin. sp. I.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, crassus, longus, multiplex, scandens, cirrhosus, ramosus. *Folia* cordata, sub-rotunda, repanda, denticulata, tomentosa, petiolata, alterna, subtus biglandulosa, mollia, cinerea, magna. *Flos* albus, pedunculis longis, solitariis, 1-floris, lateralibus. Utriusque *calyx* cyathiformis, 5-dentatus. *Corolla* Calyci coalita, patula, rugosa, 5-partita, laciniis acuminatis. *Fructus* multiformis, pallidus, lævis, 3-locularis, polyspermus: seminibus oblongo-ovatis, compressis, margine tumidis: cortice in senectute ligno-

lignoso. Varietas 1, communissima: fructu tereti, longissimo, crasso, eduli. Var. 2: fructu sub-rotundo, vel ovato, omnium maximo, ex cujus cortice parantur vasa ampla. Var. 3: fructu lageniformi, parvo, non eduli, amaro, cujus cortex ad servandos liquores aptior est.

Habitat ubique culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Rumph. Amb. 1. 9. cap. 38. tab. 144. Cucurbita Lagenaria, flore albo, folio molli. Bauh. Pin. pag. 313. n. 3.

Virt.: fructus. Refrigerans, Diuretica.

Sp. 2. CUCURBITA PEPO. α Βί δαο. β Tuṃ qūa.

Differ. spec. Cucurb. foliis lobatis: pomis lævibus. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, crassus, multiplex, angulatus, hispissimus, ramosus, scandens cirrhis bifidis. *Folia* cordata, magna, sub-rotundo-angulata, dentata, rugosa, utrinque pilosa: *petiolis* longis, alternis, crassis, flexuosis, hirsutis. *Flos* luteus, Monoicus, lateralis, solitarius, pedunculis petiolo similibus, brevioribus. *Calyx* dentibus 5, magnis, incisis, undulatis, reflexis. *Corolla* supera, tubulosa, campanulata: limbo 5-partito, patente: *antheris* filiformibus, reptantibus. *Poma* oblongo-ovata, 3-locularia, polysperma, interiori carnosa, alba, insipida, exterius pallidè viridia, hispida: *seminibus* compressis, pallidis, margine tumidis.

Habitat frequentissima in Cochinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 323. Comolenga. Rumph. Amb. 1. 9. cap. 37. tab. 143.

Uſus. Inter Cucurbitas hæc est omnium cibo aptissima, & saluberrima, quæ vix unquam negatur infirmis. Virtus eadem, quæ præcedentis. Poma exterius non prorsus lævia, sed plerumque pilis setosis hispida.

Sp. 3. CUCURBITA MELOPEPO. α Βί ngó β Năn quā: Fán quā.

Differ. spec. Cucurb. foliis lobatis: caule erecto: pomis depresso-nodosis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sub-teres, pilosus, scandens, vel procumbens, cirrhis 3-fidis, ramis multis, longis. *Folia* lobato-angulata, ferrata, pilosa, alterna, petiolis longis. *Flos* luteus, Monoicus, pedunculis lateralibus, 1-floris. *Calyx* laciniis 5, liniarispatulatis, patentibus. *Corolla* campanulata, limbo 5-partito, patente. *Antheræ* lineares: distinctæ, erectæ. *Ponum* magnum, rubro-luteum intus, & foris: seminibus pallidis, margine tumidis. Formâ variat: plerumque sub-rotundum, sæpe depressum, semper torulosum, interdum ovatum, raro verrucosum. Unde existimo Cucurb. verrucosam, & Melopeponem (Lin. sp. 4. & 5.) varietates

tes esse, non diversas species; nam licet Melopepo alicubi videatur stare caule erecto, naturam semper scandens est, cum semper infruat cirrhis, quibus ascendens inniti possit. In India semper scandunt, vel procumbunt, quando absunt adminicula.

Habitat late culta in Cochinchina, & China.

Pepo Indicus. Rump. Amb. l. 9. cap. 39. pag. 309. tab. 145. Melopepo. Tourn. Inst. pag. 106. tab. 34.

Ufus. Hi fructus magnae utilitatis sunt navigantibus; nam cum servari possint incorrupti, & quasi recentes per menses aliquot, cibum praebent vegetabilem, in longis navigationibus optabilem, & salubrem.

Sp. 4. CUCURBITA CITRULLUS. α Dua hau. β Si qua.

Differ. spec. Cucurb. foliis multipartitis. Lin. sp. 6.

Hab., & notae. *Caulis* annuus, teres, striatus, longus, ramosus, pilosus, procumbens, diffusus, cirrhis lateralibus, bifidis. *Folia* multipartita: laciniis, incisis sub-acutis, pilosis. *Flos* flavus: Monoicus, pedunculis brevibus, foliariis, lateralibus: *calyce* 5-dentato: *corolla* 5-partita. *Pomum* magnum, laeve, rotundum, vel oblongum sesquipedale, intus aquosum, dulcissimum, ruberrimum, aliquando pallidum, locale, polyspermum: seminibus compressis, margine tumidis, nigris, vel rufis.

Habitat frequenter culta in Cochinchina, & China.

Thunb. Jap. pag. 323. Anguria Indica. Rumph. Amb. l. 9. cap. 40. tab. 146. fig. 1. Anguria Citrullus dicta. Bauh. Pin. pag. 312. n. 1.

Ufus. Esculentus, gratissimus in terris calidioribus.

Virtus: pomi. Humectans, Refrigerans. Semen Emulsiva, Obtundens, sub-Diuretica. Rumphius loco citato asserit fructus pulpam valere contra toxicum, & morsus venenosos: item contra anxietates exortas ex opio male praeparato, vel magna dosi assumpto; quod ipse expertus non sum

GENUS XLIX. BRYONIA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filam.* 3.

Fem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Stylus* 3-fidus. *Bacca* sub-globosa, polysperma. Lin. fy. pl. G. 1194.

† Sp. 1. BRYONIA HASTATA. β Si toung qua.

Differ. spec. Bry. foliis hastatis, denticulatis, glabris: pedunculis polyfloris.

Hab., & notae. *Caulis* herbaceus, tenuis, scandens, cirrhosus. *Folia* cordata, hastata, denticulata, glabra. *Flos* albus, Monoicus, pedun-

pedunculis polyfloris, axillaribus. *Cal.* nullus. *Corolla* tubulosa, limbo 5-partito, erecto. *Filamenta* 3, fundo corollæ insistentia: glandulis 3, alternis, verrucosis. *Bacca* ovata, acuta, parva, rubra, 1-ocularis, polysperma: *seminibus* ovatis, arillatis, paucis. Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. BRYONIA TRILOBA. α Deom ác ba Chia.

Differ. spec. Bry. *foliis* trilobis, 5-nerviis: *stipulis* sub-rotundis, concavis: *pedunculis* monofloris.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, sulcatus, scandens cirrhis trifidis. *Folia* cordata, triloba, quinque-nervia, serrato-repanda, utrinque lævia: *stipulis* sub-rotundis, concavis, ferratis. *Flos* albus, Monoicus, axillaris, pedunculis solitariis, monofloris. *Bacca* ovata, sub-acuta, glabra, lutea, sesquipollicem longa, 5-ocularis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Sp. 3. BRYONIA GRANDIS. α Deom ác ngu chia.

Differ. spec. Bry. *foliis* cordatis, angulatis, basi subtrus glandulosis.

Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, magnus, ramosus, scandens cirrhis simplicibus. *Folia* cordata, sub-rotunda, 5-angulata, utrinque lævia, denticulata, alterna, petiolata. *Flos* albicans, Monoicus, lateralis, pedunculis monofloris, 1-2-natis. *Bacca* sub-rotunda, 1-pollicaris, rubra, lævis, 5-ocularis, polysperma. *Semina* pauca, oblonga, obtusa, compressa. De *glandulis* ad basim foliorum non adverti.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Vitis alba. Rumph. Amb. l. 9. c. 65. tab. 166. fig. 1. Bryonia foliis sub-rotundis, angulosis. Burm. Zeyl. pag. 49. tab. 19. fig. 2.

† Sp. 4. BRYONIA COCHINCHINENSIS. α Cay Qua qua

Differ. spec. Bryon. *foliis* 5-angulatis, asperis: *baccis* 3-ocularibus, decagonis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, mediocris, 4-sulcatus, ramosus, scandens, cirrhosus. *Folia* cordata, quinque-angulata, denticulata, aspera, alterna, petiolata. *Flos* albus, Monoicus, magnus, axillaris, solitarius, pedunculis longis. *Calyx* 1-phyllus, tubo inferius cylindrico, superius ovato, dilatato: limbo 5-fido, laciniis linearibus. *Corolla* sub-rotata, 5-partita, ori calycis inhærens: laciniis ovato-oblongis. *Filamenta* 3, brevia, medio tubo calycis insistentia. *Anthera* 1, magna, oblongo-ovata, tribus filamentis in formam tripodis imposita. Floris Fœminei *Calyx*, & *Corolla* ut Mascu-

culi. *Germen* inferum ovato-oblongum, polyfulcum. *Stylus* filiformis, tubo brevior. *Stigma* oblongum, trigonum, apice trifidum. *Bacca* ovata, utrinque sub-acuta, 10-angulata, 3-ocularis, polysperma, rubra, lævis, mediocris. *Semina* oblongo-ovata, compressa, lævia.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, ad sepēs scandens.

Observ. A Bryoniâ profecto differt. Sed cui alteri generi melius adaptabitur, si novum statuere non liceat? Habitu quidem affinis est Bytoniæ Scabrellæ. Lin. Jun. suppl. pl. pag. 424.

+ GENUS L. MURICIA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. exterior spatha inflata, obtusa, 1-flora, magna.

Perianthium 5-partitum: laciniis subulatis, striatis, coloratis, patentibus, æqualibus.

Cor. Campanulata, petala 5, ovato-lanceolata, nervosa, patentia.

Stam. Filamenta 3, brevia, crassa, trigona: basi dilatata inter se coherentia. Antheræ 3, quarum 2 bilobæ, lobis divaricatis, ad basim auritis: tertia simplex: omnes ex lineâ fariniferâ extrorsum filamentis adnatæ, invicem distinctæ.

* *Feminei flores* in eadem plantâ, sparsi.

Cal. ut Masculi.

Cor. ut Masculi.

Pist. *Germen* oblongo-ovatum, villosum, medium inter spatham, & perianthium. *Stylus* teres, crassus, æqualis staminibus, apice subtrifidus. *Stigmata* 3, sagittata, horizontalia.

Peric. *Bacca* magna, ovata, muricata, 1-ocularis, polysperma.

Sem. multa, orbiculata, magna, reticulata, margine tuberculosa.

Nom. *Muricia* a baccâ muricatâ, purpureâ.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Filam. 3.

Fœm. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Stylus sub-integer.

Bacca 1-ocularis: seminibus orbiculatis, tuberculosis.

Sp. I. MURICIA COCHINCHINENSIS. α Cây gộc: Mỏc biêt tu. β Mỏ piê .sub.

Differ. spec. Mur. foliis 5-lobis, glabris, denticulatis: baccis ovatis, muricatis: caule scandente.

Hab. Frutex magnus, caule lignoso, crasso, multiplici, scandente cirrhis solitariis. Folia 5-lobata, lobis tribus superioribus acuminatis,

MONOECIA. SYNGENESIA: 2597

tis, binis inferioribus sub-obtusis, brevibus, denticulata, venosa, glabra, petiolata; alterna. *Flos* lateralis, solitarius, pallidè luteus, pedunculo longo. *Bacca* intus, & extra rubro-purpurea, sub-carnosa, seminibus nidulantibus, fuscis. *Perianthium* nigrum: *spatha* viridis. *Fructus* inodorus, saporis fatui. *Petioli* canaliculati, tortuosi.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ.

Usus: baccæ. Ad tingenda liba, & alia esculenta colore nitidè purpureo.

Virtus: seminum; & foliorum. Aperiens, Abstergens. Valet in obstructionibus hepatis, & lienis: tumoribus, & ulceribus malignis, aut antiquis: lumbagine. Externè prodest in procidentia uteri, & aniossum luxaturâ, aut fracturâ.

[Faint mirrored text from the reverse side of the page, including botanical names and classification details.]

Gggg

CLAS.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA.

- 1. PANDANUS. Masc. Cal. o. Cor. o. *Anthera* sessilis, linearis
Fœm. Cal. o. Cor. o. *Stigm.* 2. *Bacca* composita.
- † 2. KNEMA. Masc. Cal. o. Cor. 3-fida. *Filam.* antheris stellatis.
Fœm. Cal. sub-truncatus. Cor. 3-fida. *Stigm.* 1-Bacca 1-sperma
- † 3. COMMIA. Masc. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Anthera* multilocularis.
Fœm. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Styli* 3. *Capsf.* 3-locularis, 1-sperma.
- † 4. PHYLLAMPHORA. Masc. Cal. 4-phyllus Cor. o. *Filam.* Antherâ multiloculari.
Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. o. *Stigm.* 4-gonum. *Capsf.* 4-locularis.
- † 5. CATHETUS. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. o. *Filam.* Antheris 3.
Fœm. Cal. 6-partitus. Cor. o. *Styl.* *Stigmatibus* 3. *Capsf.* 3-locularis, 2-sperma.
- † 6. STEPHANIA. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. o. *Filam.* Antherâ coronariâ.
Fœm. Cal. 6-phyllus Cor. o. *Stigm.* sessile. *Bacca* 1-sperma.

DIANDRIA.

- 7. SALIX. Masc. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Stam.* 2, raro. 5.
Fœm. Cal. Amenti squama. Cor. o. *Stygm.* 2. *Capsf.* 2-valvis. *Sem.* papposa.
- † 8. TRIADICA. Masc. Cal. 3-fidus. Cor. o. *Filam.* planum.
Fœm. Cal. 3-fidus. Cor. o. *Styl.* *Stigm.* 3.

DIOECIA.

60599

† 9. TETRAPILUS.

3. *Bacca* 3-locularis, 1-perma.
 Masc. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida.
 Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Stigma* 2-
 fidum. *Bacca* 2-locularis.

TRIANDRIA.

10. EXGÆCARIA.

Masc. *Cal.* Amenti squama. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* ut Masculi. *Cor.* 0. *Stigmata*
 3. *Capf.* 3-cocca.

11. CATURUS.

Masc. *Cal.* 0. *Cor.* 3-fida.
 Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Styl.* 3.
Capf. 3-cocca.

† 12. EBENOXYLUM.

Masc. *Cal.* 0. *Cor.* 3-petala.
 Fœm. *Cal.* 0. *Cor.* 3-petala. *Stylus* 1.
Bacca 3-sperma.

13. PHÆNIX PALMA.

Masc. *Cal.* 3-part. *Cor.* 3-petala.
 Fœm. *Cal.* 3-part. *Cor.* 3-petala. *Pist.* 1.
Drupa 1-sperma.

TETRANDRIA.

† 14. STREBLUS.

Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 2-par-
 titus. *Bacca* 2-locularis.

PENTANDRIA.

15. PISTACIA.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* 3-fidus. *Cor.* 0. *Styli.* 3. *Dru-*
pa sicca.

16. CANNABIS.

Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 0. *Styl.* 3.
Nux.

17. SPINACIA.

Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 0. *Styli.* 4. *Sem.*
 1, calycinum.

18. ANTIDESMA.

Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0.
 Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Stigmata*
 5. *Bacca* 1-sperma.
 Gggg ii

HE-

HEXANDRIA.

19. BORASSUS PALMA. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala.
Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 3-petala. *Stigma*
3-gonum. *Drupa* 3-sperma.
- † 20. LIMACIA. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 3-petala.
Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 6-petala.
Stigm. 3. *Drupa*: nuce cochleatâ.
- † 21. PSELIMUM. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 6-petala.
Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 6. *Stigma*
4-fidum. *Drupa*: nuce armillari.
22. SMILAX. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 0.
Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 0. *Styli* 3.
Bacca supera, 3-locularis.
23. DIOSCOREA. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 0.
Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 0. *Styli* 3.
Caps. supera, 3-locularis.
24. FIBRAUREA. Masc. Cal. 0. Cor. 6-petala.
Fœm. Cal. 0. Cor. 6-petala. *Stigmata*
3. *Bacca* 3, 1-sperma.

OCTANDRIA.

25. RHODIOLA. Masc. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala.
Fœm. Cal. 4-partitus. Cor. 0. *Pist.* 4.
Caps. 4, polysperma.

ENNEANDRIA.

26. MERCURIALIS. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 0. *Stam.* 9-12.
Fœm. Cal. 3-phyllus. Cor. 0. *Styli* 2.
Caps. 2-cocca.

DECANDRIA.

27. CARICA. Masc. Cal. 5-fidus. Cor. 5-fida.
Fœm. Cal. 5-fidus. Cor. 5-partita. *Stigm.*
5. *Bacca* polysperma.

D O D E C A N D R I A.

28. EUCLEA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 15.
 Fœm. *Cal.*, & *Cor.* Masculi. *Styli* 2.

P O L Y A N D R I A.

- † 29. ABUTUA. Masc. *Cal.* vaginans Amentum. *Cor.* 0.
Stam. 20.
 Fœm. *Cal.* ut Masculi. *Cor.* 0. *Pist.* 6-8. *Glandes* totidem.
30. CYCAS PALMA. Masc. *Cal.* *Spadicis* squama imbricata.
Cor. 0. *Anthere* plulquam 100, globosæ.
 Fœm. *Spadix* filiformis. *Cor.* 0. *Pist.* 1.
Drupa ovata, 1-sperma.
- † 31. ECHINUS. Masc. *Cal.* laciniatus. *Cor.* 0. *Stam.* 30.
 Fœm. *Cal.* 5-6-fidus. *Cor.* 0. *Pist.* 2. *Capsule* 2, 1-sperma.
- † 32. STIGMAROTA. Masc. *Cal.* 4-5-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 30.
 Fœm. *Cal.* 5-6-partitus. *Cor.* 0. *Stigma* 6-fidum : *Bacca* 6-sperma.
- † 33. MALLOTUS. Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Stam.* plurima.
 Fœm. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 0. *Stigm.* 3.
Caps. 3-ocularis, 1-sperma.

M O N A D E L P H I A.

- 34 JUNIPERUS. Masc. *Ament.* *Cor.* 0. *Stam.* 3.
 Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Styli.* 3. *Bacca* calycina, 3-sperma.

P O L Y A D E L P H I A.

- † 35. HOMONOIA. Masc. *Cal.* Amenti squamæ 3. *Perianthium* 3-phyllum. *Cor.* 0. *Stam.* 200 in 20 fasciculis.
 Fœm. *Cal.* Amenti squama polyfida. *Periantb.*

rianth., & *Cor.* o. *Stigm.* 3. *Caps.* 3-
locularis: 1-sperma.

† 36. SFBIFERA.

Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stam.* 100
in 10 fasciculis.

Fœm. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Pist.* 10.
Baccæ totidem, 1-sperma.

GYNANDRIA.

37. CLUTIA

Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.

Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Sty-*
li 3. *Caps.* 3-coeca.

* *Incerti adhuc Ordinis.*

† 38. RESTIARIA.

Masc?

Fœm. *Cal.* 3-fidus, capsularis. *Cor.* o. *Sti-*
gma concavum. *Caps.* 5-nervis, 2-locu-
laris, polysperma.

MONANDRIA.

GENUS I. PANDANUS.

Char. Gen. Masc. Cal. o. Cor. o. Anthera sessilis, ramificationibus
thyrsi inferta.

Foem. Cal. o. Cor. o. Stigmata 2. Fructus compositus.
Linn. Jun. suppl. pl. pag. 64. G. 1430.

Sp. 1. PANDANUS ODORATISSIMUS. a Cay Jita. B. . . .

Differ. spec. Pand. foliis margine, dorsoque aculeatis: fructu soli-
tario.

Habitus, & notæ. Caulis fruticosus, 8-pedalis, crus crassus, ter-
res, inermis, inclinatus, anulis a foliorum casu notatus: radice
multiplici, arcuatâ, supra terram prominente: ramis paucis, tor-
tuosis, patentibus, proliferis. Folia amplexicaulia, trifariam im-
bricata, 3 pedes longa, subulata, canaliculata, margine, ac dorso
spinosa, glabra, cinereo-glaucâ, patentia. Flor. Dioicous, termina-
lis: Masculus racemis magnis, compositis, oblongis, laxis: par-
tialibus suffultis bractea candidâ, ciliato-spinosâ, foliorum simili.
Calyx, & corolla nulli. Filamentum 1, filiforme, breve: antherâ
lisiari, acutâ, biloculari, nutante. Racemus totus albus, odoratissi-
mus. Famineus flos Germinibus in globum aggregatis: calyce, co-
rollâ, & stylo nullis: stigmatibus bifido. Pericarpium bacca solita-
ria, tuberculosa, rubra, Bromeliam referens, composita ex baccu-
lis compresso-angulatis, lignoso-fibrosis, luteis, inodoris, non es-
culentis: Semine 1, oblongo, glabro, parvo. Fructus totus semi-
pedalis, nunc sub-rotundus, nunc oblongus, vel ovatus.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ: colitur etiam ad ducen-
das sepes agrorum, & viarum, ad pascendosque elephantos do-
mesticos: amat loca arenosa.

Ananâs sylvestris. Acosta Arom. apud Clus. cap. 45. pag. 285. Keura
Odorifera. Forsk. Arab. Centur. 6. pag. 172. Pandanus Verus, &
Spiritus. Rumph. Amb. l. 6. cap. 80, 81. tab. 74, 75. Frutex Indicus
fructu aggregato Conoide Kaide dictus. Ray. Hist. pl. pag. 1442.

Observ. Odor floris Masculi, qui in Cochinchinâ non magni habetur,
ut in Arabiâ, teste Forskolio, valde intensus, & persistens.
Fructus, præcipuè immaturi vis Emmenagoga, & Abortiva: non
tamen lactescens.

† Sp. 2. PANDANUS HUMILIS. a Jisa rang. . . .
Differ. spec. Pand. foliis margine, dorsoque aculeatis: fructu race-
molito: radice repente. Hab.,

Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, sub-erectus, plerumque cespitosus, radice repente. *Folia* subulata, stricta, curva, margine, ac dorso spinosa, glabra, fusco-viridia, selquipedalia, sessilia, ad apicem caulis congesta. *Flos* Dioicus, terminalis, uterque carens calyce, & corollâ: *Masculus* thyrsus oblongo, distincto bracteis partialibus, albis, brevibus, subulatis, spinulosus; *Femineus* in diversis globulos aggregatus. *Fruktus* 6-8, bipollicares, ovati, tuberculosi, rubri, duri, compositi ex bacculis angulatis, 1-permis. *Stamina*, & *Stigmata* solitaria. *Flores* inodori.

Habitat agrestis in Cochinchinâ: amat loca montana, & petrosa.

Pandanus Humilis. Rhumph. Amb. l. 6. cap. 82. tab. 76. Kada taddi? Rheed. Malab. tom. 2. fig. 6.

† Sp. 3. PANDANUS LÆVIS. α Lá buon: Lá khai.

Differ. spec. Pand. *foliis* longissimis, dorso inermibus: *fructu* solitario.

Hab. & notæ. *Frutex* caule crasso, brevi, ramoso, sparsim aculeato. *Folia* 6-pedalia, subulata, canaliculata, dorso inermia, glabra, pallida, crassiuscula, tenacissima, longè acuminata, fasciculata. *Flos* Dioicus, terminalis, calyce, & corollâ nullis: *Masculus* racemis compositis, bracteis, oblongis, lutescentibus, odoriferis. *Femineus* aggregatus. *Fruktus* ovatus, parvus, solitarius, ruber, tuberculofus, compositus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ: amat loca deserta.

Pandanus Moschatus, seu lævis. Rhumph. Amb. l. 6. c. 85. pag. 147.

Ufus. *Folia* hujus plantæ alba, & nitida, longæque durationis pulchrè aptantur ad indigenis ad erigenda dissepimenta cubiliûm intra domos.

† GENUS II. KNEMA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. nullus.

Cor. Monopetala, carnosa: tubo crasso, brevi: limbo 3-fido connivente, laciniis acutis, exterius lanosis.

Stam. Filamentum 1, breve, turbinatum. Antheræ 10-12, ovatae, biloculares, circa apicem Filamenti horizontaliter expansæ.

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. Perianthium inferum, brevissimum, sub-truncatum, persistens.

Cor. ut Masculi.

Pist. Germen sub-rotundum, pilosum. Stylus nullus. Stigma laciniatum, erectum.

Perie.

Peric. Bacca ovata, succosa, 1-sperma.
Sem. ovatum, arillatum.

Nom. (Κύμα radius rotæ) ab antheris in formam radiorum stel-
latis.

Char. Gen. Masc. Cal. 0. Cor. 3-fida. Antheræ circa filamentum stel-
latæ.

Fcem. Cal. sub-truncatus. Cor. 3-fida. Stigma 1. Bacca
supera, 1-sperma.

† Sp. 1. KNEMA CORTICOSA. a Cây Máu chó.

Differ spec. Kn. foliis lanceolatis, integerrimis, alternis: pedunculis
polyfloris, lateralibus.

Hab. Arbor magna: cortice crasso, fusco-rubro: ramis ascendentibus.
Folia lanceolata, integerrima, glabra, alterna, petiolata.

Flos uterque sub-terminalis, pedunculis polyfloris. Corolla exte-
rius fusca, interius luteo-rubra. Bacca parva, pulpâ succosâ, rubrâ.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS III. COMMIA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores*, amentis brevibus, axillaribus.

Cal. Amentum filiforme, squamis obtusis, imbricatis, astrictis. Pe-
rianthium nullum.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, breve. Anthera sub-rotunda, multilocularis.

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. Perianthium 3-phyllum, breve, inferum, persistens, foliolis acu-
tis.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Styli 3, reflexi, breves. Stigmata cras-
sifuscula.

Peric. Capsula 3-loba, 3 locularis, 1-sperma: loculis interius hiantibus.
Sem. sub-rotunda.

Nom. (Κόμμη gummi) ex abundantia humoris resinoso-gummosi, quo
hec arbor scetet.

Char. Gen. Masc. Cal. Amenti squama. Cor. 0. Filam. antherâ mul-
tiloculari.

Hhhh

Fcem.

Fam. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.* 3-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. **COMMIA COCHINCHINENSIS.** *z* Cay. Sen. gtd.
 Differ. spec. Com. *foliis* lanceolatis, integerrimis, incurvis, reflexis.
 Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis expansis. *Folia* lanceolata,
 integerrima, glabra, incurva, reflexa, alterna. *Flas* Foemineus racemis oblongis, parvis, multis, sub-terminalibus: *Masculus* amen-
 tis brevibus, axillaribus.

Habitat agrestis prope litora in Cochinchinâ.

Virtus: Gummi albi, tenacis ex arbore manantis. Emetica, Purgans, Deobstruens. Prudenter administrata valet in rebelli hydropæ, & obstructionibus.

† GENUS IV. PHYLLAMPHORA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-partitum: laciniis ovatis, coloratis, patentibus, persistentibus, in senectute reflexis.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, filiforme, calyce brevius. Anthera sub-rotunda, magna, multilocularis: vel, si velis, Antheræ 6-8, verticaliter in unum coalitæ.

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. ut *Masculi*.

Cor. nulla.

Pist. Germen superum, ovato-oblongum, 4-sulcum. *Stylus* nullus. *Stigma* 1, sub-orbiculatum, 4-gonum, 4-sulcum.

Peric. Capsula oblongo-ovata, 4-gona, tomentosa, 4-locularis, 4-valvis, polysperma.

Sem. Scobiformia, plurima.

Nom. Phyllamphoram, seu folii amphoram nominavi ob vasa illa mirabilia ex fingulis foliis pendentia.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-partitus. *Cor.* o. *Filam.* 1: Antherâ multiloculari.

Fem. Cal. 4-partitus, inferus. *Cor.* o. *Stigma* 4-sulcatum. *Caps.* 4-locularis, polysperma.

Sp. 1. **PHYLLAMPHORA MIRABILIS.** *z* Cay. Nap. am.

Differ.

Differ. spec. Phyl. *foliis* canthariferis, in petiolos decurrentibus: *spicâ* simplici, terminali.

Hab. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, simplicissimus, erectus, teres, crassus, levis. *Folia* oblonga, utrinque sub-acuta, integerrima, glabra, liaeato-venosa, fusco-viridia, alterna, decurrentia in petiolos longos, semiamplexicaules. *Flos* Dioicus, uterque terminalis, spicâ longâ, simplicissimâ, folitariâ: *calycibus* pedunculatis, rubris, crassis: capsulis parvis. *Folia* singula terminantur cirrho longo, in medio spiraleriter convoluto, inde demisso; sustinente vas quoddam, oblongum, ventricosum, labio tereti, prominente marginatum, instructum operculo ad latus annexo, quod ex suaapte naturâ liberè aperitur, & clauditur, ut ros accipiat, ac ferret. Miram opus Divini Conditoris!

Habitat loca humida, & agrestia Cochinchinæ: nec facile cicutari, & coli potest, ut ipse, & ante me Rumphius experti sumus.

Observ. Nepenthes Destillatoria (Lin. G. 1107. fy. pl. 4. pag. 45.) eadem videtur esse, sed nec classe, nec ordine cum nostrâ convenit. Burmannus (Zeyl. pag. 42. tab. 17.) eam repræsentat foliis sessilibus, & flore racemoso, sive paniculato, pedunculis subdivisis: similiter etiam Plukenetius. (tab. 237. fig. 3.), eoque habitu a nostrâ differunt, nec scire possumus, an charactere essentiali etiam differant. Rumphius, qui plantam viventem tractavit, illam exponit (Amb. l. 7. c. 61. tab. 59. fig. 2.) foliis, & flore nostræ magis similem, dissimilem vero radice repente, & ramis scandentibus.

† GENUS V. CATHETUS.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 6-phyllum: foliolis sub-rotundis, concavis, patentibus, tribus exterioribus minoribus.

Cor. nulla. Nectarium glandulis 6, sub-rotundis, 2-natis

Stam. Filamentum 1, crassum, calyce brevius. Antheræ 3, ovales; 2-loculares, ad angulum rectum filamentum infertæ.

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. Perianthium 6-partitum, inferum: laciniis sub-rotundis, concavis, patentibus.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus crassus, calyce sub-brevior. Stigmata 3, bifida: laciniis subulatis, reflexis.

Peric. Capsula compresso-rotunda, 6-loba, 3-locularis 2-sperma.

Sem. intus angulata, exterius convexa.

Hhhh ii

Nom.

Nom. (Καθετος perpendiculum) ob Antheras ad filamentum perpendiculares.

Char. Gen. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Filam. Antheris 3, normalibus.

Fœm. Cal. 6-partitus. Cor. o. Stylus stigmatibus 3. Caps. 3-locularis, 2-sperma.

† Sp. 1. CATHETUS FASCICULATA. α Chòi dục.

Differ. spec. Cath. foliis fasciculatis: floribus solitariis, axillaribus.

Hab. Erutex 3-pedalis, caule erecto, multiplici: ramis ascendentibus. Folia ovata, integerrima, plana, glabra, minuta, fasciculata. Flos uterque axillaris, solitarius, minusculus.

Habitat agrestis in collibus Cochinchinæ.

† GENUS VI. STEPHANIA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 6-phyllum: foliolis sub-acutis, patentibus, tribus alternis minoribus.

Cor. nulla. Nectarium 3-phyllum, obtusum, minusculum, corollam dicas, si velis.

Stam. Filamentum 1, calici æquale, apice crassum, truncatum. Anthera 1, circularis, caput filamenti coronans.

* *Fœminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. ut Masculi.

Cor. nulla.

Pist. Germen ovatum, superum. Stylus nullus. Stigma longiusculum, erectum.

Peric. Bacca ovata, 1-sperma, minima.

Nom. (Στεφαννί corona) ab Antherâ in formam coronæ aureæ caput filamenti circumdante.

Char. Gen. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Filam. Antherâ circulari.

Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. o. Stigma integrum. Bacca 1-sperma.

† Sp. 1. STEPHANIA ROTUNDA. α Củ môt: Tủ nhien.

Differ. spec. Steph. caule volubili: foliis peltatis, sub-rotundis: umbellis compositis.

Hab.

DIOECIA. MONANDRIA.

609

Hab. *Caulis* fruticosus, volubilis, sub-simplex, longissimus, teres, inermis, glaber. *Radix* tuber magnum, sub-rotundum, rugosum, fuscum, radiculâ filiformi, verticali, longâ, terram perforans, ipsum foris eminens. *Folia* peltata, trigono-rotunda, acuta, repanda, glabra, alterna, petiolata. *Flos* umbellis compositis, lateralibus: nectario luteo. Tuber amarissimum, formâ, & virtute Aristolochiæ rotundæ æmulum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 2. STEPHANIA LONGA. a Deej moi thon.

Differ. spec. Steph. caule volubili: *foliis* peltatis, oblongis: *capitulis* lateralibus.

Hab. *Caulis* fruticosus, volubilis, tenuis, inermis, ramosus. *Folia* peltata, trigono-oblonga, integerrima, glabra. *Flos* albicans, lateralibus, sessilibus, capitulis minutis. *Radix* longissima, filiformis, repens, radiculis paucis, invicem distantibus.

Habitat sepes arundinum in Cochinchinâ.

DIANDRIA.

GENUS VII. SALIX.

Char. Gen. Masc. *Amenti* squamæ. *Cor.* o. *Glandula* baseos nectarifera.

Fœm. *Amenti* squamæ. *Cor.* o. *Stylus* 2-fidus. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis. *Sem.* papposa. *Lin.* sy. pl. G. 1201.

Sp. 1. SALIX BABILONICA. § Liêu xú. a Cáy Liêu lá tle.

Differ. spec. Sal. *foliis* ferratis, glabris, lineari-lanceolatis: *ramis* pendulis. *Lin.* sp. 10.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, caule, & ramis incompositis: *flagellis* longis, tenuibus, pendulis. *Folia* lineari-lanceolata, minutè ferrata, utrinque glabra, alterna, petiolis brevibus. *Flos* Dioicus, amentis oblongis axillaribus, parvis, squamis ovatis, concavis, pilosis, 1-floris. *Filamenta* 2, squamâ amenti longiora: *glandulis* binis, ovatis, erectis, basi adnatis. *Faminei* floris amentum simile. *Stylus* 2-fidus. *Capsula* 1-locularis, polysperma.

Habitat frequens in Chinâ: colitur rarius in Cochinchinâ.

Hortus Cliffort. pag. 454. *Salix* Orientalis, flagellis deorsum pulchrè pendentibus. *Tournef. Inst. Cor.* pag. 41. Fortasè specie non differt a *Salice Japonicâ*. *Kœmpf. Amoen.* pag. 908. *Thunb. Jap.* pag. 24. Quæ Japonicè vulgo dicitur *Aujaki*: ramosque producit flexuosos, non pendulos.

Virtus.

Virtus. In Medicinâ Sinenſi ejus flores, & teneriores ramuli cenſentur prodeſſe contra phthiſim, & febres lentas; externè contra ulcera, puſtulas, odontalgiam. Quæ ipſe non probavit.

† GENUS VIII. TRIADICA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Amentum filiforme, nudum, longum, diſtinctum tuberculis polyſloris. Perianthium proprium 3-fidum, minimum, campanulatum. Cor. nulla.

Stam. Filamenta 2, plana, breviffima. Antheræ planiufculæ, 2-lobæ, lobis lateraliter dehiſcentibus.

* *Feminei flores* in aliâ plantâ.

Cal. Amentum, & Perianthium ut *Masculi*.

Cor. nulla.

Piſt. Germen ſub-rotundum, ſuperum. Stylus craſſus, brevis. Stigmata 3, oblonga, erecta.

Peric. Bacca ſub-rotunda, 3-loba, exſucca, 3-locularis, 1-ſperma.

Sem. ſub-rotunda.

Nom. (*Τριανδος* ternarius) a numero ternario, quo pleræque floris partes diſtinguntur.

Char. Gen. Masc. Cal. 3-fidus. Cor. o.

Fœm. Cal. 3-fidus. Cor. o. Stigm. 3. Bacca 3-locularis, 1-ſperma.

- † Sp. 1. TRIADICA COCHINCHINENSIS. & Cay Soi tiá: Cay Cha dam.
Differ. Spec. Tri. *foliis* ovatis, integerrimis, obtuſis.
Hab. *Arbor* magna, ramis patentibus. *Folia* ovata, integerrima, glabra, alterna: *petioliſ* longis, rubris. *Flos* ſub-terminalis. *Bacca* parva, fuſco-ſubviridis.
Habitat in ſylvis Cochinchinæ.

- † Sp. 2. TRIADICA SINENSIS. & Ƴ̄ Khau mō.

Differ. Spec. Tri. *foliis* ſub-rotundis, integerrimis, acuminatis.

- Hab. & note. *Arbor* magna, ramis patentibus. *Folia* ſub-rotunda, acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata. *Flos* Dioicus, amentis filiformibus, ſubterminalibus. *Masculi calyx* 4-fidus, erectus: *corolla* nulla: *filamenta* 2, calyci equalia: *antheræ* lobis binis, ſub-rotundis. *Feminei calyx* 4-phyllus, acutus: *corolla* nulla:

la : *Stigma* 3-fidum. *Bacca* 3-locularis, 1-sperma. *Semina* sub-rotunda, arillata.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

+ GENUS IX. TETRAPILUS.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium campanulatum, 4-fidum, minimum, persistens: laciniis acutis.

Cor. campanulata: tubo brevi, 4-fulco: limbo 4-fido, laciniis plicato-cucullatis.

Stam. Filamenta 2, crassa, brevia. Antheræ ovatae, 2-loculares; stantes.

* *Feminei flores* in aliâ plantâ.

Cal. ut Masc.

Cor. ut Masc.

Pist. Germen ovatum. Stylus crassus, brevissimus. *Stigma* crassiusculum; 2-fidum.

Peric. *Bacca* ovata, parva, 2-locularis, polysperma.

Sem. sub-rotunda, pauca.

Nom. (Πῆλος cucullus) a 4 cucullis laciniarum Corollæ.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-fidus Cor. 4-fida.

Fœm. Cal. 4-fidus Cor. 4-fida. *Stigma* 2-fidum. *Bacca* 2-locularis, polysperma.

† Sp. 1. TETRAPILUS BRACHIATUS. a Cay Cau.

Differ. spec. Tetr. ramis brachiatis: foliis ovato-lanceolatis: racemis axillaribus.

Hab. *Arbuseula* 5-pedalis: ramis patentibus, brachiatis. Folia ovato-lanceolata, sub-ferrata, incurva, glabra, opposita. Flos albus, parvus, racemis brevibus, axillaribus.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

TRIANDRIA.

GENUS X. EXCÆCARIA.

Char. Gen. Masc. *Amentum* nudum. *Cal.* o. *Cor.* o.

Fœm. *Amentum* nudum. *Cal.* o. *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.* 3-cocca. Lin. sy. pl. G. 1205.

† S. I. EXCÆCARIA COCHINCHINENSIS. u. Cày Lico do. A. . . .
Differ. spec. Exc. *foliis* bicoloribus, nitidis: *squamis* Amenti polyfloris.

Hab., & notæ. *Frutex* arboreus, 8-pedalis: *caule*, & *ramis* impositis, patentibus, reclinatis. *Folia* lanceolata, leviter serrata, petiolata, opposita, sparſaque, paginâ superiore obscuro-viridi, inferiore ruberrimâ, utrâque nitidâ. *Flos* Dioicus, *squamis* amenti polyfloris, imbricatis, sub-terminalibus: *calyce*, & *corollâ* nullis. *Masculi* Filamenta 3. *Fœminei* stigmata 3, longa, subulata, reflexa. *Capsula* 3-loba, sub-carnosa; rubra, parva; 3-locularis; 3-valvis, 1-sperma: *seminibus* ovatis, lævibus. Tota planta manat lacte glutinoso. Excœcare non audivi: nec Agal'ochum, quamvis spurium, in illâ inveniri. Pollet virtute Astringente, & Agglutinante.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, ubi colitur propter foliorum rubrorum pulchritudinem.

Arbor Excœcans, prout a Rumphio describitur, & pingitur (Amb. l. 3. cap. 36. tab. 79, 80) videtur specie differre.

GENUS XI. CATURUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* o. *Cor.* 3-fida.

Fœm. *Cal.* 3-partitus *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.* 3-cocca. Lin. sy. pl. G. 1206.

† Sp. I. CATURUS SCANDENS. u. Cày Di gici. . . .
Differ. spec. Cat. *spicis* axillaribus, erectis: *foliis* oblongis, sub-serratis: *caule* scandente.

Hab., & notæ. *Frutex* inermis, *caule* longo, scandente, acirrho, ramoso. *Folia* oblonga, acuminata, sub-serrata, incurva, venosa, glabra, alterna. *Flos* albus, minusculus, *spicis* densis, brevibus, axillaribus, bracteis subulatis, parvis. *Flos Masculus* *Calyce* nullo. *Corolla* petala 3, ovata, concava, minima. *Filamenta* 3, petalis longiora, cum ipsis elasticè desiliencia. *Anthera* sub-rotundæ. *Fœmineum* florem non vidi.

Habi-

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS XII. EBENOXYLUM.

Char. Gen. Masc. Cal. 6. Cor. 3-petala.

Fœm. Cal. 6. Cor. 3-petala. Nectarium stellatum. Stylus
1. Bacca 3-sperma.

† Sp. 1. EBENOXYLUM VERUM. a Cay Mun: Ô mouc. ß Ū mûen mô.
Differ. spec. Eb. foliis lanceolatis, integerrimis, sparsis: pedunculis
polyfloris, terminalibus.

Hab., & notæ. Arbor alta, ramis ascendentibus: cortice scabro, viridi-fusco: ligni alburno crasso, gravi, candido, æquali: corde nigerrimo, gravissimo, æqualissimo. Folia lanceolata, latiuscula, integerrima, glabra, nitida, fusco-virentia, parva, plana, dura, petiolata, sparsa. Flos albus, pedunculis polyfloris, terminalibus. Calyx nullus. Corolla petala 3, longiuscula, acuta, incurva, sub-patentia. Stylus 1, brevis. Bacca parva, rubro-lutea, ovata, sub-acuta, glabra, 1-locularis, 3-sperma: seminibus oblongis, angulatis.

Habitat vastas sylvas Cochinchinæ, maximè prope confinia Cambodiæ ad 11 gradum latitudinis Borealis, ubi has arbores iterato vidi, sed tunc minus cogitans de Botanicâ flores non collégi.

Ebenus: Caju Arang. Rumph. Amb. 1. 4. cap. 1. tab. 1. Aublet. Guian. tom. 2. pag. 141. Ubi referens plantas herbarii Amboinensis, quæ simul in insulâ Franciæ nascuntur, inter eas numerat Ebenum nigram, seu veram, quam dicit esse Dioicam, cum Rumphius tacuisset.

Observ. Cum antea in Cochinchinâ flores Ebenoxyli invisos præterissem, posteaque tam ibi, quam in Africâ Orientali quæstos obtinere non potuissem, veridico Authori, & oculari testi Rumphio debui fidere; ex eoque excèpi notas Genericas hîc expositas, & quia de numero staminum non clarè loquitur, suspicatus sum ea esse tria, donec certiora habeamus. Linnaeus Junior (suppl. pl. pag. 440) suadentibus Königio, & Thunbergio existimat Verum lignum Ebenum speciem esse Diospyri, quam ibi describit sub nomine Diospyri Ebeni. Ab istâ descriptione non multum abhorret Diospyros nostra Decandra (supra Clas. 8. G. 3. sp. 4.) Quæ eadem est Hebenaster Lohu. Rumph. Amb. 1. 4. cap. 5. tab. 6.; sed Diospyros, quamvis habeat venas, & aliquando etiam cor nigrum, pro Ebena vero non habetur tam ab Europæis, quam ab indigenis. In Cochinchinâ aliæ inveniuntur arbores, quarum lignum similiter ex naturâ suâ nigrum est; aliæ referuntur a Rumphio: sed Ebenoxylum non sunt.

Ufus. Nigredine, & nitore excellit in scriniis, & minoribus operibus, præsertim, quando ebure, vel margaritarum conchis discernitur.
 Virt. ligni in decocto. Attenuans, Mundificans, Diaphoretica. Prodest maximè in Rheumatismo, & doloribus vagis. Vim Guajaci æmulam in illo expertus est Græmnius, apud Burm. Zeyl. pag. 91.
 Quam simul propriâ experientiâ comprobavi.

GENUS. XIII. PHŒNIX PALMA.

Char. Gen. Masc. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Stam. 3.
 Fcem. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Pist. 1. Drupa ovata. Lin. fy. pl. G. 1339.

† Sp. 1. PHŒNIX PUSILLA. α Cay Cha la.

Differ. spec. Phœn. floribus hexandris: caule humili.

Hab., & notæ. Palma caule 2-pedali, crasso, scabro. Frondes 6-pedales, inermes, pinnatæ, reclinatæ: foliis longis, subulatis, plicatis, lævibus. Flos Dioicus: spathâ universali, polyvalvi: spadice erecto, brevi, corymbofo. Calyx utriusque 3-partitus, brevissimus. Corolla petala 3, ovato-oblonga, curva, patentia. Masculi Filamenta nulla. Anthera 6, oblongæ, corollæ æquales. Faminei stylus brevis: Stigmate simplici. Drupa ovata, 4 lineas longa, carnosa, nigra, lævis, dulcis: nucleo simplici oblongo, solido, corneo: hinc fulco longitudinali, inde parvo circulo notato.

Habitat agrestis in montibus *Cen mit*, 6 leucis distantibus a metropoli Cochinchinæ *Huacá*. Amat loca petrosa prope rivos.

Palma Dactylifera, minor, humilis, sylvestris: fructu minore. Burm. Zeyl. pag. 183. Herm. Parad. Bat. pag. 361. Kämpf. Amæn. Exot. pag. 667.

TETRANDRIA.

† GENUS XIV. STREBLUS.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Perianthium 4-phyllum: foliolis ovatis, concavis, patentibus.
 Cor. nulla.

Stam. Filamenta 4, capillaria, flexuosa, calyce longiora. Anthera biloculares, sub-rotundæ.

* Faminei flores in distinctâ plantâ.

Cal. ut Masculi, persistens.

Cor.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum, superum. Stylus longus, profundè bipartitus. Stigmata simplicia.

Peric. Bacca sub-rotunda, biloba, 2-locularis, 1-sperma.

Sem. Ovata, folitaria.

Nom. (Στρεβλος tortuosus) ab arboris ramis nimis distortis.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o.

Fœm. Cal. 4-phyllus Cor. o. Stylus 2-partitus. Bacca 2-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. STREBLUS ASPER. α Cây Đáo dũi.

Differ. spec. Streb. foliis ovatis, asperis: floribus sparsis.

Hab. Arbor magna: ramis valde tortuosis, patentibus: ramulis brevissimis. Folia ovata, integerrima, aspera, alterna. Flos Masculus capitulis multis, parvis, pedunculatis, sparsis. Fœmineus pedunculis, 1-floris folitariis, sparsis.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

† Sp. 2. STREBLUS CORDATUS. β Tlong Xú.

Differ. spec. Streb. foliis cordatis, ferratis, nervosis.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: ramis patentibus. Folia cordata; acuta, ferrata, nervosa, alterna. Flos Dioicus. Masculus racemis simplicibus, conicis, lateralibus, parvis, multis. Calyx 4-phyllus, patens, foliolis ovatis, sub-acutis, concavis. Cor. nulla. Filamenta 4, planiuscula, calyce longiora. Antheræ cochleatæ, biloculares. Fœmineum florem non invêni.

Habitat circa Cantonem Sinarum.

PENTANDRIA.

GENUS XV. PISTACIA.

Char. Gen. Masc. Ament. Cal. 5-fidus. Cor. o.

Fœm. distincta. Cal. 3-fidus. Cor. o. Styli 3. Drupa 1-sperma. Lin. syst. pl. G. 1212.

† Sp. 1. PISTACIA OLEOSA. α Cây Dầu Trùng.

Differ. spec. Pist. foliis incomptè pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis.

Hab., & notæ. Arbor supra mediocrem, ramis obliquis. Folia sæpe cum impari, sæpe etiam abruptè pinnata, 2-3-juga: foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis, sæpius oppositis, interdum sparsis,

glabris, latè virentibus, petiolis brevibus. *Flos* uterque lateralis: *Masculus* amentis filiformibus: *calyce* 5-partito: *corollâ* nullâ: *staminibus* 5. *Femineus* pedunculis polyfloris. *Drupa* sub-rotunda, semipollicaris, scabra, lutea, succosa: *nuce* lævi, 1-loculari.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Cussambium. Rumph. Amb. l. 1. cap. 47. tab. 57. Pistacia Itsonoki (Kœmpf. Hist. Jap. pag. 101. & Amæn. Exot. pag. 812.) ex cujus nucibus ibi dicitur multum oleum extrahi ad varios usus idoneum, an eadem est arbor?

Ufus. Druparum nuclei redundant oleo flavo, tenui, odoro, sub-amaro, quod diu servatum crassescit quidem, sed non rancescit, nec suavitatem nativi odoris amittit; ideo vel eo simplici unguent capita indigenæ, vel alia unguenta aromatica componunt. Internè sumptum est etiam gratum, & salubre. Quamvis hæc arbor sit Terrebintho similis, nunquam audiivi resinam ex eâ fluere, vel oleum tenax fieri.

GENUS XVI. CANNABIS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 1-phyllus, integer, latere hians. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* 2-valvis, intra calycem clausum. Lin. Sy. pl. G. 1220.

Sp. 1. CANNABIS SATIVA. 馬 草 烟 : Chû tsào.

Differ. spec. Can. *foliis* digitatis. Lin. sp. 1.

Hab. & notæ. *Caulis* annuus, 6-pedalis, erectus, sub-quadrangus, pallidus, simplex, parum ramosus. *Folia* digitata, sub-quinata, foliolis lanceolatis, ferratis, subtus pubescentibus, inæqualibus: *petiolis* communibus longis, sparsis. *Flos* Dioicus, apetalus, lateralis, & terminalis: *pedunculis* polyfloris.

Habitat culta in variis locis imperii Sinensis.

Gmel. Sibir. 3. pag. 104. Bangué. Garc. Arom. l. 2. c. 25. Cannabis Indica. Rumph. Amb. l. 8. c. 34. tab. 77.

Ufus. Ex cortice caulis diducuntur fila pro texendis telis, & torquendis funibus: non ramen abundanter, ut in Europâ. Folia cum Tabaco mixta, vel aliter præparata fictam quamdam lætitiâ, potius stuporem, & temulentiam afferunt, si eorum fumus ore excipiatur.

GENUS XVII. SPINACIA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Styli* 4. *Sem.* 1, intra ealycem induratum. Lin. sy. pl. G. 1218.

Sp. I. SPINACIA OLERACEA. ♀ . . .

Differ. spec. Spin. *fructibus* sessilibus. Lin. sp. I.

Hab. , & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, sub-erectus, inanis, lævis, ramosus. *Folia* hastato-sinuata, glabra, sparsa, petiolis longis. *Flos* Dioicus, apetalus: *Masculus* spicis terminalibus, staminibus 5: *Fœmineus* lateralis, sub-terminalis, glomeratus, sessilis, *Stylis* 4, fructibus spinosis.

Habitat culta, & vulgaris Cantone Sinarum.

Hortus Cliffort. pag. 457. Matth. in Diosc. l. 2. c. 112. fig. ibi.

Ufus. Esculentus. Spinaciæ proximus est habitu, & sapore Convolvulus Repens, olus in Indiâ frequentissimum, flore diversum.

GENUS XVIII. ANTIDESMA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Anthera* bifidæ.

Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stigmata* 5. *Bacca* cylindrica, 1-sperma. Lin. sy. pl. G. 1216.

† Sp. I. ANTIDESMA SCANDENS. ♀ U chad lum.

Differ. spec. Ant. *foliis* palmatis, ferratis: *caule* scandente.

Hab. , & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, scandens, ramosus, acirrhus, inermis. *Folia* palmata, ferrata, glabra, petiolata, sparsa. *Flos* Masculus *calyce* 5-phylo: *corollâ* nullâ: *staminibus* 5, brevibus: *antheris* erectis, apice hiantibus. *Florem* Fœmineum non vidi. Antidesmæ adjudicavi tum ob Antheras hiantes, tum, quia Genus est Indianum, & flos Masculus apprimè convenit.

Habitat spontanea prope Cantonem Sinarum.

HEXANDRIA.

GENUS XIX. BORASSUS PALMA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* . . *Cor.* 3-partita. *Stam.* 6.

Fœm. *Cal.* . . *Cor.* 3-partita. *Styli* 3. *Drupa* 3-sperma. Lin. sy. pl. G. 1336.

Sp. I.

Sp. 1. BORASSUS FLABELLIFORMIS. γ Murum.

Differ. spec. Bor. *frondibus* palmatis, plicatis, cucullatis: *stipitibus* ferratis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Palma* magna, altitudine Coco Nuciferæ æqualis, crassitie maior, basi, & apice turgida, medio caule æqualis, teres. *Fronde*s flabelliformes, magnæ, in orbem radiatæ, ad centrum plicatæ, ad peripheriam liberæ, sub-planæ: *foliis* sub-acutis, superioribus longioribus: *stipitibus* longis, crassis, excavatis, ad utrumque marginem dentato-spinosis. *Flos* Dioicus. *Spadix* utriusque simplicissimus, teres, longus, squamis 1-floris. *Calyx* uterque 6-phyllus, obtusissimus, imbricatus. *Corolla* utraque petala 3, obtusa, concava. *Masculi Stamina* 6. *Feminei Styli* 3. *Drupa* ovata, magna, Coco fere æqualis, sub-compressa, lævis, fusco-lutea, 3-cocca: *cortice* communi carnosio-fibroso, succulento, odoro, dulci, eduli, crasso. *Nuces* 3, ovo anserino æquales, & similis formæ: putamine osseo: medullâ albâ, sapidâ dum tenerâ: limphâ purissimâ cavitatem explente.

Habitat tam agrestis, quam culta in orâ Orientali Africæ, puto quod nascatur etiam in sylvis Cochinchinæ, sed ibi mihi non obvia.

Ampana, & Carimpana. Rheed. Malab. p. 1. pag. 11. 13. tab. 9, 10. Lontarus Domestica. Rumph. Amb. l. 1. cap. 9. tab. 10. Palma Indica Tal, & Talghala fructu carnosio, dulci, & eduli, putamine incluso. Burm. Zeyl. pag. 181.

Usus. Ex hac palmâ, præcissis junioribus spadicebus sæmineis, manat liquor, ex quo ab Indianis fit vinum *sura* dictum, & saccharum *Jagara*. Fructus tam medulla alba, quam cortex extimus flavescens esculentis sunt, & sapidi quandiu non senescunt.

† Sp. 2. BORASSUS GOMUTUS. α Cay Duac.

Differ. spec. Bor. *frondibus* pinnatis, sub-inermibus: *foliis* subulatis, oppositis: *spadice* longissimo, ramoso, pendulo.

Hab., & notæ. *Palma* altitudine mediocris, crassitie magna: *caule* recto, æquali, scabro, hirsuto. *Fronde*s longissimæ, pinnatæ: *stipitibus* teretibus, crassis, sub-inermibus, longis: *foliis* lanceolato-linearibus, basi simpliciter plicatis, oppositis, distantibus, fusco-virentibus. *Flos* pallidus, Dioicus: *spadicibus* lateralibus, pendulis, ramosis: *ramis* singulis 4 pedes longis, filiformibus: floribus, & fructibus sessilibus. *Calyx* 6-phyllus, obtusus, imbricatus. *Corolla* petala 3, sub-acuta. concava, patentia. *Stamina* multa. *Drupa* sessipollicaris, trigono-rotunda, luteo-fusca, glabra, continens 3 *nucēs*, compresso-ovatas, sub-angulatas, putamine ligneo, tenui: *nucleis* ejusdem formæ, solidis, cartilagineis, albis, in juventute esculentis, in senectute corneis. *Spatha* universalis, lanceolata, trivalvis. Habi-

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Palma Indica vinaria, Sagerus, sive Gomutus. Rumph. Amb. 1. 1. cap. 12. tab. 13.

Ufus. Superior hujus palmæ truncus, præcipuè ad frondium infertionem, emittit abundanter pilos longos, seu potius fila tenacissima, nigra, rufaque, ex quibus torquentur rudentes, & funes navales, longissimæ durationis, etiam ad sustinendas maiores anchoras, quamvis sub-aquâ, vel terrâ serventur. Ex spadice secto elicitur quoque vinum, & saccharum. Medulla trunci præbet incolis alimentum simile panis *sagu*. Teneri drupæ nuclei saccharo conditi ita sapidi redduntur, ut in Cochinchinâ a primariis Magnatibus expetantur. At drupæ cortex extimus succosus venenatam possidet qualitatem, sique imprudenter tangatur, intolerabilem causat pruritum, doloresque vehementes, ac diurnos, nec faciliè amovendos.

† Sp. 3. BORASSUS CAUDATA. α Cây Duối chuyết.

Differ. spec. Bor. *frondibus* pinnatis, inermibus: *foliis* cuneiformibus, præmorsis.

Hab., & notæ. Palma tenuis, caule recto, 8-pedali, 8 lineas crasso, circulis nodosis approximatis. *Fronde*s oblongæ, impari-pinnatæ: *stipitibus* inermibus: *foliis* cuneiformibus: sub-plicatis, denticulato-præmorsis, caudatis, apice difformibus; nunc rotundatis, nunc obliquè truncatis, interdum lanceolatis, polylobis. *Flos* Dioicus, spadice simplici, longo, erecto, laterali. *Masculi calyx* 3-phyllus: *Feminei* 6-phyllus, foliolis obtusis, imbricatis. *Corolla* utriusque petala 3, ovata, incurva. *Filamenta* 15-30, breviter: *Antheris* oblongis. *Stigma* sessile, magnum, 3-gonum. *Drupa* subrotunda, semipollicaris, 3-sperma: nuculis ovatis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Pinanga Saxatilis, Oryzæ-formis (Rumph. Amb. 1. 1. pag. 42. tab. 7.) nostræ satis conformis est caule, & frondibus. Sed Authoris descriptio non est completa: in figurâ vero spadix est ramosus, foliola sessilia, nec caudata, quibus a nostrâ differt.

† Sp. 4. BORASSUS TUNICATA. δ Tarfulim.

Differ. spec. Bor. *frondibus* palmatis, plicatis, inermibus: *Druparum* cortice multiplici.

Hab., & notæ. Palma altissima, caule recto, æquali, crasso. *Fronde*s in orbem palmatæ, magnæ: laciniis subulatis, plicatis: *stipitibus* inermibus. *Drupa* sub-rotunda, magna, 3-sperma: cortice communi crasso, succoso, lævi, fusco-purpureo, multiplici, squamis 8-10 interiores circumdantibus, facile separabilibus. *Nuces* 3, ovatæ, putamine osseo: medullâ albâ, esculentâ Coci Nuciferæ simil.

Habitat

Habitat in India ad oras regnorum Decan, & Guzerate.
 Obs. Flores non vidi: sed ex relatu ocularium testium retuli.

GENUS XX. LIMACIA.

Descriptio Naturalis.

- * *Masculi flores* sub-terminales, congesti.
- Cal. Perianthium 6-phyllum, breve: foliolis acutis, alternis minoribus, omnibus in triangulum horizontaliter dispositis.
- Cor. Petala 3, triangularia, sub-erecta, calyce longiora.
- Nectarium 6-phyllum, calyci æquale: foliolis sub-rotundis, concavis, carnofis.
- Stam. Filamenta 6, brevissima, totidem foliolis nectarii infidentia, simul in triangulum ordinata. Antheræ biloculares, sub-rotundæ.
- * *Feminei flores* axillares, 2-nati, in distinctâ plantâ.
- Cal. ut Masculi.
- Cor. Petala 6, sub-rotunda, curva, inæqualia.
- Nectarium 6-phyllum, calyci æquale: foliolis turbinatis, conniventibus.
- Pist. Germen sub-trigonum, superum. Stylus nullus. Stigmata 3, polyfida; patentia.
- Peric. Drupa carnofa, sub-reniformis, 1-sperma.
- Sem. Nux in helicem sulcata: nucleo simplici.
- Nom. a formâ nucis limacis cochleæ similis.

Char. Gen. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 3-petala.

Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. 6-petala. Stigm. 3. Drupa reniformis, cochleata.

† Sp. 1. LIMACIA SCANDENS. α. Cay M^e g^a.

Differ. Spec. Lim. *foliis* ovato-oblongis, acuminatis, integerrimis & *caule* scandente.

Hab. *Caulis* fruticosus, scandens, acirrhus, longus, ramosissimus.

Folia ovato-oblonga, acuminata, integerrima, glabra, alterna. *Flos* uterque luteo-viridis. *Drupa* parva, glabra, acida, esculenta.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS XXI. PSELIUM.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores* : racemis brevibus, sub-divisis.

Cal. Perianthium 6-phyllum : foliolis acutis, concavis, patentibus.

Cor. Petala 6, erecta, apice inflexa, calyce duplo longiora.

Stam. Filamenta 6, calyci sub-æqualia. Antheræ didymæ.

* *Fœminei flores*, in aliâ plantâ : umbellis compositis.

Cal. Perianthium 4-phyllum : foliolis ovatis, minimis, pilosissimis.

Cor. Nulla.

Pist. Germen sub-rotundum, superum. Stylus nullus. Stigma 4-fidum ; laciniis acutis, erectis.

Per. Drupa compresso-rotunda, parvula, 1-sperma.

Sem. Nux orbiculata, pertusa, armillæformis, scabra.

Nom. (Ψελλιον armilla) ob nucem armillarem.

Char. Gen. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. 6-petala.

Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stigma 4-fidum. Drupe nuce armillari.

† Sp. 1. PSELIUM HETEROPHYLLUM. *n. Deel Mōi.*

Differ. Ipec. Psel. *foliis Masc.* sub-cordatis, obrusis : *Fœm.* ovatis, acuminatis, peltatis.

Hab. *Caulis* fruticosus, volubilis, longus, tenuis, ramosus. *Folia* plantæ masculinæ sub-cordata, sub-rotunda, integerrima, glabra, alterna, petiolis tenuibus : *folia* plantæ Fœmininæ peltata, ovata, acuminata, integerrima, alterna. *Flos* utriusque axillaris. Nuculæ diameter 3-linearis. Fœminæ umbellæ partiales pedunculis brevissimis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Non recorder vidisse alibi plantam Dioicam heterophyllum.

At si in eodem individuo hermaphrodito diversa folia inveniuntur aliquando, quid mirum si occurrant in Dioicis?

GENUS XXII. SMILAX.

Char. Gen. Masc. Cal. 6-phyllus. Cor. o.

Fœm. Cal. 6-phyllus. Cor. o. *Styli* 3. *Bacca* 3-locularis.

Sem. 2. Lin. sy. pl. G. 1225.

Kkkk

Sp. 1.

† Sp. 1. SMILAX PERFOLIATA. α Kim kang mô : Tl giai.

Differ. spec. Smil. *caule* aculeato, angulato : *foliis* acutis, 5-nerviis : *stipulis* cordatis, perfoliatis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, angulatus, longus, ramosus, scandens, cirrhis binatis, longis, axillaribus : *aculeis* multis, brevibus, sparsis. *Folia* caulina sub-cordata, ramea ovata, omnia acuminata reflexo, 5-nervia, venosa, glabra, alterna, petiolata, magna, inermia : *stipulis* solitariis, cordatis, perfoliatis. *Flos* Dioicus, umbellulis axillaribus. *Stamina* 6. *Stigmata* 3, reflexa, sub-sessilia. *Bacca* parva, globosa, rubra, 3-locularis, 1-sperma. *Radix* tuber magnum, sub-rotundum, nodosum, exterius fuscum, intus pallidum : radiculis multis, simplicibus, rectis, longissimis, horizontalibus.

Habitat in collibus silvaticis Cochinchinæ.

Observ. Affinis videtur Pseudochinæ Amboinensis, nigra (Rumph. Amb. 1. 9. c. 61. pag. 439.) quæ a Linnæo æstimatur Smilax Zeylonica (sp. 3.). Nostra imprimis differt stipulis perfoliatis, & foliis 5 nerviis.

Virtus. Eandem creditur habere, ac Sarsaparilla, Mundificantem scilicet, ac Diaphoreticam : nec formâ ab hac magis differt, quam a Zeylonicâ.

Sp. 2. SMILAX CHINA. α Cây Khúc khác : Thổ phục linh. β Thủ fũ lin. Differ. spec. Smil. *caule* aculeato, teretiufculo : *foliis* inermibus, ovato-cordatis, quinque nerviis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, teres, ramosus, scandens, cirrhis binatis : *aculeis* raris, brevissimis, sparsis. *Folia* inermia, ovata, acuta, 3-nervia, glabra, alterna, petiolata, raro cordata, aut retusa : *stipulis* nullis. *Flos* Dioicus, apetalus, hexander, umbellis parvis, axillaribus. *Bacca* minuta, rotunda, rubra, 3-locularis, 1-sperma. *Radix* horizontalis, longissima serpens : tuberibus oblongis, nodoso-verrucosis, interdum ramosis, intus pallidis, vel rubescentibus, semipedalibus, sub-teretibus, sparsis.

Habitat in collibus silvaticis Cochinchinæ, & Chinæ.

Thunb. Jap. pag. 152. Fruticulus convolvaceus, spinosus, Sinicus, floribus parvis umbellatis. Pluken. Amalt. pag. 101. tab. 408. fig. 1. Virtus : radice tuberosâ. Mundificans, Diuretica, Diaphoretica. Vallet in quibuscunque doloribus vagis, veneris, aut rheumaticis.

Sp. 3. SMILAX CADUCA. α Cây Sam com.

Differ. spec. Smil. *caule* aculeato, tereti : *foliis* inermibus, ovatis, trinerviis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, teres, ad basim aculeatissimus, scan-

scandens, cirrhis binatis, procedentibus ex petioliis. *Folia* inermia, omnia lato-ovata, retusa, 3-nervia, glabra, alterna: *stipulis* nullis. *Flos* Dioicus, apetalus, hexander, trigynus: *umbellis* parvis lateralibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Mill. dict. n. 6. *Smilax aspera*, seu spinosa, latifolia, retusa, folio peripheria leni. Tourn. Inst. pag. 654 n. 3.

Sp. 4. SMILAX LANCEOLATA. α Cay Chaông chaông.

Differ. spec. Smil. *Caule* inermi: *foliis* inermibus, lanceolatis. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, inermis, teres, brevis, ramosissimus, scandens, cirrhosus. *Folia* lanceolata, integerrima, inermia, glabra, 3-nervia, alterna. *Flos* Dioicus, apetalus, hexander, lateralibus. *Radix* filiformis, longa, non tuberosa.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Hort. Cliff. pag. 459. Burm. Ind. pag. 213.

Sp. 5. SMILAX PSEUDOCHINA. α Kim kang, r.

Differ. spec. Smil. *caule* inermi, tereti: *foliis* inermibus, caulinis cordatis, ramis ovato-oblongis, 5-nerviis. Lin. sp. 13.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticulosus, longissimus, teres, tenuis, inermis, ramis paucis, scandentibus. *Folia* inermia, parva, inferiora cordata, superiora ovato-lanceolata, 3-nervia, integerrima, plana, margine reflexo. *Flos* Dioicus, hexander, apetalus, umbellis lateralibus. *Baccæ* 3-locularis, sub-globosa, rubra. *Radix* horizontalis simplex, crassa, brevis, tuberculosa, radiculis multis, longis, indivisis.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

Thunb. Jap. pag. 152. China spuria, nodosa. Bauh. Pin. pag. 297. n. 3.

Usus. *Caulis* vimineus infervit ad texendas corbes, & similia.

GENUS XXIII. DIOSCOREA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 6.

Fem. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* 6. *Styli* 3. *Capf.* 3-locularis, compressa. *Sem.* 2, membranacea. Lin. fy. pl. G. 1227.

Sp. 1. DIOSCOREA ALATA. α Khoai tia, β Yú thau.

Differ. spec. Diosc. *foliis* cordatis: *caule* alato, bulbifero. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, volubilis, multiplex, ramosus, quadrangus, angulis membranaceis prominentibus: axillis bulbiferis. *Folia* sagittato-cordata, sub-quinquennervia, acuminata, integ-

gerrima, glabra, opposita, petiolis longis. *Flos* Dioicus, apetalus, racemis brevibus, sub-terminalibus. *Calyx* 6-partitus, patens. *Stamina* 6. *Capfula* triangularis, 3-locularis, 2-sperma. *Radix* bulbosa, magna, informis, plerumque sub-ovata, sæpe oblonga, vel sub-rotunda, cavernosa, tuberculosa, aliquando bi, vel polyfida: cortice fusco, crasso, scabro; radiculis paucis circumdato: interius farinulenta, insipida, pallida, in aliis rubra, vel purpurea, aut violacea.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ, in multisque Indiæ locis.

Ubiurn Vulgare, & Ubiurn Digitatum. Rumph. Amb. 1. 7. cap. 7, 8. tab. 120, 121. Katsjil kelengu. Rheed. Malab. 7. pag. 71. tab. 38. Rhizophora Indica, sive Inhame rubra; caule alato, Scamoni foliis nervosis conjugatis. Burm. Zeyl. pag. 206.

Ufus. Radix ista bulbosa, salubris, & nutrens est vulgaris cibus in Indiâ tam indigenis, quam Europæis: his præcipuè utilissimus in longis navigationibus; facile enim servatur in multos menses hoc vegetabile incorruptum, & recens.

Observ. Quamvis hæc radix frequenter mutet varias formas, & colores, eadem tamen species censenda est. Quæ a Rumphio dicitur

Ubiurn Digitatum, quia in varios lobos finditur, in Cochinchinâ vocatur *Khoai tien*. Non raro alæ caulinae, & bulbi axillares evanescent, prout videre est in figurâ Ubiij Vulgaris Rumphiani, quamvis ipse Rumphius asserat Caulem plerumque quadragonum, ejus que latera quatuor acuta videri, ac si alata essent.

Sp. 2. DIOSCOREA OPPOSITIFOLIA. α Khoai mai: Sen daoc. β Xan yô.

Differ. spec. Diosc. foliis oppositis, ovatis, acuminatis: caule lævi. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, sub-quadragnus, volubilis, multiplex, longus, tenuis, ramosus: axillis sæpe bulbiferis. *Folia* cordata, acuminata, polynervia, glabra, opposita, petiolata. *Flos* Dioicus, racemis tenuibus, lateralibus. *Capfula* triangularis, 3-valvis, 3-locularis, 2-sperma, feminibus orbiculatis. *Radix* bulbis longis, mediocribus, congestis, interdum multifidis, sinuosis, cortice tenui, lutescente, radiculis brevibus: intus albissima, compacta, succosa, lactescens, insipida.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ, amatque loca argillacea, & petrosa.

Burm. Ind. pag. 215. Ubiurn Anguinum. Rumph. Amb. 1. 7. c. 9. tab. 122. An Dioscorea Japonica? Thunb. Jap. pag. 151.

Ufus. Dioscoreæ hujus bulbi præ cæteris a Cochinchinensibus æstimantur, saccharoque conditi lautis mensis apponuntur. In re Medicâ

cre.

creduntur prodesse contra phthisim, & alios morbos pulmonum.

† Sp. 3. DIOSCOREA EBURINA. α Khoai ngà.

Differ. spec. Diof. *foliis* cordatis, 7-nerviis, alternis: *floribus* hermaphroditis, *racemis* simplicibus, longis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, inermis, longus, volubilis: ramis, & petiolis quadragonis. *Folia* cordata, acuminata, 7-nervia, glabra, alterna. *Flos* hermaphroditus, lateralis, racemis simplicibus, longis. *Calyx* 3-phyllus, foliolis ovatis, erectis. *Corolla* petala 3, ovata, carnosa, lutea, concava, calyci sub-æqualia. *Filamenta* sub-nulla. *Antheræ* 6, sub-rotundæ, biloculares, minimæ. *Germen* inferum, oblongum, triquetrum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, oblonga, reflexa. *Capsula* oblongo-ovalis, 3-gona, angulis profundè intrantibus, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. *Semina* ovata, pauca. *Radix* verticalis, bulbus 1, vel duo, 3-pedales, teretes, æquales, sub-acuti, sub-curvi, formâ, & albedine dentibus eburinis elephantum similes: inde nomen vernaculum.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Ufus: esculentus. Dubito an sit eadem, quam Burm. vocat Cylindricam. Ind. pag. 215. Kappa Kelengu. Reed. Malab. 7. pag. 95. tab. 50.

† Sp. 4. DIOSCOREA CIRRHOSA. α Khoai leng.

Differ. spec. Diof. *foliis* ovato-lanceolatis, 3-nerviis: *floribus* hermaphroditis, triandris: *caule* cirrhoso.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, tenuis, teres, cirrhis scandens. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, 3-nervia, glabra, opposita, petiolata. *Flos* hermaphroditus, minimus, axillaris, pedunculis 3-floris. *Calyx* 6-phyllus, superus: *foliolis* ovatis, crassis, curvis, sub-clausis, persistentibus: bino ordine, interiori minore. *Corolla* nulla. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 3, oblongæ, erectæ. *Germen* oblongum, trigonum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, acuta, reflexa. *Capsula* trigono-ovata, angulis acutis, 3-locularis, 3-valvis, 2-sperma. *Semina* orbiculata, membranâ tenui arillata. *Radix* bulbus mediocris, irregularis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Capsula est omnino propria Dioscoreæ: non ita pleræque alia notæ.

Sp. 5. DIOSCOREA ACULEATA. α Khoai ló.

Differ. spec. Diof. *foliis* cordatis: *caule* aculeato, bulbifero. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, volubilis, teres, tenuis, ramosissimus: aculeis multis rectis, brevibus, sparsis. *Folia* ovata, 5-nervia,

via, glabra, alterna, petiolis longis tenuibus. *Flos* Dioicus; racemis spicatis, longis, lateralibus. *Calyx* 3-6-phyllus: foliolis acutis, brevissimis, inæqualibus, patentibus. *Corolla* petala 6, ovata, concava, sub-clausa, purpureo-fusca. *Filamenta* 6, subulata, corollæ æqualia. *Antheræ* sub-rotundæ. *Germen* triquetrum, inferum. *Capsula* 3-angularis, 3-locularis, 3-valvis, 2-sperma. *Radix* bulbosus oblongus, esculentus, intus albus, extra pallidè luteus, septus radiculis brevibus.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 214. Combilium. Rumph. Amb. l. 9. c. 13. tab. 126.

† GENUS XXIV. FIBRAUREA

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. nullus.

Cor. Petala 6, sub-rotunda, patentia, minima.

Stam. Filamenta sub-nulla. Antheræ 6, biloculares, oblongæ.

* *Femineï flores* in aliâ plantâ.

Cal. nullus.

Cor. Petala 6, sub-rotunda, concava, patentia.

Pist. Germen superum, ovatum, triplex, ad centrum invicem connexum, angulatum. Stylus. nullus. Stigmata 3, bifida.

Peric. Baccæ 3, ovatæ, sub-compressæ, læves, 1-sperma.

Sem. 1, ovatum, rugosum.

Nom. a fibris lignosis aureis, ex quibus caulis plantæ componitur.

Char. Gen. Masc. Cal. 0. Cor. 6-petala.

Fœm. Cal. 0. Cor. 6-petala. Stigmata 3. Baccæ 3, monosperma.

† Sp. 1. FIBRAUREA TINCTORIA. α Cay Vang đàng. β Tiên siên tân.

Differ. Spec. Fibr. foliis ovatis, integerrimis, alternis: racemis lateralibus.

Hab. *Caulis* fruticosus, scandens, acirrhus, ramosus, lignosus, longus, brachium crassus: constans ex fibris magnis, lentis, coloris aurei, in circulos concentricos ordinatis, foraminulis interpositis.

Folia basi ovata, apice acuta, integerrima, glabra, inæqualiter nervosa, venosa, alterna: petiolis longis, teretibus, basi turgidis.

Flos albus, minimus, racemis oblongis, lateralibus. *Bacca* parva, lutea, non edulis. Sapor plantæ amarus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Tuba flava : Daun bulan. Rumph. Amb. l. 7. c. 20. tab. 24. Abuta Rufescens, & Abuta Amara. Aublet. Guian. pag. 618, & 620. tab. 250, 251. Hæ plantæ, quamvis a nostrâ aliquantulum foliis differant, nec earum notæ integrè exponantur, suspicor, quod specie non differant.

Virtus radicis, & inferioris caulis. Resolvens, Deobstruens, Diuretica.

Ufus. Ex caulibus contusis coctione extrahitur color flavus, non admodum vividus, sed persistens, qui fundamentum sternit Curcumæ, & Carthamo, pulchrioribus quidem, minimè verò permanentibus.

OCTANDRIA.

GENUS XXV. RHODIOLA.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala.

Fœm. Cal. 4-partitus. Cor. 6. Nectaria 4. Pist. 4. Caps. 4, polypermæ. Lin. fy. pl. G. 1229.

† Sp. 1. RHODIOLA BITERNATA. x . . .

Differ. spec. Rhod. foliis biternatis, incisis : caule volubili.

Hab. & notæ. Caulis herbaceus, volubilis, teres, tenuis, sulcatus, ramulosus. Folia biternata, foliolis lanceolatis, incisis, tomentosis.

Flos albus, axillaris, Dioicus : Masculus sub-umbellatus, pedunculo communi longo : stipulis binis oppositis, corniformibus. Calyx profundè 4-partitus, laciniis binis oppositis duplo maioribus, omnibus acutis. Corolla petala 4, turbinata, æqualia, parentia.

Nectaria 4 erecta, quorum 2 breviora, conjuncta, exotica. Filamenta 8, subulata, pilosa, inæqualia, erecta, corollâ longiora.

Antheræ ovate, incumbentes. Florem Fœmineum non invèni, nec vernaculum nomen audivi, licet quæsitum.

Habitat in hortis minus cultis Cochinchinæ, non frequens.

ENNEANDRIA.

GENUS XXVI. MERCURIALIS.

Char. Gen. Masc. Cal. 3-partitus. Cor. 6. Stam. 9, sive 12. Antheræ globosæ, didymæ.

Fœm. Cal. 3-partitus. Cor. 6. Styli 2. Caps. dicocca, 2-locularis, 1-sperma. Lin. fy. pl. G. 1230.

† Sp. 1.

- † Sp. 1. MERCURIALIS INDICA. α Rau mai; Luc mai.
 Differ. spec. Merc. caule fruticoso; ramofo: foliis lanceolatis, læ-
 vibus: floribus 3-gynis.
 Hab., & notæ. Caulis fruticosus, rectus, 6-pedalis: ramis teretibus,
 ascendentibus. Folia lanceolata, serrata, glabra, nitida, alterna.
 Flos Dioicus, apetalus. Masculi Calyx 3-partitus. Stamina nume-
 rus inconstans, sæpe 15 circiter: Antheris bilocularibus, sub-rotun-
 dis: in aliquibus, servato eodem habitu, stamina 50 fere nume-
 rantur. Fœminei Calyx idem, corolla nulla. Stigmata 3. Capsula
 supera, 3-loba, 3-locularis, 1-sperma. Flos lateralis.
 Habitat tam culta, quam spontanea in Cochinchinâ.
 Virtus. Folia recentia in jusculo cocta leniter purgant, absque ullo
 symptomate præcavendo.

D E C A N D R I A.

G E N U S XXVII. C A R I C A.

- Char. Gen. Masc. Cal. sub-nullus. Cor. 5-fida, infundibuliformis. Fi-
 lam. in tubo corollæ: alterna breviora.
 Fœm. Cal. 5-dentatus. Cor 5-petala. Stigmata 5. Bacca
 1-locularis, polysperma. Lin. fy. pl. G. 1232.

Sp. 1. CARICA PAPAYA. α Cây đu đu. β Mán xêu cõ.

Differ. spec. Car. foliorum lobis sinuatis. Lin. sp. 1.

Habitus, & notæ. Arbor 15-20 pedes alta: caule recto, plerumque
 simplicissimo, raro ramofo, 6 pollices in diametro crasso: corti-
 ce fibroso, cinereo, intus molliuscule, succoso, albo. Folia ad ver-
 ticem caulis, magna, 5-9-partita, lobis inæqualibus, sinuato-incis-
 sis, apice acutis: petiolis longissimis, rectis, crassis, inanibus, inor-
 dinatè circa caulem dispositis. Flos Dioicus, albus: Masculus ca-
 lyce 5-fido minimo: corollâ infundibuliformi 5-fidâ, laciniis ova-
 to-oblongis, reflexis: staminibus 10, tubo corollæ insertis: race-
 mis compositis, lateralibus, reclinatâs. Fœmineus flos pedunculis
 axillaribus, 2-3-floris: calyce 5-fido: corollâ campanulatâ, 5-partitâ,
 laciniis sub-obtusis, reflexis: stigmatibus 5, sessilibus, laciniatis,
 patentibus. Bacca ovalis, semipedalis, multifidulcata, intus, & ex-
 tra rubo-lutea, 1-locularis, polysperma. Semina sub-rotunda, fusca,
 Piperis æqualia, plurima.

Habitat culta, & a me observata in Cochinchinâ, in Chinâ, & in
 Africâ.

Papaja Mas, & Femina. Rumph. Amb. l. 1. cap. 44. tab. 50. Burm.
 Zeyl.

Zeyl. pag. 184. Arbor Melonifera, Papayo dicta. Bont. Jav. l. 6. cap. 6. pag. 96. fig. ibi.

Ufus. Fructus hic Meloni aliquatenus similis, si perfecte maturescat, dulcissimus est, ac refrigerans, nec infalubris, quamvis odore minus gratus. Eo utuntur quoque immaturo, & condito.

DODECANDRIA.

GENUS XXVIII. EUCLEA.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-dentatus. Cor. 5-petala. Stam. 15.

Fœm. Cal. & Cor. Maris. Germen superum. Stylis 2.

Bacca 2-locularis. Lin. fy. pl. G. 1236.

† Sp. 1. EUCLEA PILOSA. a. Cay. Nhaçc.

Differ. spec. Eucl. caule arboreo: foliis ovato-lanceolatis, tomentosis: floribus pilosis, racemosis.

Hab., & notæ. Arbor magna, ramis ascendentibus. Folia ovato-lanceolata, integerrima, subtus tomentosa, alterna, petiolis brevibus. Flos Dioicus, rubro-fuscus, racemis terminalibus. Masculi Calyx 5-partitus, laciniis turbinato-ovatis, utrinque pilosis. Corolla 5-partita, tubo brevi: laciniis limbi ovato-oblongis, crassis, pilosis, patentibus, calyce sub-longioribus. Filamenta 15, brevia: Antheris oblongis, stantibus.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ.

Ufus. Arboris lignum ædificiis aptum.

† Sp. 2. EUCLEA HERBACEA. a. Xē lin tsū.

Differ. spec. Eucl. Caule herbaceo: floribus lateralibus.

Hab., & notæ. Caulis 1-pedalis, herbaceus, erectus, ramosus. Flos Dioicus, albus, lateralis. Calyx 5-phyllus: foliolis binis oppositis minoribus. Corolla petala 5, emarginata. Stamina 15. Pistillum nullum.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Observ. Utriusque præcedentis plantæ flores Mâculos examinavi recentes, Fœmineos non invēni: unde cognovi ad Dioeciam Dodecandriam pertinere. Non observato pistillo, non potui plenam certitudinem de Genere habere. Euclex adhærere jussi, donec completo charactere, vel penitus uniantur, vel in proprium locum recedant.

POLYANDRIA.

† GENUS XXIX. ABUTUA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores*: Amentis lateralibus, congestis.

Cal. Hemisphæricus, truncatus, carnosus, vaginans amentum filiforme, nudum, interruptum. Perianthium aliud nullum.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 20 circiter, turbinata, brevia, receptaculo inhaerentia, ad calycis marginem declinata. Antheræ totidem, biloculares, oblongæ, apice bifidæ, stantes.

* *Femineæ flores* in aliâ plantâ: Amentis similibus.

Cal. ut Masculi.

Cor. nulla.

Pist. Germina 6-8; ovato-oblonga, obliquè ad marginem Calycis declinata.

Stylus nullus. Stigmata solitaria, acuta, polyfida.

Peric. Baccæ 6-8; oblongo-ovatae; coriaceæ; læves, 1-spermæ, sessiles.

Sem. sub-ovata; sub-acuta: cortice tenui, flexili, striato.

Nom. Vulgarè Abutua, puto, quod derivetur à regno Abutuâ (aliis Butua) in Africâ, olim Monomotapæ tributario, ubi hæc planta abundè nascitur, & usui Medico inservit.

Observ. Gnetum Linnæi (Mantiss. pag. 18. Gen. 1278) quod est Gnemon Domestica Rumphii; (Amb. l. 1. cap. 61. tab. 71, 72.) valde simile habitu apparet Abutuæ nostræ: differt tamen fructu drupaceo, nuce striata, squamâ calycinâ ovatâ, & in fœminâ lacerâ, filamento unico antheris geminis: quæ omnia in Abutuâ desiderantur. Hanc repetitis observationibus invenimus semper Dioicam, Polyandram, & Polygynam. Licet enim, quem dicimus calycem, aliquis dicat squamam vaginantem amentum, staminaque, ac germina ibi congesta diversos esse flores, nos hoc concedere non possumus, cum nullam invenerimus notam partialem calycis, receptaculi, aut pedicelli proprii, per quæ distinguantur ab invicem tam stamina, quam pistilla singula, ut in singulos flores exurgant.

Char. Gener. Masc. Cal. vaginans Amentum. Cor. 0. Stam. 20.

Fem. Cal. ut in Mare. Cor. 0. Pist. 6-8. Baccæ totidem, exsuccæ, 1-spermæ.

† Sp. 1. ABUTUA INDICA. & Cay Sôt: Cay Gân.

Differ. spec. Abut. foliis simplicibus, oppositis: caule fruticoso, scandente. Hab.

Hab. *Caulis* fruticosus, scandens, acirrhus, inermis, crus crassus : *ramis* longis, geniculatis, lævibus. *Folia* ovato-lanceolata, sub-acuminata, integerrima, fusco-virentia, nitida, opposita, petiolis brevibus. *Flos* amentis lateralibus, semipedalibus, nudis, polyatis. *Bacca* glandiformes, semipollicares, fusco-luteæ, glabræ, edules. *Caulis* valde similis *Fibrauræ* supra descriptæ Genere 24 : similiter constans ex fibris crassis, lignosis, lentis, in circulos concentricos dispositis. Color interior rubro-fuscus, in aliis pallidus. Sapor vix ullus. Odor nullus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & in aliis Indiæ locis.

Gnemon funicularis. Rumph. Amb. 1. 7. cap. 8. tab. 8.

Virt. : radice, & inferioris caulis. Resolvens, Deobstruens, Antifebrilis. Apotemata, & inflammationes tam internas, quam externas resolvit : febres intermittentes diurnas sæpe extinguit : obstructions viscerum referat. Cum primum sumitur in decocto, vel pulvere, calor in ventriculo sentitur non molestus. Nulla evacuatione sensibili notatur.

Observ. Varia genera plantarum flore admodum diversa, caule, & virtute Medicâ propinqua ab aliis confunduntur nomine *Parreira brava*, quod lingua Lusitanâ vitem sylvestrem sonat. Horum unum est *Abutua*, de quâ loquimur : alterum *Cissampelos* Linnæi, vel ejus affine *Botria*, quod antea in classe *Pentandriâ* descripsimus. *Abutua* ineptè dicitur *Parreira*, cum ejus folia, flores & fructus nullam habeant cum vite similitudinem. At *Cissampelos* Linnæi, & potiori jure *Botria* nostra caule, cirrhis, foliis, flore, fructu, & præsertim numero staminum ad vitem accedunt. Hæc, quam in Africâ observavimus, nomine *Parreira brava* a Lusitanis ibi commorantibus agnoscitur : illa vero *Abutua* tam ibi quam alibi ab eisdem nominatur. *Abuta* Rufescens, & *Abuta Amara* Aubletii (Guian. pag. 618, 620. tab. 250, 251.) quamvis nomine, & caule proximæ, ad aliud genus pertinent, dictum *Fibrauræ*, a nobis Genere 24 hujusce Classis Dioeciæ descriptum.

† Sp. 2. ABUTUA AFRICANA. 7. . . .

Differ. spec. *Abut. foliis* ternatis : caule scandente, fruticoso.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, crassus, ramosus, inermis, scandens, acirrhus : constans fibris lignosis in circulos concentricos ordinatis, coloris pallidè-lutei, in aliis rufescentis. *Folia* 3-nata, basi ovata, apice acuta, integerrima, glabra, fusco-viridia ; nitida, parva, petiolata. Non florebat eo tempore, quo eam vidi.

Habitat agrestis in orâ Orientali Africæ.

Virtus. Eadem, quæ præcedentis.

GENUS XXX. CYCAS PALMA.

Char. Cener. Masc. *Amentum* strobiliforme: *squamis* subtus undique tectis polline.

Fœm. *Spadix* ensiformis: *germinibus* angulo immerfis, solitariis. *Stylus* 1. *Drupa* nucleo ligneo. Lin. fy. pl. G. 1285.

† Sp. 1. CYCAS INERMIS. α Cày Sav tuê. B. . . .
 Differ. spec. Cyc. *frondibus* pinnatis: *stipitibus* inermibus.
 Hab., & notæ. Palma *caule* 5-pedali, simplicissimo, femur crasso, scabro: *fusco*. *Fronde*s pinnatæ, 5 pedes longæ, ascendentes: *stipitibus* inermibus, sub-teretibus: *foliis* lineari-lanceolatis, 6-pollicaribus, glabris, obscuro-viridibus, planiusculis, oppositis, sessilibus. *Flos* Dioicus: *Masculus* spathâ nullâ: *spadice* terminali, solitario, erecto, ovali-oblongo, diametro 4-pollicari, strobiliformi, fusco-luteo, imbricato, sub-clauso: *squamis* oblongo-turbinatis, crassis, fungosis, staminiferis. *Filamenta* nulla, sicut nec perianthium, aut corolla. *Anthere* plusquam 100 in qualibet squamâ, sparsæ, globosæ, semini Raphani æquales, apice dehiscentes. *Pistillum* nullum. *Fœmineus* flos in aliâ planta: *spadicibus* variis, linearibus, reflexis, paucifloris, sub-terminalibus, simplicibus, bractæâ laciniatâ terminatis. *Corolla*, & *Calyx* nulli. *Germen* ovatum *Strigma* simplex. *Drupa* sesquipollicaris, ovata, sub-compressa, lævis, rufa: *nuce* lignosâ ejusdem formæ: *nucleo* simplici.
 Habitat agrestis, cultaque ob pulchritudinem in Cochinchinâ, & Chinâ.

Cycas Circinalis. Jacq. Ac. Helvet. tom. 8. pag. 59. tab. 2. Cycas revoluta. Thunb. Jap. pag. 229. Olus Calapoides. Rumph. Amb. 1. cap. 20. tab. 20, 21, 22, 23, 24. Quamvis figuræ Rumphianæ aliquantulum differant, sicut etiam descriptiones Jacquini, & Thunbergii, puto pro diversis speciebus non habendas: nec etiam nostram, licet nempe inermem invenerim, in quo ab illis diffidet. Ramosam nunquam vidi, nec Monoicam.

Ulus cibaricus in Cochinchinâ nullus. Tunkini incolæ mihi retulerunt in suâ patriâ fieri panem *Sagu* sat bonum ex trunco hujus palmæ.

† GENUS XXXI. ECHINUS.

*Descriptio Naturalis.** *Masculi flores.*

Cal. Monophyllus, squamiformis, ovatus, acutus, pilosus, incurvus; terminatus laciniis variis, linearibus, inæqualibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 30 circiter; capillaria, receptaculo infidentia, calyce breviora. Antheræ sub-rotundæ, minimæ.

* *Feminei flores in aliâ plantâ.*

Cal. Perianthium 5-6-fidum, patens: laciniis acutis, pilosis, inæqualibus.

Cor. nulla.

Pist. Germen superum, sub-rotundum, 2-lobum. Styli 2, pilosi, breves. Stigmata simplicia.

Peric. Capsulæ 2, connatæ, sub-rotundæ, 1-spermæ, circumdatæ vilis subulatis, rectis, duriusculis, fetosis.

Sem. rotunda, glabra, nigra.

Nom. Echinus a capsulis echinatis.

Char. Gen. Masc. Cal. Squama laciniata. Cor. ∅. Stam. 30.

Fcem. Cal. 5-6-fidus inferus. Cor. ∅. Pist. 2. Caps. 2, echinatae, 1-spermæ.

Sp. I. ECHINUS TRISULCUS. α Cay Hón.

Differ. spec. Ech. *foliis* integris, trifidisque: *pedunculis* polyfloris axillaribus.

Hab. *Arbor* mediocris, caule declinato: *cortice* cinereo, glabro: *ramis* obliquis. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, sæpe tricuspida, reticulato-venosa, subrus tomentosa, mollia, petiolata, sparsa. *Flos* Masculus, & *Femineus* in distinctis plantis, uterque lateralis, pedunculis polyfloris.

Habitat agrestis loca plana Cochinchinæ.

Ulassium? Rumph. Amb. l. 4. c. 18. tab. 23.

† GENUS XXXII. STIGMAROTA.

*Descriptio Naturalis.** *Masculi flores.*

Cal. Perianthium campanulato-patens, 4-5-partitum: laciniis acutis.

Cor. nulla.

Stam.

Stam. Filamenta 30 circiter, calyce longiora. Antheræ. sub-rotundæ.

* *Femineæ flores* in aliâ plantâ.

Cal. Perianthium rotatum, 5-6-partitum: laciniis acutis.

Cor. nulla. Nectarium lentiforme, 5-6-lobum.

Pist. Germen superum, sub-rotundum. Stylus cylindricus, brevis. Stigma orbiculatum, magnum, 6-partitum.

Peric. Bacca sub-globosa, carnosa, 1-ocularis, 6-sperma.

Sem. Ovata, compressa, minuta.

Nom. ab stigmate in formam rotæ expansæ, radiato.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-5-partitus. Cor. o. Stam. 30.

Fœm. Cal. 5-6-partitus. Cor. o. Stigma rotatum, 6-fidum. Bacca carnosa, 6-sperma.

† Sp. 1. STIGMAROTA JANGOMAS. α. Cày Mu cion.

Differ. spec. Stigmar. Caule arboreo, aculeato: *pedunculis* polyfloris, sparsis.

Hab. Arbor mediocris, ramis patentibus: *Masculi caulis* aculeis ramosis, longis: *Femineæ* aculeis simplicibus, brevibus, sparsis, raris. *Folia* ovata, acuminata, ferrata, incurva, nitida, parva, sparsa, petiolata. *Flos* utriusque pedunculis polyfloris, sparsis. *Bacca* fusco-purpurea, diametro 8-lineari, esculenta, sapida, dulcis, sub-astringens.

Habitat culta in Cochinchinâ, puto, quod etiam agrestis.

Jangomas Garc. Arom. l. 2. c. 5. Bont. Jav. l. 6. c. 25. fig. pag. III. Spina spinarum, Rucam mas, & fœmina. Rumph. Amb. Auct. c. 42. tab. 19. fig. 1, 2.

Observ. Quoniam Spina spinarum, prout a Rumphio exposita, cum nostrâ Stigmarotâ Jangomas bene cohæret, a genere Carissa, cui non convenit, expungi debet. Lin. sy. pl. 4. pag. 590. Nec illius est propria descriptio Linnæana (Mantiss. pag. 560.) si cum Rumphianâ comparetur.

† Sp. 2. STIGMAROTA AFRICANA. γ . . .

Differ. spec. Stigm. caule fruticoso aculeato: *floribus* solitariis, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, cespitosus, expansus, lignosus, 6-pedalis. *Folia* ovata, crenata, glabra, alterna, petiolata. *Aculei* simplices, longi, recti. *Flos* Dioicus, apetalus, terminalis, solitarius. *Femineus* stigmatibus 6-7, bifidis, sessilibus, in orbem positus. *Masculum* non vidi.

† GENUS XXXIII. MALLOTUS.

Descriptio Naturalis.

* *Masculini flores.*

Cal. Perianthium 3-phyllum : foliolis sub-rotundis, concavis, lanuginosis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta plurima, brevia, receptaculo inhærentia. Antheræ rotidem, lobis binis, sub-rotundis.

* *Fœminini flores in aliâ plantâ.*

Cal. Perianthium 3-phyllum : foliolis trigonis, æquilateris, pilosis, expansis.

Cor. nulla.

Pist. Germen superum, sub-rotundum, 3-lobum. Stylus nullus. Stigmata 3, oblonga, hirsuta, colorata, reflexa.

Peric. Capsula sub-rotunda, 3-loba, 6-valvis, 3-locularis, 1-sperma : septa villis multis, longis, mollibus.

Sem. hinc rotunda, inde angulata : pedicellis propriis receptaculo inhærentia post capsulæ discessum.

Nom. (*Μαλλωτός villosus*) ex pericarpio villis confito.

Observ. Hoc genus *Cliffortiæ* affine est : ab illâ vero differt fructu supero, 3-loculari, & stigmatibus ternis, sessilibus.

Char. Gen. Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 0. Stam. plurima.

Fœm. Cal. 3-phyllus, inferus. Cor. 0. Stigm. 3. Caps. 3-locularis. Sem. solitaria, pedicellata.

Sp. 1. MALLOTUS COCHINCHINENSIS. *æ* Cay Bét. p. . . .

Differ. spec. *Malôt. foliis* trifidis, ovatisque, denticulatis, tomentosis : *racemis* spicatis, reflexis.

Hab. *Arbor* medioeris, ramis patentibus. *Folia* sub-rotunda, 3-cuspidata : pauca integra, ovata, acuminata : omnia denticulata, tomentosa, alterna, petiolata. *Flos* racemis demissis, in spicas desinentibus.

Habitat sepes, & hortos minus cultos Cochinchinæ, & Chinæ.

Observ. Vidi Cantone Sinarum florem Masculum aliquantum diversum : foliolis calycis ternis, lanceolatis, pilosis, patentibus : Filamentis ultra 40, calyce brevioribus : Antheris ovatis, stantibus. *Fœmineus flos* ibi non occurrit.

MONADELPHIA.

GENUS XXXIV. JUNIPERUS.

Char. Gen. Masc. Cal. Amenti squamæ. Cor. 6. Stam. 3.

Fœm. Cal. 3-partitus. Petala 3. Styli 3. Bacca 3-sperma, tribus tuberculis calycis inæqualis. Lin. fy. pl. G. 1240.

Sp. 1. JUNIPERUS BARBADENSIS. α Nhit bien tung. β . . .

Differ. spec. Jun. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, senioribus acutis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Caulis arboreus, 10-pedalis, ramis ascendentibus, ramulis reflexis. Folia quadrifariam imbricata, cæruleo-virentia: seniores acutiuscula, juniore ovata.

Habitat culta in Cochinchinâ, a Sinis oriunda.

Thunb. Jap. 264. Junperius Barbadensis, Cupressi foliis, ramulis quadratis. Pluken. Alm. pag. 201. tab. 197. fig. 4.

Sp. 2. JUNIPERUS CHINENSIS. α Bien bá tung. β . . .

Differ. spec. Jun. foliis decurrentibus, imbricato-patentibus, confertis: caulinis ternis, rameis quaternis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. Arbuscula 3-pedalis, ramis tortuosis, patentissimis. Folia subulata, duriuscula, obscuro-virentia, conferta, patentia, basi adnata.

Habitat culta in Cochinchinâ, a Sinis oriunda.

Lin. Mantiss. pag. 127.

POLYADELPHIA.

+ GENUS XXXV. HOMONOIA.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Amenti squamæ 3, acutæ, inæquales, singulum florem sustinentes.

Perianthium proprium 3-phyllum: foliolis ovatis, concavis, coloratis.

Cor. nulla.

Sam. Filamenta 200 circiter, calyci æqualia, in 20 fasciculos connexa. Antheræ sub-rotundæ.

* Fœ-

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. Amenti squama simplex, acuta, polyfida, persistens. Perianthium proprium nullum.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus nullus. Stigmata 3, oblonga, villosa.

Peric. Capsula supera, 3-loba, 3-locularis, 3-valvis, 1-sperma.

Sem. sub-rotunda.

Nom. (*Όμοιοια concordia*) ob stamina in varias tribus unita.

Char. Gen. Masc. *Amenti squamæ* 3. *Perianth.* 3-phyllum. *Cor.* 0. *Stam.* 200 in 20 fasciculis.

Fœm. *Cal.* Amenti squama polyfida. *Periant.*, & *Cor.* 0. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. HOMONOIA RIPARIA. α Ri ri bô foug.

Differ. spec. Hom. *foliis* lanceolato-linearibus: *Amentis* sub-terminalibus.

Hab. *Arbor* 6-pedalis: *caule* crasso, erecto, ramosissimo. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, tomentosa, alterna. *Flos* uterque minutus: amentis linearibus, sub-terminalibus.

Habitat spontanea ripas fluminum in Cochinchinâ.

† GENUS XXXVI. SEBIFERA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-phyllum: foliolis sub-rotundis, concavis, pilosis, patentibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 100 circiter, capillaria, calyce longiora, distributa in 10 phalanges. Antheræ biloculares, ovatæ.

* *Feminei flores* in distinctâ plantâ.

Cal. ut in Masculo.

Cor. nulla.

Pist. Germina 10 circiter, sub-rotunda, pedicellata. Stylus sub-nullus; Stigmata solitaria, obtusa, integra.

Peric. Baccæ 10 circiter, globosæ, 1-sperma.

Sem. globosa.

Nomen Sebifera ex oleo crasso, albo, sebiformi, quod ex baccis exprimitur.

Mmmm

Char.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Stam. 100, in 10 fasciculis.

Fœm. Cal. 4-phyllus. Cor. o. Pistilla 10. Baccae totidem, 1-sperma.

† Sp. I. SEBIFERA GLUTINOSA. α Bý lq phót. β Cien Kām xú.

Differ. spec. Seb. foliis ovato-oblongis integerrimis: floribus 2-3-natis, lateralibus.

Hab. Arbor magna: ramis patentibus. Folia ovato-oblonga, integerrima, glabra, alterna, petiolata. Flos uterque lateralis, sub-terminalis, pedunculis 2-3-natis. Baccae parvae, laeves, nigricantes.

Habitat in sylvis Cochinchinae, & Chinae.

Ufus. Arboris lignum leve, & pallidum faciliè elaboratur, tignaue, & postes præbet ad ædificia. Folia, & ramuli humore viscoso scætant; contusaue, & in aquâ macerata glutinosam reddunt: eamque solent indigenæ admiscere testorio, ut tenacius adhæreat, & diutius persistat. Ex baccis magna quantitas extrahitur olei densi, & albi, ex quo formantur vulgares candellæ, sebaceis, & cereis similes, odoris tamen ingrati.

GYNANDRIA.

GENUS XXXVII. CLUTIA.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-phyllus Cor. 5-petala.

Fœm. Cal. 3, & Cor. Maris. Styli 3. Caps. 3-locularis
Sem. 1. Lin. sy. pl. G. 1247-

† Sp. I. CLUTIA MONOICA. β Xún tí fūm.

Differ. spec. Clut. foliis oblongis, glabris, nervosis: floribus congestis, axillaribus.

Hab., & notæ. Arbuseula 5-pedalis: ramis patentibus. Folia oblonga, sub-acuta, integerrima, glabra, obliquè nervosa, parva, inæqualia, alterna, petiolis brevibus, stipulis nullis. Flos Monoicus, albus, axillaris, glomeratus, parvus, multus. Masculi calyx 5-partitus, laciniis acutis, patentibus. Corolla petala 5, minuscula, turbinata, crispata: Nectario luteo, glanduloso: Germen nullum. Stylus columnaris, crassiusculus, apice obtuso, 3-fido: Stigma dicas, si velis. Filamenta 5, medio styli horizontaliter adhærentia. Flos Fœmineus mistus Masculis, præcipuè ad apicem ramorum: calyce, & corollâ, ut in Mãe: Styli 3, brevibus: capsulâ 3-loculari, 1-sperma.

Habi-

Habitat spontanea prope Cantonem Sinarum.
 Observ. A Clutia stipulari (Lin. sp. 7.) habitu magis differt, quam
 flore.

* Ordinis adhuc incerti.

† GENUS XXXVII. RESTIARIA.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores?

* Fœminei flores in distinctâ plantâ.

Cal. Perianthium oblongum capsulare: limbo 5-partito, laciniis lanceolatis, patentibus.

Cor. nulla.

Pist. Germen oblongum, inferum. Stylus 9. Stigma concavum.

Peric. Capsula calycina, ovato-oblonga, utrinque sub-artemata, 5-nerviâ, pilosa, 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

Sem. Multa, compressa, sub-rotundâ, ex utraq; parte alata membranâ lineari, tenui, longâ.

Nom. ab usu caulis restibus formandis idonei.

Char. Gen. Masc.?

Fœm. Cal. 5-fidus, capsularis. Cor. 0. Stigma concavum.
 Caps. 5-nerviâ, 2-locularis, 2-valvis. Sem. multa, alata.

† Sp. I. RESTIARIA CORDATA. Cham bia tlon.

Differ. Spec. Rest. foliis cordatis, pilosis, oppositis: racemis laxis, axillaribus.

Hab. Frutex magnus, caule declinato: ramis scandentibus, inermibus, acirrhis. Folia cordata, rugosa, pilosa, integerrima, magna, opposita. Flores axillaris, paniculatus, pedunculis communi, & parvialibus longis. Plantam cum floribus masculis non obtinui.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Restiaria Nigra? Rumph. Amb. l. 5. c. 35. pag. 188.

Ufus. Cortex hujus plantæ tenax, ac porosus in longas fibras contunditur, ex quibus formantur faces, & funes igniarii. Illis etiam obturantur navium rimæ.

C L A S S I S XXIII

P O L Y G A M I A.

M O N O E C I A.

1. MUSA. Hermaphrodita. *Cal.* 0. *Cor.* 2-petala. *Stam.* 6: 1 fertili. *Pist.* 1. *Bacca* infera.
Hermaphroditus. *Cal.* 0. *Cor.* 2-petala. *Stam.* 6: 5 perfectis. *Pist.* 1. *Bacca* nulla.
2. HOLCUS. Hermaphr. *Gluma* 1-flora. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
Masc. *Gluma* 1-flora. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3.
3. ANDROPOGON. Hermaph. *Gluma* 1-flora. *Gluma* basi aristata. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
Masc. *Gluma* 1-flora. *Gluma* basi aristata. *Stam.* 3.
4. ISCHLEMUM. Hermaph. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
Masc. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3.
5. SPINIFEX. Hermaph. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
Masc. *Gluma* communis. *Gluma* 2-valvis. *Stam.* 3. *Valvule* omnes calyci parallelæ.
6. OXICARPUS. Hermaph. *Cal.* 4-part. *Cor.* 4-part. *Stam.* polyadelphia. *Stigm.* 6. *Bacca* 6-sperma.
Masc. *Cal.* 3. & *Cor.* Herm. *Stam.* multa.
7. GEMELLA. Herm. *Cal.* 4-phyl. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 8. *Stylus* 2-fidus. *Bacca* 2.
Masc. *Cal.* *Cor.* 3. *Stam.* ut Hermaphr.
8. ACER. Hermaph. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Styli* 2. *Caps.* 2-coeca, alata.
Masc. *Cal.* 3. *Cor.* *Stam.* ut Hermaphr.
9. MIMOSA. Hermaph. *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 4-100. *Pist.* 1. *Legumen.*
Masc. *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 4-100.

† 10. NEPTUNIA.

Hermaph. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* c. *Stam.* 10.
Stylus 1. *Siliqua.*
 Neuter. *Cal.* 5-fid. *Cor.* 10-petala. *Stam.* o.
Pist. o.

11. PARIETARIA.

Hermaph. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stam.* 4.
Styl. 1. *Sem.* 1.
 Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Sem.* 1.

DIOECIA.

† 12. PEDICELLIA.

Hermaph. *Cal.* 5-part. *Cor.* o. *Stam.* 8.
Stigm. 3. *Caps.* 3-valvis. 1-sperma.
 Masc. *Cal.* 5-part. *Cor.* o. *Stam.* 8.

13. PANAX.

Hermaphr. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.*
 5. *Styli* 2. *Bacca* 2-sperma.
 Masc. *Cal.* integer. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 5.

† 14. HEPTACA.

Hermaph. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 10-petala.
Stam. 100. *Pist.* 1. *Bacca* 7-ocularis.
 Masc. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 10-petala. *Stam.*
 100.

15. CHAMÆROPS.

Hermaph. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
Stam. 6. *Pist.* 3. *Drupæ.* 3.
 Masc. *Cal.* 3-part. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 6.

† 16. GONUS.

Hermaph. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Stam.*
 4. *stigmata* 4. *Drupæ.* 4.
 Masc. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* 4.

17. ZANTHOXYLUM.

Hermaph. *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-petala. *Filam.*
 5. *Styli* 2. *Caps.* 2, 1-sperma.
 Fœm. *Cal.* 5-dent. *Cor.* 5-petala. *Stigm.*
 1. *Caps.* 2.

† 18. RHYTIS.

Hermaph. *Cal.* 3-6-partitus. *Cor.* o. *Stam.*
 3. *Stigmata* 3. *Bacca* 3-sperma.
 Fœm. *Cal.* multipart. *Cor.* o. *Stigm.* 3. *Bac.*
 3-sperma.

† 19. BACCAUREA.

Hermaph. *Cal.* 5-part. *Cor.* o. *Stam.* 6-8.
Stigma 1, concavum. *Pericarp.* abortiens.
 Fœm. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Stigma* con-
 vexum. *Bacca* locularis.

† 20. PHYSKIUM.

† 21. DICALIX.

22. FIGUS.

POLYGAMIA.

Hermaph. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 3-petala. *Stam.*
6. *Pist.* 1. *Folliculus* polyspermus.

Fœm. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Follic.* polyspermus.

Hermaph. *Cal.* exter. 3-phyl: inter. 5-dent.

Cor. 5-partita. *Filam.* 100. *Stylus* 1. *Drupa.*

Fœm. *Cal.* duplex. *Cor.* 0. *Stylus* 1. *Drupa.*

TRIOECIA.

Receptaculum commune carnosum, occultans
flosculos, vel Masculos, vel Fœminas,
vel Masculos simul cum Fœminis.

Masc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 3.

Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Sem.* 1.

MONOECIA.

GENUS I. MUSA.

Char. Gen. Hermaphroditus. *Cal.* Spatha. *Cor.* 2-petala: altero erecto, 5-dentato: altero nectarifero, concavo, breviorre. *Filam.* 6, horum 5 perfecta. *Styl.* 1. *Germ.* inferum, abortiens.

Hermaphrodita. *Calyx* *Corolla*. *Filamenta*, *Pistillum*, Hermaphroditum: *filamento* unico perfecto. *Bacca* oblonga, 3-quetra, infera. *Lin.* sy. pl. G. 1248.

Hab., & notæ Generi communes. *Radix* bulbus perennis, sub-rotundus, solidus, aquosus, exterius fuscus, intus albus: radiculis crassis, raris. *Caulis* biennis, interdum longævior, a 9 ad 20 pedes erectus, rectissimus, simplicissimus, crassus, teres, glaber, fungosus, aquosus, lamellatus: lamellis convolutis, desinentibus in singulos *petiolos*, longos, canaliculatos, amplexicaules, basi imbricatos. *Folia* oblonga, obtusa, integerrima, a 3 ad 10 pedes expansa, infra binos pedes lata, transversè polysulcata, glabra, lætè virentia, per sulculos facile scissilia. *Flos* terminalis, albicans, *racemo* unico, maximo (in plurimis reflexo) crasso, tereti, nec nutante, composito: racemulis alternis, sessilibus, floribus bino ordine in latitudinem protensis. *Calyx* universalis nullus: partialis cujusque racemuli spatha sub-acuta, concava, sulcata, purpurascens, successivè dehiscens, decidua. *Perianthium* proprium nullum. *Corolla* 2-petala: petalo exteriori erecto, apice obtuso, 5-dentato, reflexo: petalo interiori cymbæformi, integerrimo, breviorre, basi reflexo. *Floris fertis* *Filamenta* 5, subulata, petalo erecto breviora, receptaculo insidentia: quorum 1, vel 2, aliquando omnia antherifera, antheris linearibus, lateralibus. *Germen* oblongum, inferum, obtusè trigonum. *Stylus* linearis, crassus, staminibus longior, *stigmatè* capitato, apice sulcato. *Bacca* oblonga, sub-angulata, carnosa, dulcis, edulis, 3-locularis, polysperma: *seminibus* sub-rotundis, nigris, nidulantibus.

Floris sterilis *Filamenta* similiter 5, quorum sæpe omnia, sæpe aliqua tantum, interdum nulla antherifera. *Corolla* floris fertis similis. *Stylus*, *Stigma*, *Germen*, minuscule, abortientia. Flores fertiles semper occupant inferiores racemi partes: steriles superiores: utriusque semper decidui, (sicut etiam spathæ) præter supremos, & extimos, qui, deficiente vi vegetante, clausi intra spathas patrescunt. Multæ species multæ sunt in Cochinchina: plurimæ varietates: magis obvias exponam.

† Sp. 1. MUSA SEMINIFERA.

Differ. spec. Mus. *racemo* reclinato: *spathis* partialibus, ovatis: *fructu* oblongo, polyspermo.

Varietas 1. α Chuoi Đá. Agrestis: caule altissimo, nigricante: seminibus confertis: pulpá sub-nullá.

Var. 2. α Chuoi Sú. Domestica: caule altissimo, virescente: pulpá dulci: seminibus multis.

Var. 3. α Chuoi Mát. Domestica: caule mediocri, albicante: pulpá dulcissimá, seminibus raris.

Rumph. Amb. l. 8. tab. 61. Pissang Utan. pag. 139. Pissang Batu, Pissang Bidji. pag. 132. Pissang. Medji. pag. 131.

† Sp. 2. MUSA ODORATA.

Differ. spec. Mus. *racemo* reclinato: *spathis* partialibus, oblongis: *fructu* longo, aspermo.

Varietas 1. α Chuoi Bà huong. Domestica: caule altissimo: fructu magno, tereti, odorato, curvo.

Var. 2. α Chuoi Tíeo. Domestica: caule mediocri: fructu gracili, angulato, tortuoso, odoro.

Var. 3. α Chuoi Mói. Domestica: caule mediocri: fructu gracili, purpurascete, odoro.

Musa Cenorins. Garc. edit. Clus. l. 2. cap. 10. pag. 230.

† Sp. 3. MUSA NANA. α Chuoi Đuji.

Differ. spec. Mus. *racemo* reclinato: *spathis* partialibus, conicis: *strobis* omnibus fertilibus: *seminibus* nullis.

Hab., & notæ. *Caulis* 5-pedalis, semipedem crassus. *Folia* oblongo-ovata, 3-pedalia. *Stamina* omnia fertilia: sæpius 5 in quolibet flore, frequenter 6, aliquando plura. *Germine* omnia prolifera. *Racemus* curvatus, brevis. *Bacca* ovato-oblonga, angulata, dulcis, asperma.

Pissang Bombor? Rumph. Amb. l. 8. cap. 2. pag. 132. Hujus varietas videtur esse Pissang Canaya (Rumph. ibi) quæ in Cochinchina dicitur *Chuoi Cau*. Florem hujus non examinavi.

† Sp. 4. MUSA CORNICULATA. α Chuoi Poi.

Differ. spec. Mus. *racemo* reclinato: *spathâ* universali, 2-phyllâ: *fructu* maximo.

Hab., & notæ. *Caulis* mediocris. *Spatha* universalis: partiales nullæ. *Racemus* reflexus, brevis: racemulis sub-ternis, paucifloris. *Fructus* 1-pedalis, curvus, sub-teres, crassus, aspermus, in aliquibus luteus, in aliis rufus, nitidus.

Pissang

Pissang Tando, seu Musa Corniculata. Rumph. Amb. l. 8. cap. 2. pag. 130.

Sp. 5. MUSA URANOSCOPOS. α Chúi tau.

Differ. spec. Mus. racemo erecto: *spathis* partialibus sub-bifloris: *fructu* compresso, polyspermo.

Hab., & notæ. *Caulis* 4-pedalis, pollicem crassus. *Folia* linearia, 3-pedalia, 5 pollices lata. *Racemus* erectus, *spathis* linearibus, alternis, coccineis, sub-bifloris, multis. *Bacca* coccinea, ovata, compressa, bipollicaris, polysperma, non edulis.

Musa Uranoscopos. Rumph. Amb. l. 8. cap. 4. pag. 137. Quæ Musa Troglodytarum. Lin. sp. 3. At M. Paradisiaca, & M. Sapientum inter se specie non differunt, cum earum notæ non verificentur: nec meliores invenio in totâ Musâ Cliffortianâ, quamvis amplissimâ.

GENUS II. HOLCUS.

Char. Gen. Herm. *Cal.* Gluma 1, sive 2-flora. *Cor.* Gluma aristata.

Stam. 3. *Styli* 2. *Sem.* 1.

Masc. *Cal.* Gluma 2-valvis. *Cor.* 0. *Stam.* 3. Lin. fy. pl. G. 1252.

Sp. 1. HOLCUS SACCHARATUS. α Cáy Mách mac. β . . .

Differ. spec. Holc. *glumis* villosis: *feminibus* omnibus aristatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Planta* biennis, *culmo* 8-pedali, solido, articulado, erecto, simplicissimo: *radiculis* ex inferioribus geniculis in terram descendentibus. *Folia* strictè lanceolata, glabra, magna, sacchari similia, petiolis amplexicaulibus. *Flos* Polygamus Monoicus, terminalis, paniculâ magnâ, diffusâ, in spiculas desinente. *Calyx* 2-valvis, coloratus, sub-clausus, semine longior, basi, & apice pilosus, muticus. *Corolle* arista calyce duplo longior, recta, nec tortilis, aut articulata. *Semen.* 1, lenticulare, crassum, nigrum, nitidum, edule.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ. Hic etiam occurrit Holcus Sorghum, paniculâ coarctatâ, erectâ.

Sorghum Battari. Rumph. Amb. l. 8. c. 29. tab. 75. fig. 1. Milium Indicum, semine fusco, jubâ largâ. Burm. Zeyl. pag. 159.

GENUS. III. ANDROPOGON.

Char. Gen. Herm. *Cal.* Gluma 1-flora. *Cor.* Gluma basi aristata. *Stam.*
3. *Styli* 2. *Sem.* 1.
Masc. *Cal.*, & *Cor.* prioris. *Stam.* 3. *Lin. fy.* pl. G. 1251.

Sp. 1. ANDROPOGON SCHÖENANTHUS. α. Lá sá, β. Mão hiám.
Differ. spec. Andr. *paniculæ* spicis conjugatis, ovato-oblongis: *rachi*
pubescente: *stoculis* sessilibus: *aristâ* tortuosa. *Lin. sp.* 11.
Hab., & notæ. *Planta* graminea, perennis: *radice* repente: *culmo*
brevis, erecto, cespitoso, solido. *Folia* 3-pedalia, reclinata, stri-
gosa, plana, striata, scabra, lætè virentia, odorata. *Flor* paniculâ
sub-declinatâ, tenui, semipedali, spicis conjugatis, pubescentibus:
stoculis sessilibus, aristatis. Tota planta aromatica: rarè floret.
Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.
Juncus Odoratus. *Garc. Arom.* l. 1. cap. 34. edit. *Cluf.* pag. 204. fig.
ibi. *Schœnanthum* Amboinicum: *Siree.* *Rumph. Amb.* l. 8. cap. 24.
tab. 72. fig. 2. Gramen Dactylon aromaticum, multiplici paniculâ,
spicis brevibus, tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis.
Pluken. Almag. pag. 175. tab. 190. fig. 1.
Ulus. Folii recentibus conditi cibi tam odore, quam sapore gratio-
res redduntur.
Virt. totius plantæ. Attenuans, Stomachica, Emmenagoga.

GENUS IV. ISCHÆMUM.

Char. Gen. Herm. *Cal.* Gluma 2-flora. *Cor.* 2-valvis. *Stam.* 3. *Styli*
2. *Sem.* 1.
Masc. *Cal.*, & *Cor.* ut Hermaphroditum. *Stam.* 3. *Lin. fy.*
pl. G. 1254.

† Sp. 1. ISCHÆMUM IMPORTUNUM. α. Co óing.
Differ. spec. Isch. *paniculâ* coarctatâ: *corollis* 1-valvibus.
Hab., & notæ. *Planta* graminea: *radice* perenni, simplici, longâ,
profundâ, articulatâ, albicante, tenacissimâ. *Culmus* 3-pedalis,
sub-erectus, teres, fistulatus, crassiusculus. *Folia* subulata, bre-
via, alterna. *Panicula* terminalis, coarctata: *floribus* ovatis, gla-
bris, muticis, minusculis. *Calyx* gluma bivalvis, biflora, conti-
nens alterum florem Hermaphroditum cum altero Masculo. *Corol-
la* 1-valvis singulum florem amplectens. *Stam.* 3. *Semen* 1, muticum.
Habitat agreste, & frequens in Cochinchinâ: herba odiosa agricolis,
quia difficulter eradicatur, & faciliè iterum pullulat.

GENUS V. SPINIFEX.

Char. Gen. Herm. Cal. Gluma 2-valvis, 2-flora: *valvulis* rachi parallelis. Cor. 2-valvis, mutica. Stam. 3. *Styli* 2.
Masc. Cal. communis cum Hermaphrodito. Cor., & *Stamina* similia. Lin. sy. pl. G. 1250.

Sp. 1. SPINIFEX SQUARROSUS. α Cỏ chay bãi biển.

Differ. spec. Spin. *foliis* fasciculatis, capitulo vasto culmum terminantibus.

Hab., & notæ. *Culmus* perennis, 4-pedalis, erectus, crassus, teres, solidus, geniculatus. *Folia* subulata, excavata, dura, pungentia, glabra, glauca, congesto-imbricata, ad apicem culmi in globum squarrosum fasciculata. *Flos* Polygamus, spicis brevibus, paucifloris, capitulo terminali insertis.

Habitat ad maris litora in Cochinchinâ, & Chinâ.

Spinifex squarrosus. Lin. Jun. Sup. pl. pag. 432. Illy mallu. Rheed. Malab. part. 12. tab. 75. Cyperus littoreus. Rumph. Amb. 1. 10. c. 2. pag. 6. tab. 2. fig. 2.

† GENUS VI. OXYCARPUS.

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores.*

Cal. Perianthium campanulatum, tubo brevi: limbo 4-partito, laciniis concavis, sub-erectis.

Cor. Monopetala, campanulata, carnosa: limbo profundè 4-partito, laciniis ovatis, planis, patentibus, calycem superantibus.

Stam. Filamenta plurima, subulata, in varios fasciculos connexa. Antheræ biloculares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum, superum. Stylus nullus. Stigmata 6, multifida, reflexa.

Peric. Bacca sub-rotunda, 6-locularis, 1-sperma.

Sem. ovata, sub-compressa.

* *Masculi flores* in eadem plantâ.

Cal. ut Hermaphroditi.

Cor. ut Hermaphroditi: tubo longiore.

Stam. Filamenta vix ulla. Antheræ 40-50, ovato-oblongæ, biloculares, liberæ, receptaculo convexo infidentes.

Nom. (Ὀξύς acidus : καρπὸς fructus) ob arboris folia, & fructus acidos.

Char. Gener. Herm. Cal. 4-part. Cor. 4-partita. Stam. Polyadelpa.
Stigmata 6. Bacca 6-locul., 1-perma.
Masc. Cal. 4-part. Cor. 4-part. Stam. 40-50, libera.

† Sp. 1. OXYCARPUS COCHINCHINENSIS. a Cay Bii.
Differ. spec. Oxyc. foliis ovato-oblongis, oppositis : floribus congestis, axillaribus.

Hab. Arbor magna, trunco recto : ramis patentibus. Folia ovato-oblonga, sub-acuta, integerrima, glabra, nitida, obscuro-viridia, opposita, petiolata. Flos albus, lateralis, sub-fessilis, congestus 3-4-natus. Bacca 2-pollicaris, carnosa, rubro-lutea, acida, edulis.

Habitat tam cultus, quam incultus in Cochinchina.

Folium Acidum maius. Rumph. Amb. l. 4. c. 29. tab. 32.

GENUS VII. GEMELLA.

Descriptio Naturalis.

* Hermaphroditi flores.

Cal. Perianthium 4-phyllum : foliolis sub-rotundis, concavis, conniventibus.

Cor. Petala 4, turbinata, pilosa, inflexa, calyci æqualia.

Nectarium 4-lobum, æquale, concavum, discolorum.

Stam. Filamenta 8, subulata, corollæ æqualia, receptaculo infidentia. Antheræ ovatæ, biloculares, incumbentes.

Pist. Germe superum, globuli 2, basi styli utrinque adhærentes.

Stylus 2-fidus, reflexus. Stigmata acuta.

Peric. Baccæ 2, rotundæ, monospermæ, minimæ.

Sem. solitaria, rotunda.

* Masculi flores in eadem plantâ.

Cal. ut Hermaphroditi.

Cor., & Nectarium ut Hermaphroditi.

Stam. Filamenta 8, corolla duplò longiora, e centro Nectarii conjunctim prodeuntia. Antheræ totidem, ovatæ.

Nomen Gemella a fructu gemello.

Char. Gener. Herm. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Filam. 8. Stylus 2-fidus. Bacca 2, monospermæ.

Masc. Cal., & Cor. ut Hermaphr. Filamenta 8.

† Sp. 1.

- † Sp. 1. GEMELLA TRIFOLIA. *α* Cây Nhánh ba. *vo* *minibet*, *zēt*
 Differ. spec. Gem. *foliis* ternatis: *spicis* axillaribus.
 Hab. *Arbuseula* 5-pedalis: *ramis* flexuosis, patentibus. *Folia* ternata, ovato-lanceolata, inæqualiter serrata, glabra, petiolata. *Flos* albus, minimus; *spicis* longis, tenuibus, axillaribus. *Masculus*, & *Hermaphroditus* promiscuè in eadem spicâ.

GENUS VIII. ACER.

- Char. Gener. Herm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Pistillum* 1. *Capf.* 2, sive 3, monosperma, alâ terminata.
 Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 8. *Lin. sy. pl.* G. 1266.

- † Sp. 1. ACER PINNATUM. *α* Nhon cút đêc: Troang Khê.
 Differ. spec. Acer. *foliis* pinnatis: *foliolis* oblongis, integerrimis.
 Hab., & notâ. *Arbor* mediocris, ligno durissimo: *ramis* patentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-quadrifuga: *foliolis* alternis, ovato-oblongis, integerrimis, glabris, parvis. *Flos* albus, racemis compositis, sub-terminalibus, *Masculus*, & *Hermaphroditus* in eadem plantâ. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* petala 5, patentia: *Nectario* carnoso, lenticulari. *Filamenta* 8. *Stylus* 1. *Stigmatibus* binis. *Capsulae* duæ, ovatae, basi coalitæ, superius divergentes, alis singulis, oblongis, carnosis terminata. *Semina* solitaria, arillata.
 Habitat in sylvis Cochinchinae.
 Observ. Affinitatem habet cum Dimocarpo (supra Classe 8, Genere 10). Convenit quidem flore, & foliis, non Pericarpio.

GENUS IX. MIMOSA.

- Char. Gen. Herm. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 5, sive plura.
Pist. 1. *Legumen*.
 Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 5, 10, plura.
Lin. sy. pl. G. 1271.

- Sp. 1. MIMOSA NODOSA. *α* Cây cò đò.
 Differ. spec. Mim. inermis, *foliis* pinnatis, bijugis: *pinnis* inferioribus minoribus: *petiolo* lineari. *Lin. sp.* 3.
 Hab., & notâ. *Arbor* parva, *ramis* patentibus, inermibus. *Folia* pinnata, bijuga: *foliolis* ovatis, acuminatis, inferioribus minoribus: *petiolo* communi lineari, propriis sub-nullis. *Flos* albus, racemis diffusis, desinentibus in umbellulas: *stoculis* Hermaphroditis, &

& Masculis mixtis. *Calyx* utriusque tubulosus, 5-dentatus. *Corolla* 5-fida, laciniis ovatis: tubo calycem superante. *Filamenta* Monadelphica, 100 circiter. *Legumen* compressum, curvum: *seminibus* paucis.

Habitat agrestis in locis planis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 222. Phaseolus arboreus, tetraphyllus, Zeylanicus, Burm. Zeyl. pag. 192.

† Sp. 2. MIMOSA PILOSA. α Cay Up chén.

Differ. spec. Mim. inermis, *foliis* pinnatis, multijugis, pilosissimis: *capitulis* terminalibus: *leguminibus* rectis, tenuibus.

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, 4-pedalis, pilosus, inermis, *ramis* expansis. *Folia* simpliciter pinnata, multijuga: *foliolis* ovatis, orbiculatis, utrinque pilosis, inferioribus minoribus. *Flos* terminalis, conglobatus in capitulum magnum, albisimum. *Calyx* 5-fidus, erectus. *Corolla* campanulata, 5-fida. *Filamenta* numerosa, corollâ duplò longiora: *antheris* sub-rotundis, minimis. *Stylus* filiformis: *stigmatè* simplici. *Legumen* lineare, rectum, tenue, polyspermum. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Sp. 3. MIMOSA SCANDENS. α Tlām deei.

Differ. spec. Mim. inermis, *foliis* conjugatis, cirrho terminatis: *foliolis* bijugis. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *trunco* brevi, crassissimo, perenni: *ramis* plurimis, longissimis, scandentibus, inermibus. *Folia* bipinnata, cirrho longo terminata. *Foliola* sub-trijuga, ovata, sub-falcata, glabra. *Flos* albus, parvus, *spicis* simplicibus, strigosis, axillaribus. *Masculis* non invēni, sed omnes *Hermaphroditos*. *Calyx* cyathiformis, 5-dentatus, minimus. *Corolla* petala 5, lanceolata, patentia. *Filamenta* 10, turbinato-linearia, acuminata, corollâ duplò longiora: *Antheris* ovatis, 3-locularibus, nutantibus. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus: *stigmatè* simplici. *Legumen* maximum, sesquipedale, subulatum, compressum, curvum, articulatū, articulis orbiculatis, margine carinatis. *Semina* 10 circiter compresso-rotunda, magna: cortice proprio osseo.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ, vastum spatium occupans extensione ramorum.

Perim. kaku valli, Rheed. Malab. 8. pag. 59. tab. 32, 33, 34. Lobus Brasiliensis, ingens. Clus. Exot. l. 3. cap. 1. pag. 60. fig. ibi. Lens phaselojdes, foliis sub-rotundis, oppositis, flore spicato, 5-petalo, lobis latissimis; fructu orbiculato, fusco. Burm. Zeyl. pag. 139. Faba Marina Rumphii (Amb. l. 7. cap. 4. tab. 4.) tam descriptione, quam figurâ minus coheret.

Sp. 4. MIMOSA VAGA. α Cay tō dia.

Differ. spec. Mim. inermis: *foliis* bipinnatis: *pinnis* exterioribus maioribus, incurvatis, pubescentibus. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* expansis, inermibus. *Folia* bipinnata, *foliolis* sub-quinque jugis, ovatis, acutis, incurvatis, superioribus gradatim maioribus: *petiolis* linearibus, brevibus. *Flos* albus, Polygamus, sub-terminalis: *paniculâ* capitulis terminatâ. *Calyx*, & *corollâ* 5-fidæ. *Stamina* 20 circiter, *corollâ* longiora.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 223. Guabipoca cabiba. Pif. Brasil. l. 4. cap. 27. pag. 170. fig. ibi.

† Sp. 5. MIMOSA CORNICULATA. β Hōai hōa.

Differ. spec. Mim. inermis, bipinnata: *petiolis* basi tumidis, corniculo calloso innixis: *foliolis* sub-8-jugis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* patentibus, inermibus. *Folia* bipinnata, multijuga: *foliolis* sub-octojugis: *petiolo* communi basi incrassato, corniculo recurvo, calloso suffulto. *Flores* Masculi Monadelphii Polyandri: *calycibus*, & *Corollis* 4-fidis. Hermaphroditos non vidi. *Panicula* terminalis, desinens in cymas planiusculas, flosculis albis.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Sp. 6. MIMOSA ARBOREA. γ Yām mō.

Differ. spec. Mim. inermis, *foliis* bipinnatis: *pinnis* dimidiatis acutis: *caule* arboreo. Lin. sp. 22.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, *ramis* patentibus, inermibus. *Folia* bipinnata undecimjuga. *Foliola* plurimijuga, oblonga, sub-falciata, parvula. *Flos* Polygamus, terminalis, viridi-luteus, racemis laxis, desinentibus in umbellulas hemisphæricas, flosculis sub-fessilibus. *Calyces*, & *Corollæ* 5-fidæ. *Stamina* Polyandra, longissima. *Legumen* breve, sub-teres, seminibus paucis.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Thunb. Japon. pag. 229. Acacia non spinosa, Jamaicensis, foliis latâ basi in metæ formam fastigiatis. Pluken. Almag. 6. tab. 251. fig. 2.

† Sp. 7. MIMOSA STELLATA. α Cay tō dia.

Differ. spec. Mim. inermis, *foliis* stellatis, ternis: *capitulis* ovatis.

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, 8-pedalis: *ramis* inermibus, ascendentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, verticillata, ternâ. *Flos* Polygamus, terminalis, pallidus, capitulis sub-ovatis. *Corollæ*, & *Calyces* 4-fidi. *Stamina* 4. *Legumen* breve. Ha-

Habitat in montibus Cochinchinæ.

- † Sp. 8. MIMOSA FERA. α Tao giac: Nha tao. β Tláo kié.
 Differ. Spec. Mim. *aculeis* ramosis: *foliis* pinnatis: *floribus* spicatis.
 Hab., & notæ. *Arbor* magna, *ramis* patentibus: *aculeis* magnis,
 ramosis, rectis, sparsis. *Folia* impari-pinnata, sub-quinquejuga, *foliis*
 oblongo-ovatis, emarginatis, glabris. *Flos* pallidus, spicis
 longis, lateralibus, sparsis: *Masculus* multus, tenuior: Hermaphroditus
 rarior, ad basim spicæ. Utriusque *Corolla* quinquefida. *Stamina*
 10. *Legumen* 8-pollicare, curvum, planum, glabrum, fuscum,
 polyspermum. *Semina* ovata, compressa.
 Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ: scribitur quoque ad for-
 mandas sepes cuilibet animali horridas, & impenetrabiles.
 Virtus: valvarum leguminis. Attenuans, Stimulans, Purgans. Prodest
 maximè ad educendam pituitam crassam, aliosque humores visci-
 dos. In sternutatoriis, & suppositoriis validas exercet vires contra
 Apoplexiam, Hemiplexiam, Paralyfim.

- Sp. 9. MIMOSA FARNESIANA. α Hoa Xiem gai.
 Differ. Spec. Mim. *Spinis* stipularibus distinctis: *foliis* bipinnatis, par-
 tialibus octojugis: *spicis* globosis, sessilibus. Lin. sp. 34.
 Hab., & notæ. *Frutex* arboreus, cortice cinereo, ramis expansis.
Folia bipinnata, partialia 8, aut plurijuga: *spinis* stipularibus bi-
 nis, distinctis, brevibus, axillaribus, rectis. *Foliola* oblonga, mi-
 nuta, glabra, æqualia, coloris luteo-viridis. *Flos* aureus, odoratissimus,
 axillaris: *capitulis* globosis, semipollicaribus: *pedunculis*
 teretibus, triplo longioribus. *Flosculi* Maculi plures Hermaphroditis
 utrique, in eodem capitulo. *Corollis* 5-fidis: *staminibus* Polyandris.
Legumen teres, 3-pollicare, sub-curvum, polyspermum.
 Habitat culta in hortis Cochinchinæ, puto, quod non indigena.
 Mill. diction. n. 11.
 Observ. Mimosa Eburnea (Lin. Jun. sup. pag. 437) in multis cum
 nostrâ convenit: differt vero spinis longis, connatis, & pinnis pau-
 cioribus. Nostra capitulis florum gaudet pedunculatis, cum in Far-
 nesianâ fiat sessilia.

- Sp. 10. MIMOSA PENNATA. β Cây chám bia.
 Differ. spec. Mim. *aculeata*, *foliis* bipinnatis numerosissimis, linearis-
 acerosis: *paniculâ* aculeatâ: *capitulis* globosis. Lin. sp. 40.
 Hab., & notæ. *Frutex* magnus, procumbens, ramosus: *aculeis* mul-
 tis brevibus, sparsis. *Folia* bipinnata, supra decemjuga: *foliis*
 linearibus, circiter 40-jugis. *Flos* albus, Polygamus, *paniculâ* vaf-
 râ, diffusâ, terminali: *capitulis* plurimis, globosis, parvis. *Calyx*
 4-den-

4-dentatus. *Corolla* nulla. *Stamina* 100 circiter, tenuissima.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 224. *Acacia* aculeata, multiflora, foliis pennas avium referentibus. Burm. Zeyl. pag. 2. tab. 1.

Ufus. Cortex hujus plantæ Reitiariæ similis, maleis contusus in stupam vertitur, quâ commodè præcluduntur doliorum, & navium rimæ.

† Sp. 11. MIMOSA SINUATA. α Cây Kuong tán.

Differ. spec. Mim. aculeata, foliis bipinnatis, plurimijugis: capitulis axillaribus, solitariis: leguminibus sinuatis: caule scandente.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, ramosus, aculeatus, scandens. *Folia* bipinnata, multijuga: pinnis linearibus, plurimis, minimis. *Flos* axillaris, capitulis globosis, parvis, solitariis, pedunculis longis. *Calyx* tam hermaphroditi, quam masculi leviter 4-fidus, laciniis rotundatis. *Corolla* nulla. *Legumen* longum, rectum, sinuosum, compressum: seminibus oblongis, planiusculis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 12. MIMOSA SAPONARIA. α Cây Chu blen.

Differ. spec. Mim. inermis, foliis bigeminis, pinnatisque: paniculâ terminali.

Hab., & notæ. *Frutex* arboreus, ramis patentibus, inermibus. *Folia* irregularia, partim impari-pinnata, partim bigemina: foliolis ovatis, acuminatis, petiolatis. *Flos* terminalis, paniculatus. Notas exponere non audeo, quia florentem non vidi: videtur tamen affinis Mimosæ Bigeminæ, (Lin. sp. 4.) ideoque, staminibus Monadelphis, Polyandris.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Cortex saponarius. Rumph. Amb. l. 6. c. 72. tab. 66.

Ufus. Hujus cortex præbet optimum saponem, in foro venalem, ad lintea, capillos, & corpora a fordibus mundanda: manibus in aquâ fricatus in spumas resolvitur.

† GENUS X. NEPTUNIA.

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores.*, 30 circiter ad apicem spicæ.

Cal. Perianthium 5-fidum, breve, erectum.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 10, filiformia, longa. Antheræ biloculares, oblongæ, incumbentes.

Oooo

Pis.

Pist. Germen oblongum, superum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma longiusculum, tubulosum.

Peric. Siliqua tenuis, recta, sub-teres, polysperma, bivalvis.

Sem. aliqua, compressa.

* *Neutri flores ad basim spicæ.*

Cal. ut Hermaphroditi.

Cor. Petala 10, linearia, longiuscula, patentia.

Stam. Nullum.

Pist. Nullum.

Nom. Nepruniam vocavi plantam aquatilem, a terrâ prorsus remotam.

Char. Gen. Herm. Cal. 5-fidus. Cor. 0. Stam. 10. Stylus 1. Siliqua.

Neuter. Cal. 5-fidus. Cor. 10-petala. Stam. 0. Pist. 0.

Sp. 1. NEPTUNIA OLERACEA. Rau nhút.

Differ. spec. Nept. *foliis* bipinnatis: *spicis* brevibus, lateralibus.

Hab. *Herba* aquatica, perennis: *caule* longissimo, flexuoso, ramoso, tereti, crasso, flaccido, pallido: radicibus lateralibus, fasciculatis, brevibus, æquè distantibus: interruptis tumore spongioso, albo, levissimo, caulem circumdante. *Folia* bipinnata, foliolis multi-jugis, oblongis, obtusis, integerrimis, glabris, manè expansis, vespere imbricatis, sessilibus. *Corollæ* Eunuchorum luteæ. *Flosculi* omnes collecti in spicas sub-rotundas, coarctatas, receptaculo communi filiformi, pedunculo communi longo, tereti, tenui, erecto.

Habitat culta in Cochinchinâ, fluctuans in stagnis, & fluminibus lenti cursûs, ad palos alligata ne longè discedat. Radix a terrâ prorsus libera.

Suspicio eandem esse, quam Piso vocat Coapongam. Brasil. l. 4. cap. 58. pag. 243. fig. 1.

Ulus. Est olus frequens in acetariis, sapidum, tenerum, ac dulcescens: stomacho autem minus acceptum.

GENUS XI. PARIETARIA.

Char. Gen. Herm. Cal. 4-fidus. Cor. 0. Stam. 4. Stylus 1. Sem. 1, superum, elongatum.

Fœm. Cal. 4-fidus. Cor. 0. Stam. 0. Stylus 1. Sem. 1, superum, elongatum. Lin. sy. pl. G. 1259.

† Sp. 1. PARIETARIA COCHINCHINENSIS. α Thuốc giời. β Mau soi cöt.

Differ. spec. Par. *foliis* ovatis, trinerviis, pilosis: *caule* cespitose diffuso: *floribus* Monoicis.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, cespitosus, multiplex, tenuis, diffusus. *Folia* ovata, acuta, integerrima, 3-nervia, pilosa, parva, opposita, minoribus permixtis. *Flos* axillaris, verticillatus, glomerulis parvis, Masculis, & Fœmineis mixtis, Hermaphroditis nullis. *Calyx* 4-fidus. *Corolla* nulla. *Stamina* 4. *Stylus* 1. *Sem.* 1, sub-rotundum, calyce connivente clausum.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, in hortis minus cultis.

Ufus. Herba ista attrahit vermes, qui in piscibus, & carnibus muriâ conditis nascuntur: solentque indigenæ ad os doliorum hanc Parietariam appendere, ad quam vermes spontaneè ascendunt, & contenta in vasis cibaria ab illis faciliè purgantur.

Virtus. Emolliens, Refrigerans, Diuretica. Valet tam externè, quam internè sumpta.

DIOECIA.

† GENUS XII. PEDICELLIA.

*Descriptio Naturalis.** *Hermaphroditi flores.*

Cal. Perianthium 5-partitum, inferum, breve, laciniis acutis, reflexis.

Cor. nulla. Nectarium carnosum, 5-crenatum.

Stam. Filamenta 8, filiformia, reflexa, calyce triplo longiora. Antheræ biloculares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum, pedicellatum. Stylus sub-nullus. Stigmata 3, acuta, reflexa.

Peric. Capsula pedicellata, sub-rotunda, 3-valvis, 1-sperma.

Sem. 1, arillatum, pedicello proprio insistentem.

* *Masculini flores* in diversâ plantâ.

Cal. ut Hermaphroditi.

Cor. nulla. Nectarium ut Hermaphroditi.

Stam. Filamenta 8, sub-erecta, calyce triplo longiora. Antheræ biloculares, stantes.

Nom. a pedicellis propriis tam Capsulæ, quam Seminis.

Char. Gen. Herm. Cal. 5-part. Cor. 0. Stam. 8. Stigmata 3. Caps. 3-valvis. Semine 1, arillato, pedicellato.

Masc. Cal. 5-part. Cor. 0. Stam. 8.

† Sp. 1. PEDICELLIA OPPOSITIFOLIA. a Cây Trướng trướng.

Differ. spec. Pedic. fol. lanceolatis, oppositis: racemis terminalibus.

Hab. Arbor parva, ramis patentibus. Folia lanceolata, integerrima, gla-

glabra, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, racemis longis, terminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Affinitatem aliquam habet cum *Burserâ*. Lin. *sy. pl. G. 475.*

Nostri semper est *Polygama*, nec *Capfulam* profert carnosam.

GENUS XIII. PANAX.

Char. Gen. Herm. Umbella. *Cal. 5-dentatus*, superus. *Cor. 5-petala.*
Stam. 5. Styli 2. Bacca disperma.

Masc. Umbella. *Cal. integer. Cor. 5-petala. Stam. 5.* Lin.
sy. pl. G. 1280.

Sp. 1. PANAX FRUTICOSUM. α Cáy Ca la va: Đinh lang.

Differ. spec. Pan. *foliis* supra decompositis, dentato-ciliatis: *caule* fruticofo. Lin. *sp. 3.*

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, 6-pedalis: *caule* crasso, succoso, inermi: *ramis* obliquis. *Folia* bipinnata cum impari: *foliis* laciniato-ferratis, glabris: *petiolis* primariis longis, basi tumidis, amplexicaulibus, purpureis, lævibus. *Flos* rubro-viridis, terminalis, paniculâ diffusâ, in umbellas desinente, pedunculo longo, purpureo, striato. *Calyx* cyathiformis, limbo 5-dentato, minimo. *Petala 5*, oblonga, acuta, crassa, sulcata, revoluta. *Filamenta 5*, non raro 6 (sicut etiam petala) calyci infidentia, corollâ breviora. *Antheræ* oblongæ, biloculares, incumbentes, ante expansionem floris sulcis petalorum inclusæ. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigmata 3*, oblonga, erecta. *Bacca* calycina, sub-rotunda, 3-locularis: *seminibus* paucis sub-rotundis. Florem Masculum in eadem, vel distinctâ plantâ non inveni.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Scutellaria tertia. Rumph. *Amb. l. 6. c. 38. tab. 33.*

Virtus: radices, & foliorum. Diuretica. Prodest in Hydrope, Dysuriâ, Gonorrhœâ, Mistu cruento, Mensium difficultate. Plantæ odor gratus, sapor penetrans.

Observ. *Panax* *Quinquefolium* Canadense ab aliquibus creditur esse pretiosum *Gin sên* Chinense: de quo licet dubitare. Ego hoc curiosè quæsi, nec potui obtinere. Habui semina ex Tartariâ, quæ terræ commissa non germinarunt. In herbariis, & iconibus Sinenfibus planta videtur foliis quinatis, non ternis, petiolis longis, sparsis: foliolis lato-lanceolatis, integerrimis. *Flos* rubescens, umbellâ terminali. Fructus continet 7-8 semina, sub-rotunda, umbilicata, grano piperis parum maiora, fusca, substantiæ cornæ. Virtus radices Sinenfis multum differt a Canadensis, prout ipsemet expertus

tus sum; ideo hæc apud Sinas non caro venditur sicut illa: nec etiam formâ periti Medici, aut Mercatores decipi possunt. *Sium Nisi* est planta omnino diversa, nec pretiosa.

† GENUS XIV. HEPTACA.

*Descriptio Naturalis.** *Hermaphroditi flores.*

Cal. Perianthium 3-phyllum: foliolis ovatis, concavis, patentibus.

Cor. Petala 10, ovato-oblonga, sub-rotata, calyce longiora.

Stam. Filamenta 100 circiter, filiformia, Corollâ breviora. Antheræ lineares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus crassus, æqualis staminibus. Stigma 7-partitum, laciniis canaliculatis, patentibus.

Peric. Bacca sub-rotunda, 7-locularis, polysperma.

Sem. Sub-rotunda,

* *Masculini flores* in distinctâ plantâ.

Cal. Corollâ, Stamina ut Hermaphroditi. Pist. nullum.

Nom. (Ἑπτὰχῆ Septifariam) a Baccâ in 7 loculos divisâ.

Char. Gen. Herm. Cal. 3-phyllus. Cor. 10-petala. Stam. 100. Pist.
1. Bacca 7-locularis, polysperma.

Masc. Cal. 3-phyllus. Cor. 10-petala. Stam. 100. circiter.

† Spec. 1. HEPTACA AFRICANA. γ Μυ καο καο.

Differ. spec. Hept. *foliis* ovatis, alternis: *pedunculis* polyfloris, lateralibus.

Hab. *Arbor* parva: *ramis* expansis. *Folia* ovata, integerrima, venosa, alterna, glabra, petiolata. *Flos* albus, pedunculis polifloris, lateralibus. *Bacca* viridis, diametro bipollicari.

Habitat in sylvis Africæ Orientalis.

GENUS XV. CHAMÆROPS PALMA.

Char. Gen. Herm. Cal. 3-partitus. Cor. 3-petala. Stam. 6. Pist. 3.

Drupæ 3, monospermae.

Masc. Dioici, ut in Hermaphrodito. Lin. sy. pl. G. 1335.

† Sp. 1. CHAMÆROPS COCHINCHINENSIS. α Cay Lui.

Differ. spec. Cham. *frondibus* palmatis, plicatis, stipitibus spinosis: *spatbis* partialibus: *corollis* monopetalis.

Hab.

Hab., & notæ. *Palma* caule 8-pedali, diametro pollicari, recto, æquali, nodis propinquis. *Stipites* longi, tenues, spinosi, spinis brevibus, rectis, sparsis. *Fronde*s turbinatæ, palmatæ, laciniis oblongis, obtusis, polyplacatis, parvis. *Flos* Polygamus, Dioicus: spadice ramoso, brevi, erecto: *Spathis* partialibus (nec univertali) lanceolatis, spadice brevioribus. *Calyx* 3-phyllus, foliolis acutis, curvis, erectis, brevibus. *Corolla* monopetala, cyathiformis, trigona: limbo 3-fido, inflexo, minimo. *Filamenta* 6, brevissima, limbo Corollæ infidentia: *Antheris* sub-rutundis, minutis. *Pistilla* 3. *Drupæ* 3, ovatæ, parvæ, exsuccæ, inedules. *Masculi* Calyx, Corolla, Stamina ut Hermaphroditi.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Usus. Fronde aptantur ad tegendas domos, & construenda palia solem, & pluviam repulfura.

† GENUS XVI. GONUS.

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores*, racemis brevibus.

Cal. Perianthium, 4-phyllum inferum, deciduum: foliolis ovatis, pilosis, expansis.

Cor. Petala 4, ovata, patentia, Calyce longiora.

Stam. Filamenta 4, brevissima. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen 4-gonum. Stylus nullus. Stigmata 4, oblonga, reflexa.

Peric. Drupæ 4, ovatæ, monospermæ.

* *Masculi flores*, racemis simplicibus, longissimis in eadem, vel diversâ plantâ.

Cal. Perianthium 4-phyllum, coloratum: foliolis ovatis, pilosis, patentibus.

Cor. Petala 4, ovata, patentia, Calyce longiora.

Stam. Filam. 4, Corollâ breviora. Antheræ biloculares, sub-rotundæ.

Nom. (Γόνος soboles) ob multiplicem sobolem, quatuor scilicet Drupas ex eodem flore prodeuntes.

Char. Gen. Herm. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Stam. 4. Pist. 4. Drupæ 4.

Masc. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-petala. Stam. 4.

Sp. 1. GONUS AMARISSIMUS. α Sâu dàu rừng. β A tám tsào.

Differ. spec. Gon. foliis pinnatis, ferratis, pilosis: Caule fruticoso.

Hab. Frutex 8-pedalis: caule erecto, recto, sub-simplicissimo. Folia im-

impairi-pinnata, sub-sexjuga: *foliis* lanceolatis, serratis, utrinque pubescentibus, oppositis, petiolatis. *Flos* pallidus, parvus: Antheris ruberrimis: *spicis* erectis, tenuibus, sub-terminalibus. Sapor totius plantæ amarissimus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Lussa Radja. Rumph. Amb. Auct. cap. 36. tab. 15.

Virt. Radicis, & Drupularum. Diaphoretica, Alexiteria, Antifebrilis, Anthelminthica. Videtur idem esse pharmacum, quod a Lusitanis vocatur Radix de Solor; quia in insulâ Solorâ nascitur, sicut etiam in Timorâ, & in Indiâ magni est usus.

GENUS XVII. ZANTHOXYLUM.

Char. Gen. Masc. Cal. 5-partitus. Cor. 0

Fœm. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Pist. 5. Caps. 5, monospermae. Lin. fy. pl. G. 1213.

Sp. 1. ZANTHOXYLUM CLAVA HERCULIS. α Cây Múong trấuing.

β Sô.

Differ. spec. Zanth. *foliis* pinnatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Arbor 10-pedalis: *caule* inferiore septo verrucis acuminatis, crassis, brevibus: *ramis* patentibus: aculeis plurimis acutissimis, curvis, parvis, sparsis. *Folia* impari-pinnata, multijuga: *foliis* lato-lanceolatis, inæqualiter crenatis, parvis. *Flos* Polygamus, Dioicus, *Corollâ* albâ, maculis rubris conspersâ. *Hermaphroditii Calyx* 5-dentatus, inferus, minimus. *Corolla* petala 5, ovata, concava, conniventia. *Filamenta* 5, subulata, corollâ breviora. *Antheræ* 10, sub-reniformes, binæ in quolibet Filamento. *Germen* bilobum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 2, oblonga. *Fœminei* floris in diversâ plantâ *Calyx*, *Corolla*, & *Germen* ut Hermaphroditii. *Stylus* nullus. *Stigma* unum, magnum, orbiculatum, quadrifidum, utriusque lobo Germinis inhærens. *Pericarpium* tam Hermaphroditii, quam Fœminæ *Capsulæ* duæ, globosæ, punctato-scabræ, 1-spermae, bivalves, apice dehiscentes. *Semina* sub-reniformia, solitaria, pedicello proprio ex Capsulis exerta. Lignum arboris durum, pallidum. Radix ramosa, insipida: cortice exteriori suberoso, flavo: interiore fusco, inodoro. Flos uterque paniculâ laxâ, terminali.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Observ. Diversi Auctores huic plantæ diversas notas attribuerunt. Ideo Celeb. Linnæus ulterius, & acuratus examen autoptis commendat. Ego iteratis observationibus semper Polygamam Dioecam inveni in Indiâ, Corollâ 5-petalâ, Filamentis 5, Germine didymo,

mo, stylis binis, Capsulis duabus, monospermis: per quæ proximè accedit ad observata Gronovii. Virgin. 47. & Clifort. pag. 487. Virtus: radice. Pellens, Stomachica, Antifebrilis.

† GENUS XVIII. RHYTIS.

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores.*

Cal. Perianthium 3-6-partitum, laciniis obtusis, patentibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 3, filiformia, erecta, calyce longiora, receptaculo inhaerentia. Antheræ bilobæ.

Pist. Germen longiusculum, superum. Stylus nullus. Stigmata 3, bifida, reflexa.

Peric. Bacca compresso-ovata, rugosa, flaccida, monocularis, 3-sperma.

Sem. ovata, parva.

* *Fœminei flores* in diversâ plantâ.

Cal. Perianthium multipartitum, laciniis lanceolatis, pilosis, patentibus.

Cor. nulla.

Stam. nulla.

Pist. Germen, Stylus, & Bacca ut Hermaphroditi.

Nom. (Puris ruga) a Bacca rugosa.

Char. Gen. Herm. Cal. 3-6-partitus. Cor. o. Stam. 3. Stigm. 3. Bacca 3-sperma.

Fœm. Cal. multipart. Cor. o. Stigmata 3. Bacca 3-sperma.

Sp. I. RHYTIS FRUTICOSA. α. Cây Chối mòi.

Differ. Spec. Rhy. *foliis* oblongis, integerrimis, alternis: *spicis* terminalibus.

Hab. *Frutex* 6-pedalis, lignosus, sub-erectus, ramis expansis. *Folia* ovato-oblonga, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna. *Flos* spicis longis, tenuibus, congestis, terminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS XIX. BACCAUREA.

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores* : racemis parvis.

Cal. Perianthium 5-partitum, inferum : laciniis ovatis, inflexis, carnosis, persistentibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 6-8, brevissima, receptaculo inserta. Antheræ subrotundæ, 2-loculares.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus nullus. Stigma concavum, laciniatum.

Peric. abortiens.

* *Feminei flores* in aliâ plantâ : racemis triplô maioribus.

Cal. Perianthium 5-phyllum : foliolis oblongis, carnosis, inflexis.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus nullus. Stigma magnum, lenticulare, papillosum.

Bacca sub-rotunda, succosa, 3-locularis, 2-sperma.

Sem. ovata, sub-compressa.

Nom. a Bacca aurei coloris.

Char. Gen. Herm. Cal. 5-partitus. Cor. o. Stam. 6-8. Stigma concavum. Pericarpium abortiens.

Fœm. Cal. 5-phyllus. Cor. o. Stigma convexum. Bacca 3-locularis.

† Sp. 1. BACCAUREA RAMIFLORA. a Giu tien.

Differ. spec. Bac. ramis, & summo caule fructificantibus : baccis glabris.

Hab. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia ovato-oblonga, acuminata, integerrima, sparsa, petiolata. Flos viridi-luteus, racemis simplicibus, pendulis ex ramis maioribus, & summo caule. Bacca 1-pollicularis, coloris aurei, inodora, acridulcis, edulis, glabra, 3-locularis.

Habitat frequens in hortis Cochinchinæ.

Nani hua. Rumph. Amb. l. 4. pag. 21. tab. 9. ex Auftuario.

† Sp. 2. BACCAUREA CAULIFLORA. a Giu dat.

Differ. spec. Bac. imo caule fructificante : baccis glabris.

Hab., & notæ. Caulis, & folia ut primæ speciei. Flos similis, racemis simplicibus ex inferiore caule pendentibus, nec ex ramis. Bacca sub-rotunda, glabra, 3-locularis, fusco-purpurea, acida, edulis.

Pppp

Habi-

Habitat in hortis Cochinchinæ minus frequenter culta.

Sp. 3. **BACCAUREA SYLVESTRIS.** a Cay Lon bon.

Differ. spec. Bac. ramis fructificantibus: *baccis* tomentosis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, præcedentibus maior, ramis obliquis. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, subius pubescentia, sparsa, petiolata. *Flos* racemis simplicibus ex ramis (non caule) pendentibus. *Calyx* laciniis brevibus, patentibus. *Bacca* fusco-lutea, tomentosa, sub-rotunda, 5-locularis, 1-sperma. Sapor dulcis, gratissimus, si fructus ex arboribus aggregatis decerpatur: acidus vero, & ingratus, si ex cultis.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Observ. Omnes tres species sæpe inconstantes inveniuntur numero loculorum, & feminum.

† GENUS XX. *PHYSKIUM.*

Descriptio Naturalis.

* *Hermaphroditi flores* solitarii: pedunculis omnium longissimis.

Cal. Perianthium tubulosum, longum, 2-fidus: laciniis rotundatis, erectis.

Cor. Petala 3, supera, ovata, patentia, persistentia.

Stam. Filamenta 6, brevissima. Antheræ ovatae, stantes.

Pist. Germen lineare, inter Calycem, & Corollam. Stylus crassus, brevis. Stigmata 3, reflexa, apice acuto, bipartito.

Peric. Folliculus cylindricus, longus, tenuis, 1-locularis, coronatus stigmatibus, & petalis permanentibus.

Sem. plurima, oblonga, Folliculi cavitati adhaerentia.

* *Feminei flores* in aliâ plantâ: pedunculis crassis, brevibus.

Cal. nullus.

Cor. nulla.

Pist. Germen conicum. Stylus nullus. Stigma pori aliqui ad apicem Germinis.

Peric. Folliculus conicus, brevis, 1-locularis, polyspermus.

Sem. Multa, globosa, receptaculo subulato adhaerentia.

Nom. (Φυσκίον folliculus) a folliculis Pericarpîi.

Char. Gen. Herm. Cal. 2-fidus. Cor. 3-petala. Stam. 6. Pist. 1. Follic. cylindricus, polyspermus.

Fem. Cal. 0. Cor. 0. Pist. 1. Follic. conicus, polyspermus.

† Sp. 1.

- † Sp. I. **PHYSKIUM NATANS.** α Raong mai cheo.
 Differ. spec. Physk. acaule, *foliis* ensiformibus: *floribus* solitariis.
 Hab. *Planta* aquatica, perennis, caule nullo. *Folia* ensiformia, bipedalia, integerrima, glabra, molliufcula. *Flos* viridis, pedunculis 1-floris, solitariis.
 Habitat in fluviis lenti cursûs in Cochinchinâ.
 Observ. Convenit cum Genere Najas (Lin. G. 1198.) Calyce Masculi cylindrico, 2-fido: Fœminæ Calyce, & Corollâ 0, Pistillo 1. fructu 1-loculari. Differt flore Polygamo, Filamentis 6, Corollâ 3-petalâ, fructu polyspermo. Convenit etiam cum Triglochis (Lin. G. 488.) Corollâ 3-petalâ, Filamentis 6, Stigmatibus 3: differt flore Polygamo, calyce 2-fido, aut nullo, fructu 1-loculari evalvi
 Omnes istæ plantæ sunt aquaticæ.

† GENUS XXI. DICALIX.

*Descriptio Naturalis.** *Hermaphroditi flores.*

Cal. Perianthium duplex, exterius 3-phyllum, foliolis acutis, inflexis: interius 5-dentatum, breve: utrumque persistens.

Cor. Rotata, 5-partita, laciniis ovatis, calyce longioribus.

Stam. Filamenta 100 fere, capillaria, corollæ inhaerentia, ipsâ longiora. Antheræ biloculares, sub-rotundæ.

Pist. Germen sub-rotundum: Stylus crassus, turbinatus, brevior staminibus. Stigma obtusum.

Peric. Drupa parva, 1-sperma, coronata calyce interiore, exteriore suffulta.

Sem. Nucula collo constricta, lagenæ-formis, monocularis.

* *Fœminei flores in distinctâ plantâ.*

Cal. duplex, ut Hermaphroditi.

Cor. nulla.

Pistillum, & Pericarpium ut Hermaphroditi.

Nom. a duplici Calyce, altero sustinente Drupam, altero coronante.

Char. Gen. Herm. Cal. duplex. Cor. rotata. Filam. 100 fere. Pist. 1. Drupa inter duos calyces.

Fœm. Cal. duplex. Cor. 0. Stylus 1. Drupa.

Sp. I. **DICALIX COCHINCHINENSIS.** α Cay Deung hêp.

Differ. spec. Dic. *foliis* lanceolatis: *spicis* sub-terminalibus.

Hab. *Arbor* magna: *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata, leviter

ferrata, glabra, alterna. *Flos* albus, racemis simplicibus, sub-terminalibus.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinae.

Arbor Rediviva. Rumph. Amb. l. 5. c. 19. tab. 104.

Ulus. Tigna præbet ad ædificia.

TRIOECIA.

GENUS XXII. FICUS.

Char. Gen. Receptaculum commune turbinatum, carnosum, connivens, occultans flosculos vel in eodem, vel in distincto.

Malc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. Stam. 3.

Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Pist.* 1. *Sem.* 1. Lin. sy. pl. G. 1283.

Sp. 1. FICUS CARICA. β Mão hōa qua. α Sung tab.

Differ. spec. Fic. *foliis* palmatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis reclinatis. *Folia* palmata, magna, venosa, aspera, sparsa, petiolata. *Fructus* turbinatus, 2-pollicaris, lævis, nigricans, intus ruber, dulcis, edulis, pedunculis brevibus lateralibus.

Habitat culta in Chinâ: raro in Cochinchinâ, a Sinis delata.

Thunb. Jap. pag. 32. Ficus communis. Bauh. Pin. pag. 457. Ficus factiva, fructu atro-rubente. Tourn. Inst. app. pag. 663. tab. 420.

Sp. 2. FICUS SYCOMORUS. α Cay Sung.

Differ. spec. Fic. *foliis* cordatis, sub-rotundis, integerrimis, subtus tomentosis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: ramis tortuosis, ascendentibus: ligno levi, rubescente, tenacissimo, tam fœco, quam ædificiis inepto.

Folia ovata, sub-cordata, sub-acuta, integerrima, subtus tomentosa, parva, petiolata, sparsa. *Fructus* pollicaris, turbinato-rotundus, fusco-purpureus: racemis longis, pendentibus ex caudice, & ramis maioribus. *Fructus* isti dulces sunt, & hominibus edules essent, nisi semper, quamprimum maturescunt, innumeris scaterent vermibus; adeoque in cibum quotidianum cedunt simiis, psittacis, & aliis avibus.

Habitat agrestitis in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 225. Sycomorus. Matth. in Diosc. l. 1. cap. 44. fig. ibi. pag. 232. Ficus Indica, tiliæ folio, subtus albo, & viloso. Pluk. Phyt. tab. 178. fig. 3.

Sp. 3. FICUS RELIGIOSA. α Cay Bo dc.

Differ.

Differ. spec. Fic. *foliis* cordatis, oblongis, integerrimis, acuminatissimis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: trunco brevi: *ramis* longissimis, patentissimis. *Folia* ovata, acuminata, cordata, integerrima, glabra. *Fructus* sub-rotundus, tri-linearis, binatus, sessilis, axillaris, flavus, punctatus.

Habitat agrestis loca plana Cochinchinæ.

Burm. Ind. p. 225. Ficus Malabariensis, folio cuspidato, fructu rotundo, parvo, gemino. Pluk. Almag. 144. t. 178. fig. 2. Arbor Zeylanica Religiosa, foliis perpetuo mobilibus. Burm. Zeyl. p. 29.

Sp. 4. FICUS BENGHALENSIS. a Cây Dĩa tron lá.

Differ. spec. Fic. *foliis* ovatis, integerrimis, obtusis: *caule* infernè radicato. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: inferiori trunco supra terram radices emitte: *ramis* expansis, reclinatis. *Folia* ovata, obtusa, magna, integerrima, alterna, dura, petiolata, partim integerrima, partim leviter serrata. *Fructus* minutus, sub-rotundus, axillaris, binatus, sessilis, fusco-ruber.

Habitat agrestis loca plana Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 225. Ficus Benghalensis, folio sub-rotundo, fructu orbiculato. Commel. H. Amst. 1. pag. 119. tab. 62.

Virt. Foliorum. Deobstruens: valet contra Hydropem.

Sp. 5. FICUS INDICA. a Cây Sanh.

Differ. spec. Fic. *foliis* lanceolatis, integerrimis, petiolatis: *pedunculis* aggregatis: *ramis* radicanibus. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Arbor* magna: *ramis* latissimè expansis, radices crassas in terram demittentibus. *Folia* sub-lanceolata, parva, acuminata, integerrima, utrinque lævia. *Fructus* sub-rotundus, minimus, rubro-fuscus: *pedunculis* lateralibus, aggregatis.

Habitat loca plana Cochinchinæ.

Plin. Hist. Nat. l. 12. c. 5. Cluf. Exor. l. 1. cap. 1. fig. pag. 2. Burm. Ind. pag. 225.

Sp. 6. FICUS BENJAMINA. a Cây Kưa.

Differ. spec. Fic. *foliis* ovatis, acuminatis, transversè striatis, margine lævi. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, trunco brevi, crasso, informi: *ramis* longis, reclinatis, filamenta plurima, gracilia, intricata in terram demittentibus, ibique radicanibus. *Coma* densissima. *Folia* ovata, sub-acuta, integerrima, striata, glabra, parva, petiolata, alterna. *Fructus* axillaris, minimus, 2-3-natus, sessilis, compresso-rotundus, lævis,

lævis, nigricans. *Calycæ* communi 3-phylo.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ.

Varieta Parvifolia, humilis. Rumph. Amb. I. 5. cap. 5. pag. 140. tab. 90. Ficus Arbor, densioribus foliis, parvis, integris. Pluk. Phyt. tab. 243. fig. 4.

Virtus. Filamenta illa ex ramis pendentia dicuntur antidotum præstare contra venenum telorum, & animalium, si masticata partim deglutiantur, partim vulnere imponantur: quod ipse non probavi.

Observ. Fabulosum est in hac arbore inveniri pretiosum Agallochum, vel flores aliquos conspicuos. Certum tamen est circa annum 1742 inventum fuisse in Ficu Sycomoro magnum racemum florum luteorum, vel quiddam simile in urbe Hueâ Cochinchinæ metropoli. An autem fuerint veri flores? testari non valeo: quia tunc longè aberam prope Cambodiam. Indigenæ multi, qui viderant, indubitanter affirmabant, arboremque monstrabant: imo ipse, qui racemum collegerat, obtuleratque Regi, mihi factum exposuit; propter quod ab ipsomet Rege, nescio quid inde felicitatis auspicante, in ducem cohortis assumptus fuerat ex simplici milite, qui tunc erat.

† Sp. 7. FICUS AURICULATA. « Cây Bã.

Differ. spec. Fic. *foliis* cordatis, acuminatis: *fructu* auriculato, racemoso, terminali.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis obliquis. *Folia* cordata, acuminata, sub-ferrata, tomentosa, magna, sparsa, petiolata. *Fructus* turbinatus, 2-pollicaris, lævis, intus, & extra ruber: *racemis* congestis, erectis, terminalibus: *Calycibus* receptaculi 3-phyllis, persistentibus. Præter apicem pertusum Generis proprium, ad humeros fructus patent 4 foramina inter se distantia, cartilagine quâdam prominente circumvallata, auriculas repræsentantia.

Habitat culta in Cochinchinâ: puto, quod etiam agrestis.

Usus. Fructus necdum maturi, in frustra concissi cucumeres sapore æmulantur, & in acetariis placent.

Caprificus Amboinensis, Esculenta (Rumph. Amb. I. 5. cap. 7. tab. 93.) in plerisque notis cum nostrâ convenit, quamvis differat fructu minore, laterali, nec auriculato.

Sp. 8. FICUS MACULATA. « Cây Ngáy.

Differ. spec. Fic. *foliis* oblongis, acuminatis, ferratis. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, caule, & ramis erectis. *Folia* ovato-lanceolata, ferrata, aspera, magna, alterna, petiolata. *Fructus* mediocris, turbinatus, fuscus, axillaris, solitarius.

Habitat frequenter ad sepes, & ripas fluminum in Cochinchinâ.

Fi.

Ficus Montana, foliis oblongis, repando-serratis, fructu minimo.
Burm. Ind. pag. 226. Ficus Castaneæ folio, fructu globoso, maculato. Plum. Spec. 21. ic. 131. fig. 1.

† Sp. 9. FICUS SEPTICA. α Cây Láu chố.

Differ. spec. Fic. foliis lanceolatis, integerrimis, asperis: fructu axillari, solitario.

Hab., & notæ. Frutex 8-pedalis, erectus, ramis diffusis. Folia lato-lanceolata, integerrima, aspera, sparsa, petiolata. Fructus oblongo-turbinatus, rugosus, flaccidus, lateralis, pedunculis brevibus, simplicibus, solitariis. Color fructus rubro-viridis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Rumph. Amb. l. 5, cap. 11. tab. 96. Burm. Ind. pag. 226.

Virtus. Lac hujus plantæ habet vim Septicam, quæ ulcerum carnes putridas exedit, ac vermes enecat.

Sp. 10. FICUS PUMILA. α Dèi Xóp xóp.

Differ. spec. Fic. foliis oblongo-ovatis, acutis, integerrimis, subtus reticulatis: caule articulado, repente. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. Frutex, caule procumbente, longo, simplici, articulado, parum ramoso. Folia oblongo-ovata, acuta, integerrima, reticulato-aspera, sparsa. Fructus sub-rotundus, parvus, croceus, spicibus terminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 226. Thunb. Japon. pag. 33. Varinga repens. Rumph.

Amb. l. 5. c. 2. Nostra differt, caule quidem procumbente, sed non repente, ac fructibus terminalibus, spicatis. Anne diversa species?

† Sp. 11. FICUS POLITORIA. α Cây Bả chó: Cây Ngaoóng.

Differ. spec. Fic. foliis oblongo-ovatis, integerrimis, scabris: fructu sub-rotundo, spicato: caule erecto.

Hab., & notæ. Frutex 6-pedalis, erectus, ramosus. Folia oblongo-ovata, sub-acuta, integerrima, parva, scabra, petiolata, sparsa. Fructus minimus, sub-rotundus, croceus, spicatus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Folium Politorium. Rumph. Amb. l. 6. c. 69. tab. 63. Ficus Ampelos Burm. Ind. pag. 226.

Usus. Exsiccata folia idonea sunt ad polienda parva opera lignea, vel eburnea, quæ illorum scabritie fricta lavigantur.

† Sp. 12. FICUS SIMPLICISSIMA. α Côm ngouí chia lí.

Differ. spec. Fic. foliis palmatis: caule simplicissimo: fructu compresso.

Habi.

Hab., & notæ. *Frutex* 5-pedalis, caule erecto, recto : *ramis* nullis. *Folia* palmata, aspera, magna, petiolata, sparsa. *Fructus* sphaeroides, croceus, parvus, sessilis, axillaris, solitarius.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 13. FICUS CANNABINA. a Cay Gièi.

Differ. spec. Fic. *foliis* caulinis hastatis, incisus : *rameis* ovato-lanceolatis, sub-ferratis : *caule* sub-erecto.

Hab., & notæ. *Frutex* 6-pedalis : *caule* sub-erecto, ramoso : *cortice* glabro, connabino. *Folia* inferiora, sub-hastata, incisa : superiora ovato-lanceolata, leviter ferrata, omnia asperrima, petiolata, sparsa. *Fructus* ovali-turbinatus, pedunculis longis, simplicibus, solitariis, lateralibus : *calyce* 3-fido, laciniis rotundatis.

Habitat loca plana, & agrestia Cochinchinæ.

Observ. Linnæus Filius (Sup. pl. pag. 442.) Ficum Heterophyllum affert ex Konigio, cujus folia cum nostris non conveniunt, sicut nec caulis flexuosus, hispida. Caprificus Chartaria Rumphii (Amb. l. 5. c. 8.) ad nostram quodammodo accedit, præcipue cortice cannabino, tenaci, qui in telas extendi potest, quibus multi insulani maris Australis satis commodè vestiuntur. Omnes species Ficus, quas retuli, abundant humore albo, lactis simili. Omnes intra receptaculum carnosum reconduat flosculos Masculos, vel Fœminas, vel utrosque simul, quos in paucis curiosè examinavi : idemque receptaculum commune in omnibus invenitur umbilicatum, & pertusum.

CLASSIS XXIV.
CRYPTOGAMIA.

FILICES.

* *Frustrificationes spicatae.*

1. EQUICETUM. *Spica sparsa. Frustrificationes peltatae: basi valvulatae.*
2. OPHIOGLOSSUM. *Spica articulata. Frustrificationes circumscissae;*

** *Frustrificationes frondosae in pagina inferiore.*

3. ACROSTICHUM. *Macula Discum totum occupans.*
4. POLYPODIUM. *Puncta disci distincta.*
5. ASPLENIUM. *Linea disci sub-parallelæ, variæ.*
6. PTERIS. *Linea marginis ad perepheriam.*
7. ADIANTUM. *Maculae apicum margine reflexo obtectæ.*
8. TRICHOMANES. *Frustrificationes solitariae margini ipsi insertæ.*

MUSCI.

* *Acalyptrati.*

9. LYCOPODIUM. *Anthera bivalvis, sessilis.*
10. PORELLA. *Anthera pertusa poris.*
11. SPHAGNUM. *Anthera ore lævi.*

** *Calypttrati monoclini.*

12. BRYUM. *Anthera pedunculo terminali e tuberculo.*
13. FONTINALIS. *Anthera sessilis, Perichætio imbricato obvoluta.*

ALGÆ.

* *Terrestres.*

14. LICHEN. *Fr. receptaculo lævi, nitido;*
 15. BYSSUS. *Substantia lanuginosa.*

** *Aquaticæ.*

16. ULVA. *Alga membranacea.*
 17. FUCUS. *Alga coriacea.*
 18. CONFERVA. *Alga capillaris.*

F U N G I.

19. AGARICUS. *Pileus subtrus lamellatus.*
 20. BOLETUS. *Pileus subtrus porosus.*
 21. HYDNUM. *Pileus subtrus echinatus.*
 22. PHALLUS. *Pileus subtrus lævis.*
 23. CLATHRUS. *Fungus cancellatus.*
 24. HELVELLA. *Fungus turbinatus.*
 25. PEZIZA. *Fungus campanulatus.*
 26. CLAVARIA. *Fungus oblongus.*
 27. LYCOPERDON. *Fungus globosus.*
 28. MUCOR. *Fungus vesicularis, stipitatus.*

FILICES.

GENUS I. EQUICETUM.

Char. Gener. *spica* fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvi. Lin. fy. pl. G. 1284.

Sp. 1. EQUICETUM ARVENSE. β Mã hoàm. α Ma hoàng.

Differ. spec. Equic. *scapo* fructificante nudo: sterili frondoso. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Herba Dioica, perennis. *Caulis* monopetalis, multiplex, erectus, teres, tenuis, articulatus, inanis, flavescens, lævis, ramosus: *ramis* plerumque trichotomis, fœmineis nudis, masculis frondosis. *Fructificatio* terminalis: *capsulis* monocularibus, polyspermis in Fœminâ: *antheris* plurimis im Masculo.

Habitat incultum in agris Sinensibus.

Thunb. Jap. pag. 328. Equicetum Arvense longioribus fetis. Bauh. Pin. pag. 16. n. 9.

Virt. radicis: sub-astringens. *Caulis*, rejectis geniculis: Pellens, Diaphoretica.

Sp. 2. EQUICETUM HYEMALE. β Mõ cẽ. α Mõuc tĩc.

Differ. spec. Equicetum *caule* nudo, scabro, basi sub-ramoso. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Planta* palustris: *radice* perenni, repente. *Caulis* herbaceus, 3-petalis, erectus, simplicissimus, crassiusculus, teres, articulatus, inanis, striatus, scaber, cinereus: *stipulis* cylindricis, vaginantibus, polyfidis. *Folia* nulla. *Fructificatio* terminalis: *spicæ* oblongâ, densâ: *antheris*, & *capsulis* subfessilibus, multis: *petalis* nullis.

Habitat loca paludosa Sinarum.

Thunb. Jap. pag. 328. Equicetum foliis nudum, non ramosum. Bauh. Pin. pag. 16. n. 10.

Virt. totius herbæ. Sub-astringens.

Usus. *Caulis* magnâ asperitate præditus utilis est ad polienda quælibet opera, imprimis tornata ex ligno, cornu, eburne, vel metallo.

GENUS II. OPHIOGLOSSUM.

Char. Gener. *spica* articulata, disticha: *articulis* transversim dehiscentibus. Lin. fy. pl. G. 1288.

Sp. 1. OPHIOGLOSSUM LUSITANICUM. α Thạch vi. β Xê úi.

Differ. spec. Oph. fronde lanceolata. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Herba* annua, acaulis, 2-pollicaris, erecta. *Folium* unicum, petiolatum, lanceolatum, acutum, integerrimum, glabrum, longitudine triplâ excedens latitudinem. *Frustrificatio spica* folitaria, basi folii adnata, simplex, linearis, compressa, recta, æqualis, utrinque divisa crenis multis lateralibus, pollinem flavum emittentibus. An autem hoc verum pollen sit, aut potius femina minutissima prætermisi microscopio indagare.

Habitat loca plana, & humida Gochinchinæ, & Chinæ tempore autumnali, ac citò periens.

Ophioglossum pumilum, autumnale. Grisl. Virid. Lusit. Ophioglossum angulifolium, minimum. Barr. Rar. 1280. tab. 252. fig. 2.

Sp. 2. OPHIOGLOSSUM SCANDENS. β Xê úi tã. α Thạch vi deei.

Differ. spec. Oph. caule flexuoso, tereti: *frondibus* conjugatis, pinnatis: *foliis* utrinque spiciferis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, longus, tenuis, teres, ramosus. *Frondes* conjugatæ, impari-pinnatæ, sub-quadri-jugæ. *Foliola* hastato-lanceolata, lobis ad basim rotundatis. *Frustrificatio spica* linearis, distichæ, longiusculæ, foliolis adnatæ: crenis lateralibus, polliniferis.

Habitat loca plana, & fluminum ripas in Chinâ, & Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 227. Adiantum volubile minus. Rumph. Amb. 1. 10. cap. 52. pag. 76. tab. 32. fig. 2. Tseru-valli-panna. Rheed. Malab. 12. pag. 65. tab. 33.

GENUS III. ACROSTICHUM.

Char. Gener. *Frustrificationes* discum totum frondis tegentes. Lin. sy. pl. G. 1290.

Sp. 1. ACROSTICHUM LANCEOLATUM. α Cây Kim lươn.

Differ. sp. Acr. *frondibus* lineari-lanceolatis: *surculo* scandente. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Herba* perennis, *surculo* parasitico, scandente. *Frondes* liniari-lanceolatæ, simplices, integerrimæ: paginâ superiore sterili: inferiore totâ confitâ punctis seminiferis, confertis, elevatis, aureis.

Habitat in hortis, & sylvis Cochinchinæ, arboribus inhærens.

Burm. Ind. pag. 228. Tiri-panna. Rheed. Malab. 12. p. 141. tab. 33. Ab hoc vix differt Acrostichum Lingua. Thunb. Jap. pag. 33. tab. 33.

Sp. 2.

Sp. 2. ACROSTICHUM HETEROPHYLLUM. α . . .

Differ. spec. Acr. *frondibus* integerrimis, glabris, petiolatis: *sterilibus* sub-rotundis: *fertilibus* linearibus. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Sarculus* perennis, parasiticus filiformis, longus, repens: ramis paucis. *Fronde* integerrimæ, glabræ, crassæ, petiolatæ, heterophyllæ: partim sub-rotundæ, steriles: partim lineares fertiles: *punctis fructificantibus* totum discum subtus occupantibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 228. Maletta-mala-maravara. Rheed. Malab. 12. pag. 87. tab. 29. Phyllitis repens, scandensve, foliis duplicibus: aliis latis, & sub-rotundis: aliis longis, & angulatis. Rai. suppl. 13.

GENUS IV. POLYPODIUM.

Char. Gener. *Fruet.* in punctis sub-rotundis, sparsis per discum frondis. Lin. fy. pl. G. 1296.

† Sp. 1. POLYPODIUM REPANDUM. β Kū tūi pū. α Cōt tofi bō.

Differ. spec. Pol. *frondibus* radicalibus ovaris, integerrimis: caulinis lanceolatis, repandis: *fructificationibus* solitariis.

Hab., & notæ. *Radix* ovata, simplex, pilis multis, longis circumdata. *Sarculus* 1-pedalis, erectus. *Folia* radicalia ovata, acuta, integerrima, nervosa, congesta, erecta: caulina maiora, lanceolata, repanda, fertilia. *Fructificatio* in paginâ inferiore, solitaria, punctis flavis, serie longitudinali.

Habitat agreste apud Sinas.

Virt.: radicis: ex libris Sinicis excerpta, per me non comprobata. Sanguinis crassitiem resolvit: nimium ejus fluxum cohibet: ulcera maligna abstergit, quorum vermes necat: ossa fracta consolidat: prodest in odontalgia.

† Sp. 2. POLYPODIUM BIFORME. α . . .

Differ. sp. Pol. *frondibus* simplicibus, heterophyllis: sterilibus lanceolatis, integerrimis, fertilibus palmatis: *fructificationibus* solitariis.

Hab., & notæ. *Filix* sesquipedalis, *frondibus* simplicibus. Infæcundæ lanceolata, integerrimæ, sessiles, erectæ: fæcundæ palmatæ, stipitata, reclinatæ. *Fructificationes* solitariae in crustis sub-rotundis, polyspermis, minutis, per series longitudinales ab utroque latere dispositas.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Sp. 3. POLYPODIUM PHYMATODES. α . . .

Differ. spec. Pol. *frondibus* simplicibus trifidis, quinquelobisve lanceo-

ceolatis, supra fructificationes verrucosis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Radix* horizontalis, fibrosa, serpens. *Frondes* semipedales, simplices, petiolatæ, 3-5-fidæ, laciniis integerrimis, ensiformibus, nunc acutis, nunc obtusis. *Fructificationes* sparsæ, remotæ.

Habitat in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 232. Polypodium vario modo divisum. Burm. Zeyl. pag. 196. tab. 86. Filix Hemionitis Phymatodes. Pluken. Amalth. tab. 404. fig. 5.

Sp. 4. POLYPODIUM SCOLOPENDRIDODES. α

Differ. spec. Pol. *frondibus* pinnatifidis, lanceolatis, lobis obtusis: infimis remotis. Lin. sp. 13.

Hab., & notæ. Filix 1-pedalis, erecta, simplex. *Frondes* pinnatifidæ, laciniis sub-acutis. *Fructificationes* solitariae.

Habitat loca inculta Cochinchinæ.

Polypodium Asplenii folio. Plum. Fil. tab. 91. Filix Jamaicensis, simpliciter pinnatis Asplenii foliis, aversâ parte duplici serie puncturum notatis. Pluk. Almag. 152. tab. 290. fig. 1.

Sp. 5. POLYPODIUM LORICEUM. α

Differ. spec. Pol. *frondibus* pinnatifidis, lævibus: pinnis lanceolatis, distantibus, horizontalibus, repandis. Lin. sp. 21.

Hab., & notæ. Filix sesquipedalis, glabra. *Frondes* pinnatifidæ, laciniis linearibus, longis, sub-acutis, repandis, horizontalibus: *fructificationibus* solitariis.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Polypodium longifolium, radice dulci. Pet. Fil. 27. tab. 7. fig. 10. 12.

† Sp. 6. POLYPODIUM VENOSUM. α

Differ. spec. Pol. *frondibus* pinnatis: foliolis venosis, inferioribus cuneiformibus: superioribus ovato-oblongis, incisis, basi truncatis.

Hab., & notæ. Filix 1-pedalis, diffusa. *Frondes* pinnatæ, pinnis venosis, glabris. Foliola inferiora cuneiformia: superiora ovato-oblonga, basi truncata, incisa: laciniis obtusis, serratis. *Fructificationes* seriales.

Sp. 7. POLYPODIUM SIMILE. β Kū tsui pū.

Differ. spec. Pol. *frondibus* pinnatis: pinnis lanceolatis integerrimis, distantibus, supremis minoribus: *punctis* serialibus. Lin. sp. 33.

Hab., & notæ. Filix 3-pedalis, erecta: *radice* oblongâ, crassâ, horizontali, simplici. *Frondes* pinnatæ, foliolis lato-lanceolatis, integerrimis, distantibus, summis minoribus. *Fructificationes* seriales.

Habi-

Habitat apud Sinas, agreste.

Burm. Ind. pag. 233. Lonchitis altissima: pinnulis raris, non lacinia-
tis. Sloan. Jam. hist. i. pag. 77. tab. 32.

Virt. radicis. Eadem censetur in Medicinâ Sinenſi, ac Polypodii Re-
pandi, eodemque nomine indignantur ambo.

Sp. 8. POLYPODIUM FRAGRANS. α Rau Deſn long. β .

Differ. ſpec. Pol. *frondibus* ſub-bipinnatis, lanceolatis: foliolis con-
fertis: lobis obtuſis, ferratis: *ſtipite* paleaceo. Lin. ſp. 40.

Hab., & notæ. Filix 1-pedalis. *Frondeſ* radicales, erectæ, ſub-bipin-
natæ, lanceolatæ, piloſæ: foliolis confertis, laciniis obtuſis, profun-
de ferratis. *Stipites* paleacei, canaliculati, fuſci, inferius ſquamo-
ſi. *Fruſtificationeſ* ſeriales.

Habitat loca inculta Cochinchinæ.

Driopteris Rubum Idæum ſpirans. Amm. Ruthen. pag. 174. n. 251.

Sp. 9. POLYPODIUM VARIUM. α Rau Deſn tlon.

Differ. ſpec. Pol. *frondibus* lateralibus bipinnatis: foliolo infimo pin-
natifido. Lin. ſp. 42.

Hab., & notæ. Filix 2-pedalis, erecta. *Frondeſ* bipinnatæ foliolis ba-
ſis longioribus, ſemipinnatifidis: omnibus obtuſis, ferratis. *Stipites*
angulati, rubto-fulci, piloſi. *Fruſtificationeſ* ſeriales.

Habitat loca ſaxoſa in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 234. Osbeck it. ad Sinas. Ab hac ſpecie non multum
differre exiſtimo, ni pro eadem habeatur, Polypodium Serofum:

Thunb. Jap. pag. 337.

Uſus. Teneri furculi cuculenti ſunt.

Sp. 10. POLYPODIUM BAROMEZ. α Cau tich. β Ken tſſe.

Differ. ſpec. Pol. *frondibus* bipinnatis: pinnis pinnatifidis, lanceolatis,
ferratis: *radicibus* lanatis. Lin. ſp. 58.

Hab., & notæ. *Radix* oblonga, horizontalis, ultra pedem longa;
crassa, ſub-teres, carnoſa, multiformis, ſupra terram exerta: radi-
culis crassis, raris ſolo affixa: pilis denſiſſimis, tenuibus, ruſis
tota veſtita. *Frondeſ* 6-pedales, radicales, erectæ, paucæ, iner-
mes, bipinnatæ: *foliolis* lanceolatis, ferratis, glabris, ſeſſilibus,
nunc oppoſitis, nunc alternis. *Fruſtificationeſ* non inveni, quam-
vis ſedulo quaſſiverim in multis plantis integris, ex montibus re-
center avulſis mente Maio (ni fallor): quod tempus non erat for-
taſſe proprium florendi. Verum tamen eſſe Polypodium non dubito.

Habitat in ſylvis montanis Cochinchinæ, & Chinæ.

Frutex Tartareus, Agnus Scythicus. Bauh. Pin. pag. 512. n. 4. Bo-
ramets. Tartar. agnus. Mentzel. Pin. Polygl. pag. 50, & 199. Matth.

in

in Dioscor. epist. nuncup. pag. 8. Agn. Scythicus. Dist. of Arts; and sciences. pag. 69.

Observ. Multi Auctores scripserunt de Agno Scythico Barometz: plerique fabulose. Aliqui, inter quos Kirkerus, ejus figuram veri agni simillimam expreserunt, tanquam fructum cujusdam plantæ summo caulis vertici insistentem. Nolter non est fructus, sed radix. Istaque naturâ suâ polymorpha facillè coaptatur artis beneficio in formam agni, quem Tartari vocant Borametz: vel potius in speciem canis rufi, quem tam Cochinchinenses, quam Sineses idiomate patrio ita nominant. Corpus oblongum, pilosissimum ex terrâ nascitur, quod ex alterâ parte læpe attenuatur, rursusque crassius assurgit, ut collum, & caput fingat; simulque bina exrescencia pendula, pilosaque aures mentiuntur. Ex adverso brevis furculus a tergo in caudam protenditur. Quatuor stipites, abscisis frondibus, reservantur, ut pedes simulent: sicque agnum, vel canem stare a longe videas, quem a vero non distinguas, nisi proximè accedas. Falsum est nullas herbas juxta hoc vegetabile crescere, aut servari posse, quasi illis agnus Scythicus pascatur. At verissimum probavi radicem illam carnosam humore cruento, tenacique manare, sanguini animalium simillimo, dummodo recens adhuc, nec penitus exsiccata feriat. Cætera mirabilia, quæ de illo prædicantur, fabulosa sunt.

Virt. radicis. Astringens. Vulneribus imposita sanguinem sistit. Prodest in Gonorrhæâ, & fluore albo.

Sp. II. POLYPODIUM ARBOREUM. α Cay Nhum.

Differ. spec. Pol. frondibus bipinnatis, serratis: caudice arboreo, inermi. Lin. sp. 59.

Hab., & notæ. Caudex arboreus, 20 pedes, & ultra longus, crus crassus, rectus, subæqualis, brevibus interdum spinulis obsitus, fuscus, lignosus, durissimus, in centto molliusculus, sub-aquosus: radicibus fibrosis, plurimis, intricatis: ramis nullis. Frondes 8-pedales, 2-pinnatæ: stipitibus sub-teretibus, inermibus: foliis lanceolatis, serratis, glabris, lætè virentibus. Fructificationes punctis orbiculatis, rufis, iparsis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, in ultimâ provinciâ ad Austrum sitâ prope Cambodiam.

Palmiflix postium. Rumph. Amb. I. 10. c. 46. pag. 63. tab. 27. Polypodium arboreum, maximum, fronde tenuiore, caudice durissimo. Brown. Jam. 104.

Ufus. Caudex in rectissimas regulas filis aptè substernitur tegulis, vel straminibus ad conformanda domorum tecta diutius permansura.

Sp. 12. POLYPODIUM SPELUNCÆ. α . . .

Differ. spec. Pol. *frondibus* supra decompositis, pilosis: *foliis* lanceolatis, pinnatis: pinnis oppositis pinnatifidis. Lin. sp. 68.

Hab., & notæ. Filix sesquipedalis, inermis. *Fronde*s radicales, suberectæ, supradecompositæ, pilosæ: *pinnis* oppositis, profundè dentatis.

Habitat loca umbrosa in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 234. Filix Bermudiensis elegans, ramosa: pinnis rarioribus dentatis: cauliculis muscosâ lanugine obductis. Pluk. Almag. 155. tab. 244. fig. 2.

GENUS V. ASPLENIUM.

Char. Gener. *Frustrificationes* in lineolis disci frondis sparsis. Lin. syst. pl. G. 1295.

Sp. 1. ASPLENIUM HEMIONITIS. α . . .

Differ. spec. Aspl. *frondibus* simplicibus, cordato-hastatis, 5-lobis, integerrimis: *stipitibus* lævibus. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Filix humilis, 6-pollicaris: *radice* fibrosâ: *stipitibus* tenuibus, glabris, cespitosis. *Fronde*s simplices, cordatæ, glabræ, 5-lobæ: lobis sub-linearibus, integerrimis, inæqualibus, expansis. *Frustrificationes* lineis obliquis, angulo ad rhachim acuto.

Habitat circa muros in hortis Cochinchinâ.

Hemionitis Vulgaris. Bauh. Pin. pag. 353. n. 1.

Sp. 2. ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. α Cay Rung Id.

Differ. spec. Aspl. *frondibus* simplicibus, cordato-lingulatis, integerrimis: *stipitibus* hirsutis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. Filix perennis, 3-pedalis, erecta: *stipite* tereti, crasso, longo, recto. *Frons* simplex, multipartita: laciniis magnis, paucis, sub-linearibus, undulatis, crispis, inæqualibus, apice multifidis, obtusis, erectis. *Frustrificationes* squamosæ, in lineas obliquas dispositæ.

Habitat loca humida in Cochinchinâ.

Lingua Cervina multifido folio. Bauh. Pin. pag. 353. n. 2. Phyllitis, sive lingua cervina crispa, folio multifido, ramosa. Pluk. Phyt. tab. 248. fig. 2. Lingua cervina foliis laciniatis. Tournef. Inst. tab. 320.

Observ. Leon Tournesfortiana omnino convenit cum nostro Asplenio Cochinchinensi: sed valde differt ab Scolopendrio, seu Lingua cervinâ officinarum, sicut etiam a diffinitione Linnaeanâ Asplenii Scolopendrii; ideoque haud ineptè diversam speciem constitueret.

Rrrr

Ussus

Ufus. Frondibus utuntur indigenæ ad tegendas domos ; sunt enim magnæ durationis , nec ignem faciliè concipiunt.

Sp. 3. ASPLENIUM NODOSUM. *α . . .*

Differ. spec. Aspl. *frondibus* pinnatis : *pinnis* oppositis , lanceolatis , integerrimis. Lin. sp. 10.

Hab. , & notæ. Filix sesquipedalis , erecta , glabra. *Fronde* pinnatæ : *foliis* oppositis , longis , lanceolatis , striatis , integerrimis. Lineæ *fructificationum* rectæ , parallelæ , a disci margine ad rhachim obliquè inclinatæ.

Habitat agros incultos Cochinchinæ.

Filix maior in pinnas tantum divisa raras , oblongas , striatas , ex adverso sitas , & non crenatas. Sloan. Jam. 16. hist. 1. pag. 78. Lingua cervina nodosa. Plum. Fil. tab. 108.

Sp. 4. ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. *α . . .*

Differ. spec. Aspl. *frondibus* pinnatis : *pinnis* sub-rotundis , crenatis. Lin. sp. 12.

Hab. , & notæ. Filix humilis , 8-pollicaris : *radice* fibrosa , hirsutâ. *Stipites* sub-ancipites , tenues , congesti , fusci , erecti. *Fronde* pinnatæ : *pinnis* ovatis , sub-crenatis , sessilibus. *Fructificationes* squamosæ , lineares in disco frondis sparasæ.

Habitat loca saxosa in Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 334. Trichomanes , sive Polytricum officinarum. Bauh. Pin. pag. 356. n. 1. Tournef. Inst. pag. 539. tab. 315. fig. A. B.

† Sp. 5. ASPLENIUM BULBOSUM. *α* Cay Maóng tlâu.

Differ. spec. Aspl. *frondibus* pinnatis : *pinnis* lanceolatis , leviter crenatis : *radice* bulbosâ.

Hab. , & notæ. Filix 1-pedalis , diffusa : *radice* bulbosâ , sub-rotundâ , fariniferâ , magnâ , fuscâ. *Stipites* carnosî , crassî , tuberculosi , reclinati. *Fronde* pinnatæ : *foliis* lanceolatis , leviter crenatis , glabris. *Fructificationes* in disco lineolis obliquis , parallelis.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

Ufus. Bulbus esculentus.

GENUS VI. PTERIS.

Char. Gen. *Fructificationes* in lineis marginalibus. Lin. sy. pl. G. 1291.

Sp. 1. PTERIS PILOSELLOIDES. *α . . .*

Differ. spec. Peter. *frondibus* sterilibus ob-ovatis : fertilibus lanceolatis , longioribus : *surculis* repentibus. Lin. sp. 1.

Hab. ,

Hab., & notæ. *Surculi* reptantes, filiformes, longi, tomentosi. *Frondes* heterophyllæ, simplices, stipitatæ: steriles oblongo-ovatae: fertiles longiores, lanceolatae, integerrimæ, glabræ. *Frustrificationes* lineâ continuâ, marginali.

Habitat loca saxosa Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 229. Thunb. Jap. pag. 331.

Sp. 2. PTERIS LANCEOLATA. . . .

Differ. spec. Pter. *frondibus* simplicibus lanceolatis, sub-angulatis; glabris: apice fructificante. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Frondes* simplices, lanceolatae, sub-triangularæ, basi cordatæ, sub-integerrimæ, glabræ, striatæ, erectæ. *Frustrificationes* ad apicem frondis, lineis marginalibus.

Habitat loca inculta Cochinchinæ

Lingua Cervina foliis acutis, & ad oras summitatum pulverulentis. Plum. Amer. 28. tab. 40.

Sp. 3. PTERIS VITTATA. . . .

Differ. spec. Pter. *frondibus* pinnatis: *pinnis* linearibus rectis, basi rotundatis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Radix* fibrosa, longa, repens, nigra. *Frondes* 5-pedales, erectæ, pinnatæ: *stipitibus* teretibus, glabris, sulcatis, longis. *Pinnæ* lineari-lanceolatae, acumine longo, sub-integerrimæ, glabræ, transversè striatæ, pallidè virides, basi rotundatæ, planæ, sub-oppositæ, breviter petiolatæ, interdum minutissimè serratæ. *Frustrificationes* lineâ tenui, pallidâ, circumferentiam pinnarum ambiente.

Habitat fossas, & loca humida in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 230. Lonchitis Amboinica, recta maior. Rumph. Amb. l. 10. c. 50. tab. 30. fig. 1. Suspicio eandem esse, quæ a Joanne Burm. (Zeyl. pag. 100. tab. 46.) dicitur Filix non ramosa, altissima, palustris, pinnis integris, alternis, serratis, acutis; quæque a Nicolao Burmanno (Ind. pag. 234.) vocatur Polypodium palustre.

Sp. 4. PTERIS BIAURITA. . . .

Differ. spec. Pter. *frondibus* pinnatis: *pinnis* pinnatifidis: infimâ bipartitâ. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Filix* sesquipedalis, erecta. *Frondes* pinnatæ: *pinnis* pinnatifidis, glabris, laciniis linearibus, obrutis: pinnâ infimâ divisâ in duas auriculas breviores. *Frustrificationes* lineares, marginè reflexâ defensæ.

Habitat loca inculta Cochinchinæ.

Filix pinnulis Lonchitidis obtusis, non dentatis, ad oras pulverulentis. Plum. Amer. 10. tab. 14.

Sp. 5. PTERIS CAUDATA. α . . .

Differ. spec. Pter. *frondibus* supra decompositis: *pinnis* linearibus, infimis basi pinnato-dentatis: *terminalibus* longissimis. Lin. sp. 16.
Hab., & notæ. Filix 8-pollicaris, diffusa, glabra. *Fronde* supra-decompositæ: *pinnis* linearibus, supremis longissimis, simplicibus, oppositis: inferioribus variis, nunc partitis, nunc pinnatis, pinnulis brevioribus, inæqualibus. *Frustrificationes* lineâ marginali, denticulis frondis reflexis occultæ.

Habitat ad rudera, & muros veteres in Cochinchinâ.

Pteris Ensisiformis fronde pinnatâ, pinnis superioribus ensiformibus, sub-integerrimis: inferioribus oppositis, ovatis, auriculatis, serratis. Burm. Ind. pag. 230. Polypodium caule simplici, foliis simplicibus, variis, longis, serratis. Burm. Zeyl. pag. 196. tab. 87.

GENUS VII. ADIANTUM.

Char. Gener. *Frustrificationes* in maculis terminalibus sub-replicato margine frondis. Lin. sy. pl. G. 1297.

Sp. 1. ADIANTUM CAUDATUM. α . . .

Differ. spec. Ad. *frondibus* pinnatis, falcatis, apice caudatis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. Filix 1-pedalis: *radice* fibrosâ: *stipitibus* teretibus, pubescentibus, fusco-purpureis, tenuibus, cespitosis. *Fronde* pinnatæ, reflexæ: pinnis oblongis, falcatis, acutis, striatis: latere superiore incisus, minutim serratis: serraturis *frustrificationes* divisim amplectentibus.

Habitat loca humida Cochinchinæ.

Thunb. Jap. pag. 339. Adiantum caule reflexo, pinnulis alternis, striatis, in summo crenatis, & frugiferis. Burm. Zeyl. pag. 8, tab. 5. fig. 1.

Sp. 2. ADIANTUM FLABELLULATUM. β Fiet quât tsào.

Differ. spec. Ad. *frondibus* decompositis: *pinnis* alternis, rhombeis, rotundatis, multifloris: *stipitibus* supra pubescentibus. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. Filix sesquipedalis, sub-erecta: *stipitibus* sub-teretibus, canaliculatis, fusco-rubris, pilosis. *Fronde* decompositæ: *pinnis* alternis, lato-cuneiformibus, apice rotundatis, crenulatis: petiolis capillaribus, brevibus. *Frustrificationes* ovatæ, margine frondis tectæ.

Habitat suburbia Cantoniensia apud Sinas.

Burm. Ind. pag. 236. Adiantum Chinense, perelegans, ramosum; folio flabelliformi cum rubedine perispermato. Pluk. Alm. II. tab. 4. fig. 3.

Sp. 3. ADIANTUM CAPILLUS VENERIS. α Cay Đuôi chôn.

Differ. spec. Ad. frondibus decompositis: foliis alternis: pinnis cuneiformibus, lobatis, pedicellatis. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. Filix 8-pollicaris, diffusa, glaber: stipitibus cespitosus, tenuibus, fusco-pallidis. Frondes decompositæ: foliis cuneiformibus, alternis, lobatis, nervosis, apice rotundatis. Fructificationes lunulatae: crenis foliorum reflexis defensæ.

Habitat in puteis, fontibus, & aliis locis humidis Cochinchinæ.

Berg. Mat. Med. pag. 905. Capillus Veneris: Micca miccan Utan. Rumph. Amb. I. 10. cap. 53. pag. 77. tab. 34. Adiantum foliis flabelliformibus, lobatis, petiolis ramosis. Hall. Helv. n. 1713.

† Sp. 4. ADIANTUM SCANDENS. α Cay Baong baong.

Differ. spec. Ad. frondibus decompositis: foliis cuneiformibus, æqualiter incisus: caule scandente.

Hab., & notæ. Caulis filiformis, longus, tenuis, pallidus, ramosus, scandens, sæpe volubilis. Frondes decompositæ: foliis cuneiformibus, æqualiter incisus, obtusis, glabris, petiolatis: denticulis marginalibus fructificationes amplectentibus.

Habitat loca plana, & inculta Cochinchinæ.

GENUS VIII. TRICHOMANES.

Char. Gener. Fructificationes solitariae, stylo setaceo terminatae, margini frondis insertae. Lin. sy. pl. G. 1298.

Sp. I. TRICHOMANES HIRSUTUM. α . . .

Differ. spec. Tric. frondibus pinnatis: pinnis alternis, pinnatifidis, pilosis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. Filix 10-pollicaris: tota hirsuta, pilis brevibus. Frondes pinnatae: pinnis oblongis, obtusis, pilosis, alternis: margine superiore obtuse polyfidâ, fructificante: fructificationibus marginalibus, solitariis, lenticularibus, apice setaceo instructis.

Habitat loca agrestia Cochinchinæ.

Thunb. Japon. pag. 339. Darea Americana maior, pubescens. Pet. Mus. 762.

MUSCI.

GENUS IX. LYCOPODIUM.

Char. Gener. *Anthera* bivalvis, sessilis. *Calyptra* nulla. Lin. fy. pl. G. 1302.

Sp. 1. LYCOPODIUM PHLEGMARIA. α Rêu cây.

Differ. spec. Lyc. *foliis* verticillato-quaternis : *spicis* terminalibus, dichotomis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. Muscus frutescens, parasiticus. *Caulis* semipedalis, digitum crassus, erectus, multiplex, teres, fibrosus : *ramulis* terminalibus congestis, dichotomis. *Folia* minuscula, verticillato-quaterna, conica, acuminata, integerrima, glabra, imbricata, appressa. *Spicæ* graciles, terminales.

Habitat in truncis arborum Cochinchinensium.

Burm. Ind. pag. 237. Lycopodium erectum, dichotomum : foliis cruciatis, spicis gracilioribus. Dill. Musc. 450. tab. 61. fig. 5. Selago Indiæ Orientalis, sive Phlegmaria admirabilis Zeylanica. Burm. Zeyl. pag. 211.

Sp. 2. LYCOPODIUM CERNUUM. α Thoug đát.

Differ. spec. Lyc. *foliis* sparsis, curvatis : *caule* ramosissimo : *spicis* nutantibus. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. Muscus terrestris, perennis ; 1-pedalis, erectus, teres, ramosus, nec ramosissimus : *ramis* sub-divisis, patentibus. *Folia* sparsa, minuta, subulata, curva, integerrima, glabra, cinerea, crispa, sessilia, patentia. *Spicæ* breves, nutantes, absque calypttris.

Habitat in collibus sylvestribus Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 237. Lycopodium Zeylanicum, erectum, ramosissimum. Burm. Zeyl. pag. 144. tab. 66.

Sp. 3. LYCOPODIUM COMPLANATUM. α Rêu thềm nhà.

Differ. spec. Lyc. *foliis* bifariis, connatis : superficialibus solitariis : *spicis* geminis, pedunculatis. Lin. sp. 16.

Hab., & notæ. Muscus annuus, 2-pollicaris, ramosus : *surculo* compresso, erecto. *Foliola* crustoso-connata, inæqualiter incisa, obscuro-viridia, glabra, bifariam versa. *Spicæ* sessiles, terminales, imbricato-distichæ : *antheris* subulatis, longis, apice dehiscentibus, calyptra nulla.

Habitat hyberno tempore muris lateritiis inhærens in Cochinchinâ.

Muscus clavatus foliis cupressi. Bauh Pin. pag. 360. n. 11. Lycopodium Sabinæ facie. Dill. Musc. 445.

GENUS X. PORELLA.

Char. Gener. *Anthera* multilocularis, foraminosa, non operculata, *Calyptra* nulla. Lin. fy. pl. G. 1303.

† Sp. I. PORELLA IMBRICATA. α Réu bāc.

Differ. spec. Por. *foliis* lanceolatis, quinquefariam imbricatis.

Hab., & notæ. *Surculus* 3-pollicaris, erectus, ramosus. *Folia* lanceolato-lineararia, curva, undulata, albicantia, pentagono-imbricata. *Anthera* ovata, porosa, multilocularis, nuda, sessilis: calyptra nulla.

Habitat loca humida in Cochinchinā.

GENUS XI. SPHAGNUM.

Char. Gener. *Anthera* operculata, ore lævi. *Calyptra* nulla. Lin. fy. pl. G. 1304.

† Sp. I. SPHAGNUM SIMPLICISSIMUM. α Réu thành gách.

Differ. spec. Sphag. *foliis* capillaribus, imbricatis: *ramis* nullis.

Hab., & notæ. *Surculus* 2-pollicaris, simplicissimus, erectus, pallidus. *Folia* capillaria, tenuissima, imbricata. *Capitula* rotunda, ore lævi: calyptra nulla.

Habitat in Cochinchinā, innascens muris, & truncis arborum tempore pluvio.

GENUS XII. BRYUM.

Char. Gener. *Anthera* operculata. *Calyptra* lævis. *Filamentum* e tuberculo terminali ortum. Lin. fy. pl. G. 1311.

Sp. I. BRYUM UNDULATUM. α Réu doung. β Sièn.

Differ. spec. Br. *antheris* erectiusculis, pedunculis sub-solitariis: *foliis* lanceolatis, carinatis, undulatis, patentibus, ferratis. Lin. sp. 10.

Hab. *Surculus* 1-pollicaris, erectus, simplicissimus. *Folia* lanceolata; undulata, lævia, patentia. *Pedunculus* terminalis, solitarius: *capitulo* sub-erecto, operculato.

Habitat in agris Cochinchinæ, & Chinæ.

Bryum capsulis sub-nutantibus; furculis simplicibus; foliis lanceolatis, undulatis, ferratis. Scop. Carn. 1. pag. 143. n. 13.

Sp. 2. BRYUM TRUNCATULUM. α Réu doung.

Differ. spec. Br. *antheris* erectis, sub-rotundis : *operculo* mucronato. Lin. sp. 20.

Hab. *Surculus* semipollicaris, simplicissimus, erectus. *Folia* linearia, minima. *Capitulum* ovatum, rufum, truncatum : *operculo* mucronato : pedunculo brevi, terminali.

Habitat in agris, & fossis Cochinchinæ.

Muscus capillaris, capitulis rotundis, angustifolius. Buxb. Cent. 2. pag. 6. tab. 2. fig. 7.

Sp. 3. BRYUM VIRIDULUM. α Réu Xanh.

Differ. spec. Br. *antheris* erectis, ovatis : *foliis* lanceolatis, acuminatis, imbricato-patulis. Lin. sp. 21.

Hab. *Surculus* erectiusculus, simplicissimus, vix pollicem longus. *Folia* strictè lanceolata, imbricata, lætè viridia, glabra. *Anthera* ovata, operculata, erecta : *pedunculo* longo, terminali : *calyptra* lævi, conicâ.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Bryum capsulis erectis, ovatis ; furculis simplicibus ; foliis imberbibus ; lanceolatis. Scop. Carn. 1. pag. 140. n. 7.

GENUS XIII. FONTINALIS.

Char. Gener. *Anthera* operculata. *Calyptra* sessilis, perichætio inclusa. Lin. syst. pl. G. 1306.

f S. 1. FONTINALIS HETEROPHYLLA. α . . .

Differ. spec. Font. *foliis* trifariis, heterophyllis : *antheris* lateralibus.

Hab. *Surculus* 8-pollicaris, parasiticus, erectus, ramosus : *ramis* accipitibus : *ramulis* supremis quadragonis, fructificantibus. *Folia* tribus ordinibus : lateralia ovato-oblonga, obtusa, patentia : media acuta, imbricata. *Antheræ* sub-rotundæ, operculatæ, sessiles, axillares. *Perichætium* urceolatum calyptram circumdans.

Habitat in arborum truncis in Cochinchinâ.

ALGÆ.

GENUS XIV. LICHEN.

Char. Gener. Masc. *Receptaculum* sub-rotundum, planiusculum, nitidum.

Fœm. *Farina* foliis adspersa. Lin. fy. pl. G. 1319.

Sp. 1. LICHEN FAGINEUS. α Rêu bột trắng.

Differ. spec. Lich. leprosus, albus: *tuberculis* albis farinaceis. Linn. sp. 16.

Hab. Alga humilis, crustacea, albicans: *tuberculis* pulverulentis, albis, sessilibus: adrepens, vestiensque arborum truncos, & ramos. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, albus, superficie in acetabulis pulverulentis veluti efflorescente. Mich. gen. 99. n. 54. tab. 53. fig. 1.

Sp. 2. LICHEN ERICETOROM. α Rêu rừng.

Differ. spec. Lich. leprosus, candidus: *tuberculis* incarnatis. Linn. sp. 19.

Hab. Alga crustacea, carnosa, parva, candida. *Tuberculi* in medio rubescentes, margine albi, stipitati.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Coralloides fungiforme, carneum; basi leprosa. Dill. Musc. 76. tab. 14. fig. 1. Fungilli incarnati coloris, musco innati. Mentz. Pug. rar. pl. tab. 6. fig. 5.

† Sp. 3. LICHEN ARECARIUS. α Rêu cây Cau.

Differ. spec. Lich. crustaceus, cinereus, margine foliosus, laciniatus, *tuberculis* albis, farinaceis.

Hab. Alga crustacea, cinerea, tenuis, repens: *margine* foliacea, laciniata, obtusa: *tuberculis* in centro albis: vestiens totum caudicem Palmæ Arecæ.

Habitat in hortis Cochinchinæ.

Sp. 4. LICHEN TARTAREUS. α Rêu đá. β Tân.

Differ. spec. Lich. crustaceus ex albedo virescens: scutellis flavescensibus, margine albo. Lin. sp. 22.

Hab. Alga crustacea, albo-viridis, sub-rotunda, parva: scutellis minimis, fuscis, margine albis.

Habitat loca saxosa in Cochinchinâ, & Chinâ.

Lichnoides tartareum, farinaceum, scutellarum umbone fusco. Dill.
Musc. 131. tab. 18. fig. 12.

† Sp. 5. LICHEN IMBRIGATUS. α Rêu báy cá.

Differ. spec. Lich. *foliolis* imbricatim coherentibus, in lineam rectam protensis.

Hab. Alga fusco-viridis, linearis, in unam, vel plures series, longas, rectas extensa: *foliolis* sub-rotundis, concavis, integerrimis, glabris, minimis, æqualibus, imbricatim coherentibus: stipite, vel caule nullis: interdum *ramis* homogeneis, rectangulis, pendulis lateraliter instructa.

Habitat frequens in dumetis Cochinchinæ, fruticibus adrepens.

Sp. 6. LICHEN PULMONARIUS. β Thiên hĩa, α Thien hoa.

Differ. spec. Lich. foliaceus laciniatus, obtusus, glaber: supra lacunofus: subtus tomentosus. Lin. sp. 43.

Hab. Alga parastica, foliacea, laciniata, superius lacunosa, glabra, cinerea: inferius villosa, fusca: *laciniis* linearibus, obtusis: *scutellis* orbiculatis, sparsis.

Habitat in arboribus sylvestribus, senescentibus Cochinchinæ, & Chinæ.

Muscus Pulmonarius. Bauh. Pin. pag. 361. n. 7. Lichen foliaceus, laciniatus, supra reticulato-lacunofus: scutellis sparsis. Scop. Carn. 1. pag. 101. n. 32.

Sp. 7. LICHEN RANGIFERINUS. α Rêu gác nai.

Differ. spec. Lich. fruticulosus, perforatus, ramosissimus: *ramulis* nutantibus. Lin. sp. 83.

Hab. *Caulis* bipollicaris, fruticulosus, erectus, teres, fistulatus, ramosus: *ramis* multis, obliquis, subulatis, divisis, cinereis, aphyllis, nutantibus.

Habitat loca sterilia Cochinchinæ.

Musco-fungus coralloides, montanus, ramosissimus, cinereus, vulgaris. Moris. hist. 3. pag. 633. tab. 7. fig. 9. Muscus Coralloides, sive cornutus, montanus. Bauh. Pin. pag. 361. n. 3.

Sp. 8. LICHEN ROCCELLA. α Rêu tle muc.

Differ. spec. Lich. fruticulosus, solidus, aphyllus, sub-ramosus: *tuberculis* alternis. Lin. sp. 89.

Hab. *Caulis* 3-pollicaris, fruticulosus, teres, solidus, aphyllus, basi fulcus, supra pallidus, ramosus: *tuberculis* lateralibus, alternis.

Habitat in scopulis, & arundinibus Bambu putrescentibus in Cochinchinâ.

Berg. Mat. Med. pag. 915. Alga Coralloides. Rumph. Amb. 1. 11. c. 56. pag. 181. tab. 76. fig. A. B. C.

Sp. 9. LICHEN USNEA. α Rêu chi roi.

Differ. spec. Lich. filamentosus, pendulus, compressus, ramosus, lævis. Lin. sp. 93.

Hab. Alga filiformis, parasitica; albo-cinerea, lævis, ramosa: ramis multis, obtusangulis, sub-divisis, longis, inæqualibus, flexuosis, implicatis, pendulis: foliis nullis: scutellis concavis, nec radiatis. Odor, si addit, valde tenuis.

Habitat in arboribus sylvestribus Cochinchinæ.

Muscus Capillaris. Rumph. Amb. 1. 10. c. 62. tab. 40. fig. 2. Lichen Capillaris filamentis fetaceis; pendulis: ramis cincinnatis: scutellis ovatis. Burm. Ind. pag. 239.

GENUS XV. BYSSUS.

Char. Gener. Lanugo, aut pulvis simplicissimus. Lin. fy. pl. G. 1324.

Sp. 1. BYSSUS CANDELLARIS. α Bọt vàng dẹt cây.

Differ. spec. Byss. pulverulenta, flava, lignis adnascens. Lin. sp. 11.

Observ. Plures Byssi species facili in Cochinchinâ invenies: quas flocci pendens, ut merentur, libenter præeremito.

GENUS XVI. ULVA.

Char. Gener. Fructificationes in membranâ diaphanâ. Lin. fy. pl. G. 1322.

Sp. 1. ULVA PISUM. α Rêu bôt.

Differ. spec. Ulv. (granulata) globosa, farcta, viridis. Lin. sp. 16.

Hab. Alga minuta, viridis; cõstans globulis aggregatis, viscosis: filamentis tenuissimis, brevibus, inæqualibus, intricatis: foliis, & caule nullis.

Habitat in fossis, & paludibus Cochinchinæ, in aquis fluctuans.

Conferva Sphærica; filamentis concentricis. Flora. Dan. tab. 660. fig. 2.

GENUS XVII. FUCUS.

Char. Gen. Masc. Vesiculae villis intertextæ.

Fœm. Vesiculae adpersæ granis immeris, apice prominulis. Sem. solitaria. Lin. fy. pl. G. 1321.

Sp. 1. FUCUS UVARIUS. α Cay Raong.

Differ. spec. Fuc. caule filiformi, ramoso: *foliis confertis, ovatis, fornicatis*. Lin. sp. 1.

Hab. *Caulis* filiformis, longissimus, teres, ramosus. *Folia* oblonga, fusca, glabra, integerrima, conferto-verticillata.

Habitat in pelago Cochinchinensi.

Syst. Vegetab. pag. 811.

Sp. 2. FUCUS NATANS. α Raong noi.

Differ. spec. Fuc. caule filiformi, ramoso: *foliis lanceolatis, serratis: fructificationibus globosis, pedunculatis*. Lin. sp. 2.

Hab. *Caulis* filiformis, flexuosus, ramosus, liberè natans, nec radicans. *Folia* lanceolata, serrata, alterna, glabra. *Fructificationes* globosæ, pedunculatæ, solitariae, axillares, inanes.

Habitat in pelago Cochinchinensi.

Burm. Ind. pag. 239. Sargassum Litoreum. Rumph. Amb. l. II. c. 59. tab. 76. fig. 2. Sargaço. Pil. Brasil. l. 4. pag. 266. fig. ibi.

Sp. 3. FUCUS INFLATUS. α Raong Thia thia.

Differ. spec. Fuc. fronde planâ, dichotomâ, integerrimâ, punctatâ, ovato-lanceolatâ, inflatâ: apice divilo. Lin. sp. 10.

Hab. *Caulis* brevis, teres, procumbens, fluctuans, dichotomus, semel, aut bis tantum divilus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, basi rotundata, apice acuta, raro divisa, plana, glabra, punctis ferialibus eminentibus aspera: *petiolis* alternis, amplexicaulibus, inflatis, canaliculatis, radiculis ramosis ab basim verticillatis.

Habitat in paludibus Cochinchinæ.

Sp. 4. FUCUS GRANULATUS. α Raong bien.

Differ. spec. Fuc. fronde filiformi, ramosissimâ: ramulis acuminatis: vesiculis sub-rotundis, cumulatâ: ramis, folisque acutis, omnibus innatis. Lin. sp. 23.

Hab. *Caulis* filiformis, brevis, ramosissimus. *Folia* sub-linearia, congesta, acuta, integerrima. *Fructificationes* verrucosæ, minimæ, contiguae, sparsaeque, ramulis & foliis inhaerentes.

Habitat ad littora Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 239.

Sp. 5. FUCUS ACULEATUS. α 577

Differ. spec. Fuc. fronde filiformi, compressâ, ramosissimâ: dentibus marginalibus subulatis, alternis, erectis. Lin. sp. 26.

Hab. *Caulis* filiformis, teres, brevis: ramis plurimis, sparsis: *foliis* sub-

subulatis, frictis, denticulatis: denticulis rectis, acutis, aculeos molliusculos mentientibus. Fructificationes non vidi.
Habitat ad litora Cochinchinensia.
Fucus Muscoides. Gmel. Fuc. 130. tab. 12. fig. 1.

Sp. 6. FUCUS TENDO. *β* . . .

Differ. spec. Fuc. *fronde* filiformi, simplici, cartilaginea, sub-diaphana. Lin. sp. 30.

Hab. *Caulis* filiformis, simplex, longissimus, teres, tenuis, pallidus, sub-diaphanus: *ramis*, & *foliis* nullis. Fructificationes non invēni.

Habitat in Oceano Sinensi.

Burm. Ind. pag. 239. Fucus Indicus, teres, setam piscatoriam referens, longissimus. Pluk. Almag. 160. tab. 184. fig. 3.

Sp. 7. FUCUS SACCHARINUS. *β* . . .

Differ. spec. Fuc. *fronde* sub-simplici, ensiformi: *stirpe* tereti, brevissima. Lin. sp. 39.

Hab. *Caulis* teres, crassus, brevissimus, erectus, simplex. *Folia* 4-pedalia, lato-ensiformia, integerrima, crassa, sessilia, erecta. Fructificationes non vidi.

Habitat ad litora maris Sinici.

Thunb. Jap. pag. 346. Alga longissimo, lato, crassoque folio. Bauh. Pin. pag. 364. n. 5.

GENUS XVIII. CONFERVA.

Char. Gener. *Tubercula* inæqualia, in fibris capillaribus, longissimis. Lin. fy. pl. G. 1323.

Sp. 1. CONFERVA LITORALIS. *α* Raong bai bien.

Differ. spec. Conf. *filamentis* æqualibus, elongatis, scabriusculis. Lin. sp. 6.

Hab. Alga marina, *caule* filiformi, tenui, longissimo, ramosissimo: *filamentis* capillaribus, longis, rectis, simplicibus, æqualibus, alternis, planiusculis, sub-scabris, atro-virentibus.

Habitat ad litora Cochinchinæ.

Conferva marina, longa, capillacea, ramosissima. Dillen. Musc. 23. tab. 4. fig. 19.

Ufus. Algâ istâ, cujus in Cochinchinâ magna est copia, multæ cymbæ onerantur, ut eâ loco stercoreis vicini agri fertiles reddantur, maximè ut copiosè producant tubera Batatas.

Sp. 2. CONFERVA DICHOTOMA. α . . .Differ. spec. Conf. *filamentis* æqualibus, dichotomis. Lin. sp. 8.Hab. Alga capillaris, viridis: *filamentis* verticillatis, sub-teretibus, dichotomis, longiusculis, æqualibus.

Habitat in aquis stagnantibus in Cochinchinâ.

Conferva dichotoma, fetis porcinis similis. Dill. Musc. 17. tab. 3. f. 9.

Sp. 3. CONFERVA CORALLINA. α Thach hoa. β Xê hõa.Differ. spec. Conf. *filis* geniculatis, dichotomis. Lin. sp. 15.Hab. Alga capillaris, tenuis, articulata, pallida: *geniculis* rubescens, *Filamenta* longiuscula, ramosa, apice dichotoma.

Habitat in Cochinchinâ, inhærens scopulis, qui aquâ marinâ lavantur.

Conferva marina, gelatinosa, Corallinæ instar geniculata, tenuior. Dill. Musc. 33. tab. 6. fig. 37.

Ufus. Aqua, in quâ post exsiccationem maceratur Alga ista, mucosa fit: tunc ad ignem cocta congruenter spissatur in gelatinam albam, pellucidam, inodoram: quæ in taleolas secta, frigidâ, & saccharo temperata refrigerium præbet gratissimum viatoribus calore æstivo fatigatis. In hunc finem in tabernis diverforis prostat venalis tam in Cochinchinâ, & Chinâ, quam in Japoniâ: eandemque esse suspicor, quæ Mucus Gelatinus Japonensis a Rumphio vocatur. Amb. l. 10. c. 62. pag. 90. tab. 40. fig. 3.

F U N G I.

GENUS XIX. AGARICUS.

Char. Gener. *Fungus* horizontalis, subtus lamellosus. Lin. fy. pl. G. 1325.Sp. 1. AGARICUS INTEGRUS. α Nãm moi. β Kiún.Differ. spec. Agar. stipitatus, *lamellis* omnibus magnitudine æqualibus. Lin. sp. 3.Hab. Fungus magnus, integer: *stipite* solido, albo, mediocri. *Pileus* orbiculatus, sub-convexus, albo-fuscus, lævis: inferius planus, *lamellis* omnibus æqualibus, albis.

Habitat loca agrestia Cochinchinæ, & Chinæ: sæpe etiam in horris. Agaricus pileo orbiculari, in margine rugoso, & striato, vertice tumido, petiolo brevi. Gled. Fung. 106. n. 14.

Ufus. Esculentus, sapidus, nec insaluber.

- Sp. 2. AGARICUS DELICIOSUS. α Nam Dec. β Hiam Xuên.
 Differ. spec. Agar. stipitatus, *pileo* testaceo: *succo* lutescente. Lin.
 sp. 6.
 Hab. Fungus mediocris, coloris lateritii, *succo* flavescente turgidus:
stipite parvo: *pileo* orbiculato, in centro depresso: *lamellis* in-
 æqualibus.
 Habitat loca agrestia Cochinchinæ, & Chinæ.
 Amanita lateritii coloris, croceo succo turgens. Dill. Giff. 179.
 Usus. Esculentus, sapidissimus.
- Sp. 3. AGARICUS EQUESTRIS. α Nam cút ngĩa.
 Differ. spec. Agar. stipitatus, *pileo* pallido: *disco* stellatim luteo: *la-*
mellis sulphureis. Lin. sp. 14.
 Hab. Fungus parvus: *stipite* longo, tenui, solido: *pileo* sub-coni-
 co, luteo-fulco: *lamellis* cinereis, alternis angustioribus.
 Habitat in acervis stercoreis equini in Cochinchinâ.
- Sp. 4. AGARICUS FIMETARIUS. α Nam cút thâu.
 Differ. spec. Agar. stipitatus, *pileo* campanulato, lacero: *lamellis*
 nigris, lateraliter flexuosis: *stipite* fistuloso. Lin. sp. 19.
 Hab. Fungus parvus: *stipite* inani, longo, albo: *pileo* sub-convexo,
 aquoso, fusco-cinereo: *lamellis* nigris, plicato-flexuosis.
 Habitat in sterquiliniis bubalorum in Cochinchinâ.
 Fungus Sterquilineus. Mich. Gen. 181. tab. 80. fig. 3.
- Sp. 5. AGARICUS CAMPANULATUS. α Nam chuông.
 Differ. spec. Agar. stipitatus: *pileo* campanulato, striato, pellucido:
lamellis adscendentibus: *stipite* nudo. Lin. sp. 20.
 Hab. Fungus parvus: *stipite* nigro, tenui, flexuoso, nudo: *pileo*
 campanulato, striato, nitido: *lamellis* adscendentibus, inæquali-
 bus, pallidis.
 Habitat in agris Cochinchinæ.
 Agaricus caulescens, *pileo* conico, cinereo, *lamellis* albis, *stipite*
 longo. Lin. Flor. Lapon. 507.
- Sp. 6. AGARICUS ANDROSACEUS. α Nam rom.
 Differ. spec. Agar. stipitatus, albus: *pileo* plicato, membranaceo:
stipite nigro. Lin. sp. 24.
 Hab. Fungus parvus: *stipite* filiformi, longo, pallido: *pileo* sub-co-
 nico, membranaceo, plicato, subtus nigro, superius cinereo-rufo:
lamellis tenuissimis, sub-æqualibus.
 Habitat in paleis Oryzæ coacervatis, ac putrescentibus, in Cochinchinâ.
 Aga-

Agaricus pileo convexo, plicato, membranaceo: lamellis remotis: stipite nigro, procero, capillaceo, nudo. Scop. Carn. 1. pag. 29.

† Sp. 7. AGARICUS OVATUS. α Nām tling.

Differ. spec. Agar. stipitatus, totus luteus, pulverulentus: pileo ovato, sub-clauso: lamellis æqualibus.

Hab. Fungus pusillus, integrè luteus, pulverulentus: pileo ovato: lamellis omnibus æqualibus, per parvam aperturam ad basim vix patentibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Affinitatem aliquam habet cum Agarico Clavo. Lin. sp. 25.

† Sp. 8. AGARICUS ARECARIUS. α Nām Cau.

Differ. spec. Agar. stipitatus, albissimus: pileo orbiculato: lamellis alternis crassioribus.

Hab. Fungus minimus, albissimus totus: stipite brevi, cespitoso: pileo rotundo, plano, integro, glabro: lamellis alternis crassioribus.

Habitat in caudice Palmæ Arecæ in Cochinchinâ.

† Sp. 9. AGARICUS RAMOSUS. α Nām cây mưc.

Differ. spec. Agar. stipite ramofo: pileo villofo, lacero: lamellis alternis brevioribus.

Hab. Fungus parvus, parasiticus: stipite in ramos diviso: pileis convexis, cinereis, villosis, incisis, laciniis rotundatis, inæqualibus: lamellis fusco-luteis, alternis brevioribus.

Habitat in Cochinchinâ, in truncis arborum vetustate corruptis.

Fungus igneus (Rumph. Amb. 1. 11. tab. 56. fig. 5.) etiam ramosus videtur, & cum nostro aliquatenus convenit.

GENUS XX. BOLETUS.

Char. Gener. Fungus horizontalis, subtus porosus. Lin. fy. pl. G. 1326.

Sp. 1. BOLETUS SUBEROSUS. α Nām mưc.

Differ. spec. Bol. acaulis pulvinatus, albus, lævis, poris acutis difformibus. Lin. sp. 2.

Hab. Fungus parasiticus, albus: stipite nullo: pileo pulvinato, integro, lævi, crasso: poris in paginâ inferiori oblongis, angulatis, irregularibus.

Habitat in arboribus sylvestribus.

Thunb. Jap. pag. 347. Boletus acaulis, coriaceo-convexus, villosus, albus, poris difformibus, rotundis, flexuosisque. Lin. Fl. Succ.

1093: 1257.

Sp. 2.]

Sp. 2. BOLETUS IGNIARIUS. *α* ^{Nam} ^{Jia}.

Differ. spec. Bol. acaulis, pulvinatus, lævis: *poris* tenuissimis. Lin. sp. 4.

Hab. Fungus parvus, dimidiatus, acaulis, parasiticus: *pileo* coarctato, lævi, subtus ruberrimo, *poris* tenuissimis confito.

Habitat in caudice fruticis Pandani, in Cochinchinâ.

Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figurâ. Bauh. Pin. pag. 372. n. 3. Boletus sub-rotundus, petiolo horizontali brevissimo: tubulis subtilissimis. Gled. Fung. 78. n. 12.

Obler. Colore rubro convenit cum Boletto sanguineo. Lin. sp. 5.

Sp. 3. BOLETUS VERSICOLOR. *α* ^{Nam} ^{cui}.

Differ. spec. Bol. acaulis: *fasciis* dicoloribus: *poris* albis. Lin. sp. 6.

Hab. Fungus parvus, acaulis, coriaceus, villosus, integer: *pileo* plano-concavo: superius *zonis* concentricis, dicoloribus: subtus *poris* albis, minutissimis discreto.

Habitat in lignis putrescentibus, in Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 347. Boletus acaulis, pileo coriaceo, villosus, lineis concentricis, dicoloribus fasciato. Scop. Carn. pag. 46. n. 6.

Sp. 4. BOLETUS CANALIUM. *α* ^{Nam} ^{Xol}.

Differ. spec. Bol. stipitatus: *pileo* albido, umbilicato, viscido: *poris* angulatis.

Hab. Fungus minimus, orbicans, glaber: *stipite* tenui, longo, reflexo: *pileo* integro, umbilicato, lævi, viscido: *poris* angulatis, patulis, marginalibus minutissimis.

Habitat in Cochinchinâ, in tubis ligneis, pluviam tectorum evacuantibus.

GENUS XXI. HYDNUM.

Char. Gener. Fungus horizontalis, subtus echinatus. Lin. sy. pl. G. 1327.

Sp. 1. HYDNUM AURISCALPIUM. *α* ^{Nam} ^{tlang} ^{nhâm}.

Differ. spec. Hyd. stipitatum, *pileo* dimidiato. Lin. sp. 4.

Hab. Fungus magnus, totus candidus: *stipite* brevi, crasso: *pileo* sub-plano, dimidiato, crassissimo, solido: *villis* duriusculis subtus aspero, superius lævi.

Habitat in Cochinchinâ, ad arborum radices supra terram exertus.

Boletus pileo semiorbiculari, leviter fastigiato: tubulis connexis, echinato-denticulatis: petiolo præalto, & tenui. Gled. Fung. 74. n. 7.

GENUS XXII. PHALLUS.

Char. Gener. *Fungus* supra reticulatus, subtus lævis. Lin. fy. pl. G. 1328.

Sp. I. PHALLUS IMPUDICUS. α Nam chò.

Differ. spec. Phal. volvatus, stipitatus: *pileo* celluloso. Lin. sp. 2.

Hab. *Fungus* mediocris, oblongus, volvatus, aquosus, albidus, foetidus, brevis durationis: *stipite* crasso, erecto, solido: *pileo* subovato, demisso, rubescente, inferius lævi, superius celluloso.

Habitat ad sepes in Cochinchinâ.

Phallus Daemonis. Rumph. Amb. I. II. c. 20. tab. 56. fig. 7. Phallus Volvatus, pileo apice clauso. Act. Stockh. 1732. pag. 20. tab. 2. fig. 1.

GENUS XXIII. CLATHRUS.

Char. Gener. *Fungus* sub-rotundus, cancellatus. Lin. fy. pl. G. 1329.

† Sp. I. CLATHRUS CAMPANA. α Nam Rân.

Differ. spec. Cl. *pileo* campaniformi: *stipitis* apice perforato, annulato.

Hab. *Fungus* terrestris, magnus, nudus, albissimus, pulcherrimus: *stipite* 3-pollicari, crasso, recto, tubuloso, apice pervio. *Pileus* campaniformis, altitudine, & diametro 2-pollicaribus: cancellatus lineis ordinatè decussatis, basi truncatus, patens: annulo ad verticem elevato, apicem stipitis exterius circundante.

Habitat circa hortos Cochinchinæ cito putrescens, & foetidus.

GENUS XXIV. HELVELLA.

Char. Gener. *Fungus* turbinatus. Lin. fy. pl. G. 1330.

Sp. I. HELVELLA MITRA. α Nam rách.

Differ. spec. Helv. pileo deflexo, adnato, lobato, difformi. Lin. sp. 1.

Hab. *Fungus* parasiticus, irregularis, mediocris, cinereo-fuscus: *stipite* crasso, solido, brevissimo. *Pileus* turbinatus, inæqualiter lobatus, laciniis obtusis, crassis, deflexis, inferius levibus, superius sub-scabris.

Habitat in truncis arborum putrescentibus, in Cochinchinâ.

Fungi Digitati, & Cochlearis tertia species ex utrisque mixta. Rumph. Amb. I. II. c. 22. pag. 129. tab. 57. fig. E. Elvela ferme sessilis, & parva, lamina in formam capituli deorsum plicato-laciniata & crispâ.

crispâ. Gled. Fung. 38. C. Fungus Autumnalis, bifuscus. Mentz.
Pugill. tab. 6. fig. 2.

† Sp. 2. HELVELLA AMARA. α Nam trâm.

Differ. spec. Helv. stipitata : pileo sub-orbiculato, lævi, apice tur-
gido.

Hab. Fungus parasiticus, mediocris, nudus, integer : pileo orbicula-
to, sub-coriaceo, crassiusculo, utrinque lævi, ad centrum tumido,
superius albo, inferius luteo-fusco : stipite albo, mediocri.

Habitat plerumque in arbore Melaleucâ, in Cochinchinâ.

Ufus. Esculentus, & salutaris, nativâ amaritie per iteratam coctionem
depositâ.

Sp. 3. HELVELLA PINETI. α Nam gôic.

Differ. spec. Helv. Acaulis. Lin. sp. 2.

Hab. Fungus parasiticus, acaulis, albus, mediocris. Pileus dimidia-
tus, sub-turbinatus, coriaceus, inæqualis; supernè crispus, infer-
nè lævis.

Habitat in Cochinchinâ, lateraliter adhærens arborum truncis.

Agaricus acaulis, utrinque planiusculus. Lin. Flor. Lapp. 517.

GENUS XXV. PEZIZA.

Char. Gener. Fungus campanulatus, sessilis. Lin. fy. pl. G. 1331.

Sp. 1. PEZIZA AURICULA. α Nam med. β Mò lli.

Differ. spec. Pez. concava, rugosa, auriformis. Lin. sp. 9.

Hab. Fungus sessilis, parasiticus, membranaceus, rugosus, luteo-fus-
cus, concavus, inæqualis, interdum anfractuofus, sericeus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, adhærens arborum truncis ve-
tustis.

Berg. Mat. Med. pag. 927. Boletus quintus, Auris murina dictus;
Rumph. Amb. 1. II. c. 20. tab. 56. fig. 4.

Virt. Refrigerans, sub-astringens. Internè prodest in dysenteria, &
sputo sanguineo: externè in ophthalmia, si prius in aquâ macera-
tus oculo imponatur.

Uf. Esculentus. Ab indigenis libenter usurpatur cum avibus, vel pe-
dibus porcinis leviter elixatus.

GENUS XXVI. CLAVARIA.

Char. Gener. Fungus lævis, oblongus. Lin. fy. pl. G. 1332.

- Sp. 1. CLAVARIA PISTILLARIS. ^{Nam cút hoi. & Mõ cū tsai.}
 Differ. spec. Clav. clavæformis, simplicissima. Lin. sp. 1.
 Hab. Fungus sesquipollicaris, integerrimus, oblongus, teres, lævis,
 albissimus, crassus, solidus, erectus, in formam clavæ, ovatum
 terminatus.
 Habitat plerumque in acervis stercoreis elephantini in Cochinchinâ,
 & Chinâ.
 Clavaria alba, pistilli formâ, Vaill. Parif. 39. tab. 8. fig. 5. Fungus
 clavatus, albidus, pistillaris. Bocc. Musc. 1. tab. 307.
 Usus. Fungus hic edulis, tener, & sapidus est.

- Sp. 2. CLAVARIA OPHIOGLOSSOIDES. & . . .
 Differ. spec. Clav. clavata, integerrima, compressa, obrusa. Lin. sp. 3.
 Hab. Fungus brevis, tenuis, oblongus, clavatus, sub-compressus, in-
 tegerrimus, lævis, carnosus, erectus, luteo-ruber, vertice obrusus.
 Habitat in rudibus, in Cochinchinâ.
 Clavaria indivisa, nigra, compressa. Hall. Helv. 2206.

- Sp. 3. CLAVARIA MUSCOIDES. & Lū Kiö tsai. & Louc giác thé.
 Differ. spec. Clav. ramis ramosis, acuminatis, inæqualibus, luteis.
 Lin. sp. 8.
 Hab. Fungus sesquipollicaris, luteus, aliquando rubescens, solidus,
 ramosus: ramis sub-divisis, acutis, rectis, erectis, inæqualibus,
 paucis.
 Habitat in scopulis, & aggeribus prope mare in Chinâ, & Cochinchinâ.
 Thunb. Jap. pag. 348. Fungus parvus, ramosus, luteus. Raj. Angl. 3.
 pag. 16. tab. 24. fig. 7.

GENUS XXVII. LYCOPERDON.

Char. Gener. Fungus sub-rotundus, seminibus farinaceis repletus. Lin.
 sy. pl. G. 1333.

- † Sp. 1. LYCOPERDON LAMELLATUM. & Nam cyc.
 Differ. spec. Lyc. parasiticum, semirotondum, ex lamellis nigris coa-
 lescentes.
 Hab. Fungus 2-pollicaris, semirotondus, inæqualis, solidus, glaber,
 inodorus, fusco-purpureus: intus compositus ex lamellis carnosis,
 nigris, artè coherentibus, non farinaceus, sessilis, supra terram
 eminent, inhærens arborum radicibus fibrillis sparsis, raris.
 Habitat in sylvis, & sepibus Cochinchinæ: non edulis.

† Sp. 2.

- † Sp. 2. LYCOPERDON GLOMERATUM. α .
 Differ. spec. Lyc. parasiticum, sub-rotundum, ex multis aggregatum.
 Hab. Fungus sesquipollicaris, sub-rotundus, foris tuberculosus, fuscus: intus carnosus, albus, non farinaceus: quasi ex multis minoribus conglobatus, sessilis: fibrillis radicalibus arborum vetustarum radicibus insidens, supra terram exertus.
 Habitat in sylvis Cochinchinæ: non edulis.
 Tuber Sampadarium. Rumph. Amb. l. 11. c. 18. pag. 123.

GENUS XXVII. MUCOR.

Char. Gener. *Fungus* vesiculis stipitatis. Lin. sy. pl. G. 1334.

- Sp. 1. MUCOR SPHÆROCEPHALUS. α . Moïc đầ.
 Differ. spec. Muc. perennis: *stipite* piliformi, nigro: *capitulo* globoso, cinereo. Lin. sp. 1.
 Hab. Fungus tenuissimus: *stipite* nigro, piliformi, longiusculo, erecto: *capitulo* albicante, globoso, minusculo.
 Habitat in Cochinchinâ, insidens lapidibus, & lignis.
 Sphærocephalos niger: villo ochroleuco. Hall. Helv. 3. tab. 1. fig. 3.

- Sp. 2. MUCOR MUCEDO. α . Moïc bánh hu. β . Múi.
 Differ. spec. Muc. stipitatus, capsulâ globosâ. Lin. sp. 6.
 Hab. Fungus tenuissimus: *stipite* longo, albicante, piliformi, recto: *capitulo* globoso, lucido.
 Habitat in placentis, & oryzâ costâ diu relictis; in Cochinchinâ, & Chinâ.
 Thunb. Jap. pag. 349. Mucor stipite fetaceo, longo: *capitulo* fugaci, globoso. Scop. Carn. 1. pag. 67. n. 5.

- Sp. 3. MUCOR GLAUCUS. α . Moïc Xanh tlâi hu.
 Differ. spec. Muc. stipitatus, *capitulo* sub-rotundo, aggregato. Lin. sp. 8.
 Hab. Fungus exilis, stipitatus: *capitulo* glauco, sub-rotundo, ex multis arcè coeuntibus glomerato.
 Habitat in diversis pomis, quando putredine corrumpuntur.
 Asperpillus capitatus, *capitulo* glauco, seminibus rotundis. Mich. G. 212. tab. 91. fig. 1.
 Observ. Hæ, & aliæ Mucoris species occurrunt passim in Cochinchinâ, quæ ut lanugo quædam mortua, non tanquam viventia vegetabilia habentur ab indigenis. Omnes certè humanis rebus noxæ,

xæ, quam utilitatis afferunt; ideoque in illis describendis non amplius immorandum putavimus.

FINIS.

Et ait: germinet terra herbam virentem, & facientem semen, & lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum . . . Et vidit Deus quod esset bonum. Genes. c. I. v. II. 12.

Benedicite omnia germinantia in terrâ Domino: laudate, & superexaltate eum in sæcula. Daniel. c. 3. v. 76.

I N D E X
GENERUM, ET SPECIERUM.

A
 Brus. Diad. G. 3.
 Sp. 1. Abr. Precatorius. pag. 428.
ABUTUA. Dioc. G. 29.
 1. Abut. Indica. 630.
 2. Abut. Africana. 631.
ACANTHUS. Didyn. G. 20.
 1. Acant. Illicifolius. 375.
ACER. Polyg. G. 8.
 1. Ac. Pinnatum. 649.
ACORUS. Hexand. G. 24.
 1. Acor. Calamus. 208.
ACOSTA. Decand. G. 20.
 1. Acost. Spicata. 276.
ACROSTICHUM. Crypt. G. 3.
 1. Acrost. Lancelatum. 672.
ACTŒA. Polyand. G. 3.
 1. Act. Aspera. 332.
ADENODUS. Dodec. G. 5.
 1. Aden. Sylvestris. 294.
ADIANTUM. Crypt. G. 7.
 1. Adian. Caudatum. 680.
 2. Adian. Flabellulatum. 680.
 3. Adian. Capillus Veneris. 681.
 4. Adian. Scandens. 681.
AERIDES. Gyn. G. 9.
 1. Aer. Odorata. 525.
ÆSCHYNOMENE. Diad. G. 19.
 1. Æsch. Heterophylla. 446.
 2. Æsch. Lagenaria. 446.
AGARICUS. Crypt. G. 19.
 1. Agar. Integer. 690.
 2. Agar. Deliciosus. 691.
 3. Agar. Equestris. 691.
 4. Agar. Fimetiarius. 691.
 5. Agar. Campanulatus. 691.

6. Agar. Androsaceus. 691.
 7. Agar. Ovatus. 692.
 8. Agar. Arecarius. 692.
 9. Agar. Ramosus. 692.
AGERATUM. Syng. G. 12.
 1. Ager. Ciliare. 484.
AGLAIA. Pent. G. 82.
 1. Agl. Odorata. 173.
AGROSTIS. Triand. Gen. 7.
 1. Agrost. Indica. 49.
 2. Agrost. Radiata. 50.
 3. Agrost. Capillaris. 50.
 4. Agrost. Minima. 50.
 5. Agrost. Odorata. 50.
 6. Agrost. Plicata. 51.
AIDIA. Pent. G. 48.
 1. Aid. Cochinchinensis. 143.
AIRA. Triand. G. 20.
 1. Air. Arundinacea. 54.
AJUGA. Didyn. G. 4.
 1. Aj. Orientalis. 393.
 2. Aj. Reptans. 393.
ALCEA. Monad. G. 17.
 1. Alc. Africana. 421.
ALETIS. Hex. G. 17.
 1. Alet. Cochinchinensis. 204.
ALLASIA. Tetr. G. 24.
 1. Allas. Payot. 85.
ALLIUM. Hex. G. 15.
 1. All. Sativum. 201.
 2. All. Cepa. 201.
 3. All. Triquetrum. 202.
 4. All. Afcalonicum. 202.
 5. All. Odorum. 203.
 6. All. Angulosum. 203.
ALLOPHYLUS. Octand. G. 9.
 1. Alloph. Ternatus. 232.
ALOE. Hex. G. 36.
 1. Aloe

- I. Aloe. Perfoliata. 203.
 ALOEXYLUM. Dec. G. 8.
 I. ALOEX. Agallochum. 267.
 ALOPECURUS. Triand. G. 13.
 I. Alop. Hordeiformis. 38.
 AMARANTHUS. Pent. G. 12.
 I. Amar. Tricolor. 560.
 2. Amarant. Polygamus. 560.
 3. Amar. Trifidis. 560.
 4. Amar. Oleraceus. 561.
 5. Amar. Cruentus. 561.
 6. Amar. Spinofus. 561.
 AMARYLLIS. Hex. G. 12.
 I. Amar. Sarnienfis. 200.
 AMOMUM. Monand. G. 12.
 I. Am. Zingiber. 2.
 2. Am. Zerumbet. 2.
 3. Am. Cardamomum. 3.
 4. Am. Villofum. 4.
 5. Am. Medium. 4.
 6. Am. Globofum. 4.
 7. Am. Hirfutum. 5.
 8. Am. Galanga. 5.
 9. Am. Arboreum. 7.
 AMYGDALUS. Icoff. G. 9.
 I. Amygd. Perfica. 315.
 2. Amygd. Communis. 316.
 3. Amygd. Pumila. 316.
 4. Amygd. Cochinchinenfis. 316.
 AMYRIS. Octand. G. 6.
 I. Amyr. Ambrosiaca. 230.
 ANACARDIUM. Enneand. G. 2.
 I. Anac. Occidentale. 248.
 ANAGYRIS. Decand. G. 1.
 I. Anag. Foetida. 260.
 2. Anag. Inodora. 260.
 ANCHUSA. Pent. G. 5.
 I. Anch. Officinalis. 103.
 ANDROPOGON. Polyg. G. 3.
 I. And. Schoenanthus. 646.
 ANETHUM. Pent. G. 97.
 I. Anet. Foeniculum. 181.
 ANNONA. Polyand. G. 26.
 I. Annon. Squamofa. 349.
 2. Annon. Afatica. 350.
 ANOMA. Decand. G. 23.
 I. Anom. Moringa. 279.
 2. Anom. Morunga. 279.
 3. Anom. Cochinchinenfis. 280.
 ANTHERURA. Pent. G. 49.
 I. Anther. Rubra. 144.
 ANTHOXANTHUM. Diand. G. 14.
 I. Anthox. Pulcherrimum. 29.
 ANTHYLLIS. Diad. Gen. 6.
 I. Ant. Indica. 429.
 ANTIDESMA. Dioec. G. 18.
 I. Antid. Scandens. 617.
 ANTIRRHINUM. Didyn. G. 31.
 I. Antirr. Spurium. 383.
 2. Antirr. Linara. 383.
 3. Antirr. Molle. 383.
 4. Antirr. Percinum. 384.
 5. Antirr. Aquaticum. 384.
 APOCYNUM. Pent. G. 76.
 I. Apoc. Reticulatum. 167.
 2. Apoc. Juventas. 167.
 3. Apoc. Alterniflorum. 368.
 4. Apoc. Africanum. 368.
 ARACHIS. Diad. G. 7.
 I. Arach. Afatica. 430.
 2. Arach. Africana. 430.
 ARALIA. Pent. G. 107.
 I. Aral. Octophylla. 187.
 2. Aral. Palmata. 187.
 3. Aral. Chinenfis. 187.
 ARECA. Monoec. G. 26.
 I. Ar. Catechu. 567.
 2. Ar. Sylveltris. 568.
 ARGYREIA. Pent. G. 36.
 I. Arg. Obtusifolia. 134.
 2. Arg. Acuta. 135.
 3. Arg. Arborea. 135.
 ARISTOLOCHIA. Gyn. G. 14.
 I. Arist. Indica. 528.
 ARISTOTELEA. Gyn. Gen. 6.
 I. Arist. Spiralis. 522.

- ARSIS. Polyand. G. 8.
 1. Arf. Rugosa. 335.
- ARTEMISIA. Syng. G. 19.
 1. Artem. Judaica. 489.
 2. Artem. Aquatica. 490.
 3. Artem. Abrotanum. 490.
 4. Artem. Annuā. 490.
 5. Artem. Vulgaris. 491.
 6. Artem. Chinenfis. 492.
- ARUM. Gyn. G. 19.
 1. Ar. Dracontium. 533.
 2. Ar. Triphyllum. 533.
 3. Ar. Pentaphyllum. 533.
 4. Ar. Trilobatum. 534.
 5. Ar. Sagittifolium. 534.
 6. Ar. Colocasia. 534.
 7. Ar. Esculentum. 535.
 8. Ar. Macrorrhizum. 535.
 9. Ar. Arisarum. 535.
 10. Ar. Indicum. 536.
 11. Ar. Cucullatum. 536.
- ARUNDO. Triand. G. 22.
 1. Arund. Donax. 55.
 2. Arund. Epigegos. 55.
 3. Arund. Piscatoria. 55.
 4. Arund. Dioica. 55.
 5. Arund. Bambu. 56.
 6. Arundo. Agrestis. 57.
 7. Arund. Mitis. 57.
 8. Arund. Multiplex. 58.
- ASARUM. Dodec. G. 1.
 1. Asar. Virginicum. 292.
- ASCLEPIAS. Pent. G. 78.
 1. Ascl. Fusca. 170.
- ASPALATHUS. Diad. G. 8.
 1. Asp. Arborea. 431.
- ASPLENIUM. Crypt. G. 5.
 1. Aspl. Hemionitis. 677.
 2. Aspl. Scolopendrium. 677.
 3. Aspl. Nodosum. 678.
 4. Aspl. Trichomanoides. 678.
 5. Aspl. Bulbosum. 678.
- ASTER. Syng. G. 34.
 1. Aster. Indicus. 503.
- ASTRANTHUS. Heptand. G. 3.
 1. Astrant. Cochinchinensis. 222.
- ATHAMANTA. Pent. Gen. 92.
 1. Atham. Chinenfis. 178.
- ATRUPHYLLUM. Pent. G. 21.
 1. Atruph. Lineare. 120.
- AUBLETIA. Decand. G. 28.
 1. Aubl. Ramosissima. 287.
- AVERRHOA. Pent. G. 35.
 1. Averrh. Carambola. 288.
 2. Averrh. Bilimbi. 289.
- AUGIA. Polyan. G. 11.
 1. Aug. Sinensis. 337.
- AULACIA. Decan. G. 16.
 1. Aul. Falcata. 273.
- AXIA. Triand. G. 2.
 1. Ax. Cochinchinensis. 36.
- AZALEA. Pent. G. 13.
 1. Azal. Punctata. 113.

B

- BACCAUREA. Polyg. G. 19.
 1. Bacc. Ramiflora. 661.
 2. Bacc. Cauliflora. 661.
 3. Bacc. Sylvestris. 662.
- BACCHARIS. Syng. G. 22.
 1. Bacch. Diolcoridis. 494.
 2. Bacch. Salvia. 494.
 3. Bacch. Chinenfis. 494.
- BALLOTA. Didyn. G. 6.
 1. Ball. Pilosa. 364.
- BALSAMARIA. Polyad. G. 3.
 1. Bals. Inophyllum. 470.
- BARBULA. Didyn. G. 10.
 1. Barb. Sinensis. 367.
- BARLERIA. Didyn. G. 23.
 1. Barl. Procumbens. 377.
- BARYXYLUM. Dec. G. 7.
 1. Baryx. Rufum. 266.
- BASELLA. Pent. G. 102.
 1. Bas. Nigra. 183.

- BEMBIX.** Dec. G. 27.
 1. Bemb. Tectoria. 282.
BETA. Pent. G. 85.
 1. Bet. Vulgaris. 174.
BETONICA. Didyn. G. 5.
 1. Beton. Officinalis. 364.
BIDENS. Syng. G. 17.
 1. Bid. Pilosa. 488.
 2. Bid. Bipinnata. 488.
BIGNONIA. Didyn. G. 26.
 1. Bign. Indica. 379.
 2. Bign. Pentandra. 379.
 3. Bign. Longissima. 380.
BLASTUS. Gyn. G. 11.
 1. Blast. Cochinchinensis. 527.
BOBARTIA. Triand. G. 11.
 1. Bob. Indica. 45.
BOERHAAVIA. Monand. G. 9.
 1. Boer. Diffusa. 15.
 2. Boer. Africana. 16.
BOLETUS. Crypt. G. 20.
 1. Bol. Suberosus. 692.
 2. Bol. Ignarius. 693.
 3. Bol. Versicolor. 693.
 4. Bol. Canalicum. 693.
BOMBAX. Monad. G. 13.
 1. Bomb. Pentandrum. 415.
BORASSUS. Dioec. G. 19.
 1. Bor. Flabelliformis. 618.
 2. Bor. Gomutus. 618.
 3. Bor. Caudata. 619.
 4. Bor. Tunicata. 619.
BOSEA. Pent. G. 88.
 1. Bos. Cannabina. 176.
BOTRIA. Pent. 59.
 1. Botr. Africana. 154.
BRAGANTIA. Gyn. Gen. 13.
 1. Brag. Racemosa. 528.
BRASSICA. Tetrad. G. 4.
 1. Brass. Oleracea. 396.
 2. Brass. Chinenfis. 397.
BROMELIA. Hex. G. 1.
 1. Brom. Ananas. 192.
BRYONIA. Monoec. G. 49.
 1. Bryon. Hastata. 594.
 2. Bryon. Triloba. 595.
 3. Bryon. Grandis. 595.
 4. Bryon. Cochinchinensis. 595.
BRYUM. Crypt. G. 12.
 1. Bry. Undulatum. 683.
 2. Bry. Truncatum. 684.
 3. Bry. Viridulum. 684.
BUBON. Pent. G. 94.
 1. Bub. Macedonicum. 179.
BUDLEIA. Tetr. G. 9.
 1. Budl. Asiatica. 72.
 2. Budl. Ternata. 72.
BUPHTHALMUM. Syng. G. 38.
 1. Bupht. Oleraceum. 506.
BUXUS. Monoec. G. 13.
 1. Bux. Sempervirens. 554.
BYSSUS. Crypt. G. 15.
 1. Byss. Candellaris. 687.

C

- CACALIA.** Syng. G. 13.
 1. Cac. Procumbens. 485.
 2. Cac. Bulbosa. 485.
 3. Cac. Sonchifolia. 486.
 4. Cac. Pinnatifida. 486.
CACTUS. Icof. G. 1.
 1. Cact. Ficus Indica. 306.
CAESALPINIA. Dec. G. 3.
 1. Cees. Sappan. 262.
CALAMUS. Hex. G. 25.
 1. Cal. Petrus. 209.
 2. Cal. Rudentum. 209.
 3. Cal. Scipionum. 210.
 4. Cal. Verus. 210.
 5. Cal. Amarus. 210.
 6. Cal. Dioicus. 211.
CALEA. Syng. G. 16.
 1. Cal. Cordata. 488.
CALISPERMUM. Pent. G. 62.
 1. Calisp. Scandens. 156.

- CALLA. Gyn. Gen. 18.
 1. Cal. Occulta. 532.
- CALLICARPA. Tetr. G. 6.
 1. Callic. Americana. 70.
 2. Callic. Umbellata. 70.
 3. Callic. Triloba. 70.
- CALLIGONUM. Polyand. G. 18.
 1. Callig. Asperum. 342.
- CALLISTA. Gyn. G. 2.
 1. Callist. Amabilis. 519.
- CALODIUM. Gyn. G. 1.
 1. Calod. Cochinchinense. 247.
- CAMBOGIA. Polyand. G. 4.
 1. Camb. Gutta. 332.
- CAMELLIA. Monad. G. 9.
 1. Camel. Drupifera. 411.
- CAMPANULA. Pent. G. 43.
 1. Campan. Repens. 139.
- CAMP SIS. Didyn. Gen. 24.
 1. Camps. Adrepens. 378.
- CAMPYLUS. Pent. G. 14.
 1. Campyl. Sinenfis. 113.
- CANARINA. Hex. G. 5.
 1. Canar. Zanguebar. 195.
- CANNA. Monand. G. 3.
 1. Canna. Indica. 10.
- Cannabis. Dioec. G. 16.
 1. Cannab. sativa. 616.
- CAPPARIS. Polyand. G. 2.
 1. Capp. Zeylanica. 330.
 2. Capp. Cantonienfis. 331.
 3. Capp. Magna. 331.
 4. Capp. Falcata. 331.
- CAPSIUM. Pent. G. 32.
 1. Caps. Annuum. 127.
 2. Caps. Baecatum. 127.
 3. Caps. Frutescens. 128.
- CARDAMINE. Tetrad. G. 7.
 1. Cardam. Chelidonia. 398.
- CARDIOSPERMUM. Oct. G. 15.
 1. Card. Halicacabum. 239.
 2. Card. Corindum. 239.
- CARDUUS. Syng. G. 9.
 1. Card. Lanceolatus. 482.
 1. Card. Tuberosus. 482.
- CARICA. Dioec. G. 27.
 1. Caric. Papaia. 628.
- CARISSA. Pent. G. 28.
 1. Cariff. Carandás. 124.
- CARTHAMUS. Syng. G. 8.
 1. Carth. Tinctorius. 481.
- CARYOPHYLLUS. Pol. Gen. 5.
 1. Caryoph. Aromaticus. 333.
- CARYOTA. Monoec. G. 27.
 1. Caryot. Mitis. 569.
- CASSIA. Dec. G. 5.
 1. Cass. Tora. 263.
 2. Cass. Obruusifolia. 263.
 3. Cass. Fistula. 264.
 4. Cass. Sophera. 264.
 5. Cass. Procumbens. 264.
- CASUARINA. Monoec. G. 5.
 1. Casuar. Africana. 549.
- CATHETUS. Dioec. G. 5.
 1. Cathet. Fasciculata. 608.
- CATURUS. Dioec. G. 11.
 1. Catur. Scandens. 612.
- CAUCALIS. Pent. G. 90.
 1. Cauc. Orientalis. 177.
- CEDRELA. Pent. G. 67.
 1. Cedr. Rosmarinus. 160.
- CELOSIA. Pent. G. 71.
 1. Celos. Castrenfis. 163.
 2. Celos. Angentea. 163.
 3. Celos. Margaritacea. 164.
- CENTAUREA. Syng. G. 41.
 1. Centaur. Phrygia. 508.
- CENTIPEDA. Syng. G. 20.
 1. Centip. Orbicularis. 493.
- CEPHALANTHUS. Tetrand. G. 2.
 1. Cephal. Occidentalis. 67.
 2. Cephal. Angustifolius. 67.
 3. Cephal. Procumbens. 67.
 4. Cephal. Montanus. 67.
 5. Ceph. Stellatus. 68.
- CERAIA. Gyn. G. 1.
 1. Cer.

1. Cer. Simplicissima. 518.
CERASTIUM. Dec. G. 30.
 1. Cerast. Repens. 284.
CERBERA. Pent. G. 38.
 1. Cerb. Salutaris. 136.
CERIUM. Pent. G. 37.
 1. Cer. Spicatum. 136.
CEROPEGIA. Pent. G. 15.
 1. Cerop. Candelabrum. 114.
 2. Cerop. Obtusa. 114.
 3. Cerop. Cordata. 114.
CHALCAS. Dec. G. 13.
 1. Chalc. Paniculata. 270.
 2. Chalc. Japonensis. 271.
CHAMÆROPS. Polyg. G. 15.
 1. Chamær. Cochinchinensis. 657.
CHELIDONIUM. Polyand. G. 1.
 1. Chel. Maius. 330.
CHELONE. Didyn. G. 30.
 1. Chel. Obliqua. 382.
CHENOPODIUM. Pent. G. 84.
 1. Chenop. Hybridum. 174.
CHRYSANTHEMUM. Syng. G. 28.
 1. Chryf. Indicum. 499.
 2. Chryf. Procumbens. 499.
CHRISOCOMA. Syng. G. 14.
 1. Chryfoc. Villosa. 486.
CICCA. Monoec. G. 15.
 1. Cic. Racemosa. 556.
CICHOBIUM. Syng. G. 1.
 1. Cich. Endivia. 478.
CINERARIA. Syng. G. 31.
 1. Ciner. Repanda. 501.
CISSUS. Tetrand. G. 25.
 1. Ciss. Trifoliata. 83.
 2. Ciss. Vitiginea. 83.
 3. Ciss. Quadrangularis. 84.
 4. Ciss. Umbellata. 84.
CITRUS. Polyad. G. 1.
 1. Citr. Medica. 465.
 2. Citr. Aurantium. 466.
 3. Citr. Nobilis. 466.
 4. Citr. Madurensis. 467.
 5. Citr. Margarita. 467.
 6. Citr. Fulca. 467.
 7. Citr. Decumana. 467.
CITTA. Diad. G. 28.
 1. Cit. Nigricans. 456.
CLADODES. Monoec. G. 32.
 1. Clad. Rugosa. 574.
CLATHRUS. Crypt. G. 23.
 1. Clathr. Campana. 694.
CLAVARIA. Crypt. G. 26.
 1. Clav. Pistillaris. 696.
 2. Clav. Ophiglossoides. 696.
 3. Clav. Muscoides. 696.
CLEMATIS. Polyand. G. 21.
 1. Clem. Dioica. 344.
 2. Clem. Virginiana. 345.
 3. Clem. Sinensis. 345.
 4. Clem. Minor. 345.
CLEOME. Tetrad. G. 6.
 1. Cleom. Pentaphylla. 397.
 2. Cleom. Icosandra. 398.
CLERODENDRUM. Didyn. G. 37.
 1. Clerod. Infortunatum. 387.
CLINOPODIUM. Didyn. G. 19.
 1. Clinop. Asiaticum. 374.
CLITORIA. Diad. G. 26.
 1. Clitoria Ternatea. 454.
CLUTIA. Dioec. G. 37.
 1. Clut. Monoica. 638.
COCCOLOBA. Ostand. G. 16.
 1. Coccol. Asiatica. 239.
 2. Coccol. Cymosa. 240.
COCOS. Monoec. G. 25.
 1. Cocos Nucifera. 566.
 2. Cocos Nypa. 567.
COFFEA. Pent. G. 50.
 1. Coff. Arabica. 144.
 2. Coff. Racemosa. 145.
 3. Coff. Zanguebarica. 145.
COIX. Monoec. G. 8.
 1. Coix Lachryma. 551.
 2. Coix Agrestis. 551.
COLEUS. Didyn. G. 17.
 1. Co-

1. Coleus Amboinicus. 372.
COLUMELLA. Terr. G. 27.
 1. Colum. Pedata. 86.
COLUMNEA. Didyn. 32.
 1. Column. Stellata. 384.
COMMELINA. Triand. G. 6.
 1. Comm. Communis. 38.
 2. Comm. Africana. 39.
 3. Comm. Benghalensis. 39.
 4. Comm. Cucullata. 39.
 5. Comm. Tuberosa. 40.
 6. Comm. Medica. 40.
 7. Comm. Zanonina. 40.
COMMIA. Dioec. G. 3.
 1. Com. Cochinchinensis. 606.
CONFERVA. Crypt. G. 18.
 1. Conf. Litoralis. 689.
 2. Conf. Dichotoma. 690.
 3. Conf. Corallina. 690.
CONVOLVULUS. Pent. G. 9.
 1. Conv. Arvensis. 106.
 2. Conv. Scammonia. 106.
 3. Conv. Medium. 106.
 4. Conv. Panduratus. 107.
 5. Conv. Obscurus. 107.
 6. Conv. Batatas. 107.
 7. Conv. Mammosus. 108.
 8. Conv. Malabaricus. 108.
 9. Conv. Canariensis. 108.
 10. Conv. Tomentosus. 108.
 11. Conv. Reptans. 109.
 12. Conv. Bufalinus. 109.
 13. Conv. Pes caprae. 109.
 14. Conv. Aggregatus. 109.
CONYZA. Syng. G. 23.
 1. Conyz. Pubigera. 495.
 2. Conyz. Candida. 495.
 3. Conyz. Odorata. 495.
 4. Conyz. Chinensis. 496.
 5. Conyz. Hirsuta. 496.
CORCHORUS. Polyand. G. 7.
 1. Corch. Capsularis. 334.
COREOPSIS. Syng. G. 42.
 1. Coreopf. Leucorrhiza. 508.
 2. Coreopf. Biternata. 508.
CORIANDRUM. Pent. G. 96.
 1. Coriand. Sativum. 180.
 2. Coriand. Testiculatum. 180.
CORNUTIA. Didyn. G. 36.
 1. Corn. Quinata. 387.
CORONILLA. Diad. G. 21.
 1. Coron. Cochinchinensis. 452.
CORYPHA. Hex. G. 27.
 1. Coryph. Saribus. 212.
 2. Coryph. Africana. 213.
 3. Coryph. Pilearia. 213.
COTULA. Syng. G. 21.
 1. Cotul. Anthemoides. 493.
COTYLEDON. Dec. G. 33.
 1. Cotyl. Laciniata. 286.
 2. Cotyl. Serrata. 287.
CRASSULA. Pent. G. 105.
 1. Crass. Pinnata. 185.
CRASPEDUM. Polyand. G. 10.
 1. Crasp. Tectorium. 336.
CRATÆGUS. Icos. G. 13.
 1. Crat. Indica. 319.
 2. Crat. Bibas. 319.
 3. Crat. Rubra. 320.
CREODUS. Tetrand. G. 32.
 1. Creod. Odorifer. 89.
CRINUM. Hex. G. 9.
 1. Crin. Asiaticum. 197.
 2. Crin. Zeylanicum. 198.
CROTOLARIA. Diad. G. 11.
 1. Crotol. Heptaphylla. 433.
 2. Crotol. Scandens. 433.
CROTON. Monoec. G. 40.
 1. Croton. Punctatum. 581.
 2. Croton. Lanatum. 581.
 3. Croton. Congestum. 582.
 4. Croton. Tigilium. 582.
 5. Croton. Lacciferum. 582.
 6. Croton. Aromaticum. 583.
 7. Croton. Moluccanum. 583.
CRUCIANELLA. Tetrand. G. 19.
 1. Cruc.

- I. Cruc. Angustifolia. 79.
CUBOSPERMUM. Dec. G. 19.
 I. Cubosp. Palustre. 275.
CUCUMIS. Monoec. G. 47.
 I. Cucum. Sativus. 591.
 2. Cucum. Melo. 591.
 3. Cucum. Acutangulus. 591.
 4. Cucum. Maderalpatanus. 592.
CUCURBITA. Monoec. G. 48.
 I. Cucurb. Lagenaria. 592.
 2. Cucurb. Pepo. 593.
 3. Cucurb. Melopepo. 593.
 4. Cucurb. Citrullus. 594.
CUPRESSUS. Monoec. G. 38.
 I. Cupr. Sempervirens. 580.
 2. Cupr. Thyoides. 580.
CURCUMA. Monand. G. 2.
 I. Curc. Longa. 8.
 2. Curc. Rotunda. 9.
 3. Curc. Pallida. 9.
CYATHULA. Pent. G. 2.
 I. Cyat. Geniculata. 102.
CYCAS. Dioec. G. 30.
 I. Cyc. Inermis. 632.
CYLINDRIA. Tetrand. G. 4.
 I. Cylind. Rubra. 69.
CYNANCHUM. Pent. G. 74.
 I. Cynanch. Odoratissimum. 166.
 2. Cynanch. Inodorum. 166.
CYNOMETRA. Dec. G. 9.
 I. Cynom. Pinnata. 268.
CYNOSURUS. Triand. G. 25.
 I. Cynof. Egyptius. 59.
 2. Cynof. Indicus. 59.
CYPERUS. Triand. G. 8.
 I. Cyp. Articulatus. 41.
 2. Cyp. Monti. 42.
 3. Cyp. Rotundus. 42.
 4. Cyp. Elatus. 42.
 5. Cyp. Compressus. 43.
 6. Cyp. Pumilus. 43.
CYRTA. Dec. G. 22.
 I. Cyrt. Agrestis. 278.
CYTISUS. Diad. G. 36.
 I. Cyt. Cajan. 462.
D
DAPHNE. Oct. G. 13.
 I. Daph. Triflora. 236.
 2. Daph. Cannabina. 236.
 3. Daph. Indica. 237.
 4. Daph. Odora. 237.
DARTUS. Pent. G. 27.
 I. Dart. Perlarius. 124.
DASUS. Pent. G. 46.
 I. Das. Verticillatus. 142.
DATURA. Pent. G. 10.
 I. Dat. Metel. 110.
DAUCUS. Pent. G. 91.
 I. Dauc. Carota. 178.
DECADIA. Icos. G. 8.
 I. Decad. Aluminosa. 315.
DENTIDIA. Didyn. G. 13.
 I. Dent. Nankinensis. 369.
DERRIS. Diad. G. 10.
 I. Derr. Pinnata. 432.
 2. Derr. Trifoliata. 433.
DESMOS. Polyand. G. 28.
 I. Desm. Cochinchinensis. 352.
 2. Desm. Chinenfis. 352.
DIANTHERA. Diand. G. 9.
 I. Dianth. Paniculata. 26.
DIANTHUS. Dec. G. 26.
 I. Dianth. Caryophyllus. 281.
 2. Dianth. Chinenfis. 282.
DIAPHORA. Monoec. G. 36.
 I. Diaph. Cochinchinensis. 578.
DIATOMA. Dodec. G. 7.
 I. Diat. Brachiata. 296.
DICALIX. Polyg. G. 21.
 I. Dical. Cochinchinensis. 663.
DICEROS. Didyn. G. 28.
 I. Dicer. Cochinchinensis. 381.
DICHROA. Dodec. G. 12.
 I. Dichroa Febrifuga. 307.
Dr

- DIGITALIS. Didyn. G. 25.
 1. Digit. Cochinchinensis. 378.
 2. Digit. Sinensis. 378.
- DIMOCARPUS. Octand. G. 10.
 1. Dimoc. Lichi. 233.
 2. Dimoc. Longan. 233.
 3. Dimoc. Crinita. 234.
 4. Dim. Informis. 234.
- DIOSCOREA. Dioec. G. 23.
 1. Diosc. Alata. 623.
 2. Diosc. Oppositifolia. 624.
 3. Diosc. Eburina. 625.
 4. Diosc. Cirrhosa. 625.
 5. Diosc. Aculeata. 625.
- DIOSMA. Pent. G. 68.
 1. Diosm. Asiatica. 161.
- DIOSPYROS. Octand. G. 3.
 1. Diosp. Lotus. 226.
 2. Diosp. Kaki. 226.
 3. Diosp. Lobata. 227.
 4. Diosp. Decandra. 227.
 5. Diosp. Dodecandra. 228.
- DIPHACA. Diadelph. G. 25.
 1. Diph. Cochinchinensis. 454.
- DISSOLENA. Pent. G. 40.
 1. Dissol. Verticillata. 138.
- DODECADIA. Icol. G. 12.
 1. Dodec. Agrestis. 319.
- DOLICHOS. Diad. G. 13.
 1. Dol. Sinensis. 436.
 2. Dol. Unguiculatus. 436.
 3. Dol. Enniformis. 437.
 4. Dol. Tetragnolobus. 437.
 5. Dol. Pruriens. 438.
 6. Dol. Altrissimus. 438.
 7. Dol. Purpureus. 438.
 8. Dol. Albus. 439.
 9. Dol. Bulbosus. 439.
 10. Dol. Trilobus. 439.
 11. Dol. Montanus. 440.
 12. Dol. Biflorus. 441.
 13. Dol. Soia. 441.
 14. Dol. Catiang. 442.
15. Dol. Hastatus. 442.
- DONAX. Monand. G. 4.
 1. Don. Arundiniflora. 111.
- DORSTENIA. Tetr. G. 35.
 1. Dorst. Chinensis. 90.
- DRACENA. Hex. G. 8.
 1. Drac. Ferrea. 196.
 2. Drac. Ennsifolia. 197.
- DRACOCEPHALUM. Didyn. G. 15.
 1. Dracoc. Cochinchinensis. 371.
- DROSERA. Pent. G. 106.
 1. Dros. Rotundifolia. 186.
 2. Dros. Umbellata. 186.
- DRUPATRIS. Icol. G. 7.
 1. Drup. Cochinchinensis. 314.
- DYSODA. Pent. G. 51.
 1. Disod. Fasciculata. 146.
- E**
- EBENOXYLUM. Dioec. G. 12.
 1. Ebenox. Verum. 613.
- ECHINUS. Dioec. G. 31.
 1. Echin. Trifidus. 633.
- ECHIVM. Pent. G. 3.
 1. Ech. Vulgare. 102.
- ECLIPTA. Syng. G. 37.
 1. Eclipta Erecta. 505.
 2. Eclipta Posrata. 505.
- ECHTRUS. Polyand. G. 20.
 1. Echtr. Trivialis. 344.
- ELÆAGANUS. Tetr. G. 33.
 1. Elæag. Latifolia. 89.
- ELÆOCARPUS. Polyand. G. 12.
 1. Elæoc. Integerrima. 338.
- ENKIANTHUS. Dec. G. 21.
 1. Enkiant. Quinquiflora. 277.
 2. Enkiant. Biflora. 277.
- ENYDRA. Syng. G. 45.
 1. Enyd. Fluctuans. 511.
- EPIDENDRUM. Gyn. G. 8.
 1. Epid. Tuberosum. 523.
 2. Epid. Ennsifolium. 524.

- EPILOBIUM.** Octand. G. 2.
 1. Epil. Tetragonum. 225.
- ERIGIETUM.** Crypt. G. 1.
 1. Equic. Arvense. 671.
 2. Equic. Hyemale. 671.
- ERANTHEMUM.** Diandr. G. 30.
 1. Eranth. Spinofum. 19.
- ERIGERON.** Syng. G. 19.
 1. Erig. Philadelphium. 500.
 2. Erig. Hirsutum. 500.
- ERIOCAULON.** Triandr. G. 27.
 1. Erioc. Quadrangulare. 60.
 2. Erioc. Setaceum. 60.
- ERVUM.** Diad. G. 34.
 1. Erv. Hirsutum. 461.
- ERYTHRINA.** Diad. G. 2.
 1. Eryth. Coralodendrum. 427.
 2. Eryth. Fulca. 427.
- EUCLEA.** Dioec. G. 28.
 1. Eucl. Pilosa. 629.
 2. Eucl. Herbacea. 629.
- EUGENIA.** Icol. G. 2.
 1. Eug. Malaccensis. 306.
 2. Eug. Jambos. 307.
 3. Eug. Acutangula. 307.
 4. Eug. Nervosa. 308.
 5. Eug. Corticosa. 308.
- EVONYMUS.** Pent. G. 63.
 1. Evon. Chinenfis. 156.
- EUPATORIUM.** Syng. G. 15.
 1. Eupat. Purpureum. 487.
 2. Eupat. Sinuatum. 487.
- EUPHORBIA.** Dodec. G. 9.
 1. Euphorb. Antiquorum. 298.
 2. Euphorb. Edulis. 298.
 3. Euphorb. Neriifolia. 298.
 4. Euphorb. Tirucalli. 299.
- EXCÆCARIA.** Dioec. G. 10.
 1. Excæc. Cochinchinensis. 612.
- EYSTATHES.** Octand. G. 11.
 1. Eyst. Sylvestris. 235.
- FAGARA.** Tetr. G. 20.
 1. Fagar. Piperita. 80.
- FAGUS.** Monoec. G. 29.
 1. Fag. Castanea. 571.
 2. Cochinchinensis. 571.
- FALLOPIA.** Polyandr. G. 9.
 1. Fallop. Nervosa. 336.
- FIBRAUREA.** Dioec. G. 24.
 1. Fibraur. Tinctoria. 626.
- FICUS.** Polyg. G. 22.
 1. Fic. Carica. 664.
 2. Fic. Sycomorus. 664.
 3. Fic. Religiosa. 664.
 4. Fic. Benghalensis. 665.
 5. Fic. Indica. 665.
 6. Fic. Benjamina. 665.
 7. Fic. Auriculata. 666.
 8. Fic. Maculata. 666.
 9. Fic. Septica. 667.
 10. Fic. Pumila. 667.
 11. Fic. Politoria. 667.
 12. Fic. Simplicissima. 667.
 13. Ficus Cannabina. 668.
- FLAGELLARIA.** Hex. G. 26.
 1. Flagell. Indica. 211.
 2. Flagell. Repens. 212.
- FLOSCOPA.** Hex. G. 2.
 1. Flosc. Scandens. 193.
- FONTALIS.** Crypt. G. 13.
 1. Fontin. Heterophylla. 684.
- FRAGARIA.** Icol. G. 19.
 1. Fragar. Vesca. 325.
- FRITILLARIA.** Hex. G. 21.
 1. Fritill. Cantonensis. 206.
- FUCUS.** Crypt. G. 17.
 1. Fucus Uvarius. 688.
 2. Fuc. Natans. 688.
 3. Fuc. Inflatus. 688.
 4. Fuc. Granulatus. 688.
 5. Fuc. Aculeatus. 688.

6. Fuc. Tendo. 689.
 7. Fuc. Saccharinus. 689.
- G**
- GALEOLA. Gyn. G. 4.
 1. Galeol. Nudifolia. 521.
 GALIUM. Tetr. G. 17.
 1. Gal. Tuberosum. 79.
 GARCIANA. Monand. G. 8.
 1. Garc. Cochinchinensis. 15.
 GARDENIA. Pent. G. 53.
 1. Gard. Grandiflora. 147.
 2. Gard. Florida. 147.
 3. Gard. Volubilis. 148.
 GAURA. Oct. G. 1.
 1. Gaur. Chinenfis. 225.
 GELA. Oct. G. 9.
 1. Gel. Lanceolata. 232.
 GEMELLA. Polyg. G. 7.
 1. Gemel. Trifolia. 649.
 GENIPA. Pent. G. 54.
 1. Gen. Bufalina. 149.
 2. Gen. Esculenta. 149.
 3. Gen. Flava. 149.
 GENISTA. Diad. G. 4.
 1. Genist. Scandens. 428.
 GENTIANA. Pent. G. 80.
 1. Gent. Scandens. 171.
 2. Gent. Aquatica. 172.
 GLABRARIA. Polyad. G. 4.
 1. Glabr. Terfa. 471.
 GLADIOLUS. Triandr. G. 3.
 1. Glad. Undulatus. 36.
 GLYCINE. Diad. G. 29.
 1. Glyc. Subterranea. 457.
 GLYCYRRHIZA. Diad. G. 18.
 1. Glycyrrh. Echinata. 445.
 2. Glycyrrh. Glabra. 446.
 GMELINA. Didyn. G. 21.
 1. Gmel. Asiatica. 376.
 GNAPHALUM. Syng. G. 25.
 1. Gnaph. Indicum. 497.
 GOMPHRÆNA. Pent. G. 86.
 1. Gomph. Globosa. 175.
 GONUS. Polyg. G. 16.
 1. Gon. Amarissimus. 658.
 GORTERIA. Syng. G. 40.
 1. Gort. Setola. 507.
 GOSSYPIUM. Monad. G. 14.
 1. Gossyp. Herbaceum. 415.
 2. Gossyp. Arboreum. 416.
 GRAMMICA. Pent. G. 89.
 1. Gram. Aphylla. 171.
 GRATIOLA. Diandr. G. 7.
 1. Grat. Hystopiodides. 22.
 2. Grat. Stricta. 23.
 3. Grat. Rugosa. 23.
 GRONA. Diad. G. 31.
 1. Gron. Repens. 459.
 GUILANDINA. Dec. G. 6.
 1. Guil. Bonducella. 265.
 2. Guil. Gemina. 265.
- H**
- HECATONIA. Dodec. G. 14.
 1. Hecat. Palustris. 303.
 2. Hecat. Pilosa. 303.
 Hedona. Dec. G. 32.
 1. Hedona Sinensis. 286.
 Hedyotis. Tetrand. G. 15.
 1. Hed. Herbacea. 77.
 Hedyfarum. Diad. G. 20.
 1. Hed. Reniforme. 447.
 2. Hed. Vespertilionis. 447.
 3. Hed. Gangeticum. 448.
 4. Hed. Triquetrum. 448.
 5. Hed. Diphyllum. 449.
 6. Hed. Pulchellum. 449.
 7. Hed. Elegans. 450.
 8. Hed. Triflorum. 450.
 9. Hed. Lagopodioides. 450.
 10. Hed. Crinitum. 451.
 11. Hed. Alpinum. 451.
 12. Hed. Virginicum. 451.
 13. Hed.

13. Hed. Lineare 452.
HELIANTHUS. Syng. G. 43.
 1. Hel. Annuus. 509.
 2. Hel. Giganteus. 509.
HELICIA. Tetrand. G. 24.
 1. Helic. Cochinchinensis. 83.
HELICTERES. Gyn. G. 16.
 1. Helict. Angustifolia. 530.
 2. Helict. Hirsuta. 530.
 3. Helict. Undulata. 531.
 4. Helict. Paniculata. 531.
HELIOTROPIUM. Pent. G. 4.
 1. Heliotr. Indicum. 103.
 2. Heliotr. Tetrandrum. 103.
HELIXANTHERA. Pent. G. 47.
 1. Helixanth. Parasitica. 142.
HELVELLA. Crypt. G. 24.
 1. Helv. Mitra. 694.
 2. Helv. Amara. 695.
 3. Helv. Pineti. 695.
HEMEROCALLIS. Hex. G. 19.
 1. Hemer. Fulva. 205.
HEPTACA. Polyg. G. 14.
 1. Hept. Africana. 657.
HEXADICA. Monoec. G. 20.
 1. Hexad. Cochinchinensis. 562.
HEXANTHUS. Hex. G. 7.
 1. Hexanth. Umbellatus. 196.
HIBISCUS. Monad. G. 16.
 1. Hib. Populneus. 418.
 2. Hib. Tiliaceus. 418.
 3. Hib. Rosa Sinenfis. 419.
 4. Hib. Murabilis. 419.
 5. Hib. Syriacus. 420.
 6. Hib. Surattensis. 420.
 7. Hib. Esculentus. 421.
HIPPOCREPIS. Diad. G. 23.
 1. Hippoc. Barbata. 453.
HIPPURIS. Monand. G. 10.
 1. Hippur. Indica. 16.
HOLCUS. Polyg. G. 2.
 1. Holc. Saccharatus. 645.
HOMONIA. Dioc. G. 35.
 1. Homon. Riparia. 637.
HORDEUM. Triand. G. 24. p. 59.
HORTONIA. Pent. G. 7.
 1. Horton. Litoralis. 105.
HYDNUM. Crypt. G. 21.
 1. Hyd. Auriscalpium. 693.
HYDROCOTYLE. Pent. G. 89.
 1. Hydroc. Umbellata. 177.
HYDROGETON. Oct. G. 19.
 1. Hydrog. Heterophyllum. 244.
HYDROLEA. Pent. G. 81.
 1. Hydr. Inermis. 172.
HYPERICUM. Polyad. G. 5.
 1. Hyper. Olympicum. 471.
 2. Hyper. Petiolatum. 472.
 3. Hyper. Cochinchinensis. 472.
 4. Hyper. Aureum. 472.
HYPOXIS. Hex. G. 13.
 1. Hyp. Aurea. 200.
- I
- JAMBOLIFERA.** Oct. G. 7.
 1. Jambol. Pedunculata. 230.
 2. Jambol. Odorata. 231.
 3. Jambol. Resinosa. 231.
JASMINUM. Diand. G. 4.
 1. Jasm. Officinale. 20.
 2. Jasm. Nervosum. 20.
JATROPHA. Monoec. G. 42.
 1. Jatr. Janipha. 585.
IGNATIANA. Pent. G. 30.
 1. Ignat. Philippinica. 126.
ILEX. Tetrand. G. 36.
 1. Il. Aquifolium. 91.
ILLECEBRUM. Pent. G. 70.
 1. Illec. Lanatum. 162.
 2. Illec. Sessile. 162.
ILLICUM. Polyand. G. 29.
 1. Illic. Anisatum. 353.
IMPATIENS. Syng. G. 46.
 1. Imp. Chinensis. 511.
 2. Imp. Cornuta. 511.

3. Imp. Balsamina. 512.
 4. Imp. Mutila. 512.
 5. Imp. Cochlearia. 512.
INDIGOBERA. Diad. G. 30.
 1. Indig. Coccinea. 457.
 2. Indig. Rotundifolia. 458.
 3. Indig. Bufalina. 458.
 4. Indig. Tinctoria. 458.
IPOMŒA. Pent. G. 12.
 1. Ipom. Quamoclit. 111.
 2. Ipom. Tuberosa. 112.
 3. Ipom. Campanulata. 112.
 4. Ipom. Hepaticifolia. 112.
ISCHŒMUM. Polyg. G. 4.
 1. Isch. Importunum. 646.
JUGLANS. Monoec. G. 31.
 1. Jug. Regia. 573.
 2. Jug. Camirium. 573.
 3. Jug. Catappa. 573.
JUNCUS. Hex. G. 28.
 1. Juncus Bulbosus. 213.
JUNIPERUS. Dioec. G. 34.
 1. Junip. Barbadosensis. 636.
 2. Junip. Chinenfis. 636.
JUSTICIA. Diandr. G. 8.
 1. Just. Ecbolium. 23.
 2. Just. Picta. 24.
 3. Just. Fastuosa. 24.
 4. Just. Nigricans. 24.
 5. Just. Chinenfis. 25.
 6. Just. Purpurea. 25.
 7. Just. Tinctoria. 25.
IXIA. Triandr. G. 4.
 1. Ixia Chinenfis. 36.
IXORA. Tetrandr. G. 13.
 1. Ix. Coccinea. 75.
 2. Ix. Alba. 76.
 3. Ix. Montana. 76.
 4. Ix. Novemnervia. 76.
 5. Ix. Violacea. 76.

K

- KÆMPFERIA.** Monand. G. 5.
 1. Kæmpf. Galanga. 12.
KNEMA. Dioec. G. 2.
 1. Knem. Corticosa. 605.

L

- LACTUCA.** Syng. G. 5.
 1. Lact. Sativa. 479.
 2. Lact. Saligna. 480.
 3. Lact. Indica. 480.
LAGENULEA. Tetr. G. 31.
 1. Lagen. Pedata. 88.
LAGERSTROEMIA. Polyand. G. 14.
 1. Lagers. Indica. 340.
LAGUNEA. Hept. G. 1.
 1. Lagun. Cochinchinensis. 220.
LAMIUM. Didyn. G. 7.
 1. Lam. Garganicum. 365.
LANTANA. Didyn. G. 22.
 1. Lant. Racemosa. 376.
LAPSANA. Syng. G. 7.
 1. Lapsana Rhagadiolus. 481.
LASIA. Tetrandr. G. 21.
 1. Las. Aculeata. 81.
LAURUS. Enneand. G. 3.
 1. Laur. Cinnamomum. 249.
 2. Laur. Camphora. 249.
 3. Laur. Caryophyllus. 250.
 4. Laur. Myrrha. 251.
 5. Laur. Polyadelphia. 251.
 6. Laur. Curvifolia. 252.
 7. Laur. Cubeba. 252.
 8. Laur. Indica. 253.
 9. Laur. Pilosa. 253.
 10. Laur. Sassafras. 254.
LAWSONIA. Octand. G. 5.
 1. Lawson. Spinosa. 229.
 2. Lawson. Falcata. 229.
LECHEA. Triandr. G. 26.
 1. Lech.

1. Lech. Chinenfis. 60.
LEMNA. Monoc. G. 6.
 1. Lemna Minor. 550.
LEONTODON. Syng. G. 5.
 1. Leont. Sinenfe. 479.
LEONURUS. Syng. G. 1.
 1. Leon. Marrubialtrum. 360.
LEPIDIUM. Tetrady. G. 1.
 1. Lepid. Petraeum. 395.
LEPTA. Tetrand. G. 22.
 1. Lept. Triphylla. 82.
LEUCOIUM. Hex. G. 11.
 1. Leuc. Capitulum. 199.
LICHEN. Crypt. G. 14.
 1. Lich. Fagineus. 685.
 2. Lich. Ericetorum. 685.
 3. Lich. Arecarius. 685.
 4. Lich. Tartareus. 685.
 5. Lich. Imbricatus. 686.
 6. Lich. Pulmonarius. 686.
 7. Lich. Rangiferinus. 686.
 8. Lich. Roccella. 686.
 9. Lich. Ufnea. 687.
LIGUSTICUM. Pent. G. 95.
 1. Ligust. Scoticum. 180.
LIGUSTRUM. Diandr. G. 2.
 1. Ligustr. Sinenfe. 19.
LILIUM. Hex. G. 22.
 1. Lil. Candidum. 207.
 2. Lil. Pomponium. 207.
 3. Lil. Camfchatenfe. 207.
LIMACIA. Dioec. G. 20.
 1. Limac. Scandens. 620.
LIMONIA. Dec. G. 14.
 1. Lim. Monophylla. 271.
LIRIODENDRON. Polyand. G. 23.
 1. Liriod. Liliifera. 346.
 2. Liriod. Figo. 347.
 3. Liriod. Coco. 347.
LIRIOPE. Hex. G. 14.
 1. Liriope. Spicata. 201.
LOBELIA. Syng. G. 48.
 1. Lobel. Chinenfis. 514.
LONICERA. Pent. G. 55.
 1. Lonic. Periclymenum. 150.
 2. Lonic. Xylosteum. 150.
LORANTHUS. Hex. G. 6.
 1. Lorant. Cochinchinenfis. 195.
LOTUS. Diad. G. 37.
 1. Lot. Arabicus. 463.
LUPINUS. Diad. G. 5.
 1. Lupin. Cochinchinenfis. 429.
 2. Lupin. Africanus. 429.
LYCIUM. Pent. G. 35.
 1. Lyc. Barbarum. 133.
 2. Lyc. Cochinchinenfe. 134.
LYCOPERDON. Crypt. G. 27.
 1. Lycop. Lamellatum. 696.
 2. Lycop. Glomeratum. 697.
LYCOPODIUM. Crypt. G. 9.
 1. Lycopod. Flegmaria. 682.
 2. Lycopod. Cernuum. 682.
 3. Lycopod. Complanatum. 682.

M

- MALLOTUS.** Dioec. G. 33.
 1. Mall. Cochinchinenfis. 635.
MALVA. Monad. G. 18.
 1. Malv. Tomentosa. 422.
 2. Malv. Verticillata. 422.
MANGIFERA. Pent. G. 66.
 1. Mang. Indica. 159.
 2. Mang. Foetida. 160.
MANVLEA. Didyn. G. 34.
 1. Manvl. Indiana. 386.
MARCANTHUS. Diad. G. 33.
 1. Marc. Cochinchinenfis. 461.
MARTYNIA. Didyn. G. 35.
 1. Martyn. Zanguebaria. 386.
MATRICARIA. Syng. G. 27.
 1. Matric. Cantonienfis. 498.
MAZUS. Didyn. G. 33.
 1. Maz. Rugofus. 385.
MEDICAGO. Diad. G. 24.
 1. Medic. Polymorpha. 453.

- MEDUZA. Monad. G. 4. 407
 1. Meduz. Anguifera. 406.
- MELALEUCA. Polyad. G. 2. 408
 1. Melal. Leucadendra. 468.
- MELANTHIUM. Héx. G. 30. 409
 1. Melant. Cochinchinense. 216.
- MELASTOMA. Dec. G. 17. 410
 1. Melast. Septemnervia. 273.
 2. Melast. Dodecandra. 274.
- MELIA. Dec. G. 10. 411
 1. Mel. Azedarac. 269.
- MELISSA. Didym. G. 12. 412
 1. Meliss. Cretica. 368.
 2. Meliss. Rugosa. 368.
- MELUCHIA. Monad. G. 5. 413
 1. Meloch. Corchorifolia. 407.
- MELOBORUM. Polyand. G. 27. 414
 1. Melod. Fruticosum. 351.
 2. Melod. Arboreum. 351.
- MELOTHRIA. Triand. G. 1. 415
 1. Meloth. Indica. 35.
- MENTHA. Didym. G. 2. 416
 1. Ment. Crispa. 360.
 2. Ment. Hirsuta. 361.
 3. Ment. Pulegium. 361.
 4. Ment. Stellata. 361.
- MENYANTHES. Pent. G. 8. 417
 1. Menyant. Hydrophyllum. 105.
- MERCURIALIS. Dioec. G. 26. 418
 1. Mercur. Indica. 628.
- MESPILUS. Icos. G. 14. 419
 1. Mesp. Pyracantha. 320.
- METEORUS. Monad. G. 8. 420
 1. Meteor. Coccineus. 410.
- MICHELIA. Polyand. G. 24. 421
 1. Michel. Champaca. 348.
- MILIUM. Triand. G. 16. 422
 1. Mil. Effusum. 49.
- MILTUS. Dodec. G. 13. 423
 1. Milt. Africana. 302.
- MIMOSA. Polyg. G. 9. 424
 1. Mim. Nodosa. 649.
 2. Mim. Pilosa. 650.
3. Mim. Scandens. 650.
 4. Mim. Vaga. 651.
 5. Mim. Corniculata. 651.
 6. Mim. Arborea. 651.
 7. Mim. Stellata. 651.
 8. Mim. Fera. 652.
 9. Mim. Farnesiana. 652.
 10. Mim. Pennata. 652.
 11. Mim. Sinuata. 653.
 12. Mim. Saponaria. 653.
- MIRABILIS. Pent. G. 1. 425
 1. Mirab. Jalapa. 101.
- MOLLUCCO. Triand. G. 29. 426
 1. Moll. Triphylla. 62.
- MOMORDICA. Monoec. G. 46. 427
 1. Momord. Charantia. 589.
 2. Momord. Luffa. 590.
 3. Momord. Cylindrica. 590.
- MORELLA. Monoec. G. 4. 428
 1. Morel. Rubra. 548.
- MORINDA. Pent. G. 44. 429
 1. Morind. Umbellata. 140.
 2. Morind. Citrifolia. 140.
 3. Morind. Royoc. 140.
- MORUS. Monoec. G. 14. 430
 1. Mor. Alba. 555.
 2. Mor. Rubra. 555.
 3. Mor. Indica. 555.
- MUCOR. Crypt. G. 28. 431
 1. Muc. Sphærocephalus. 697.
 2. Muc. Mucedo. 697.
 3. Muc. Glaucus. 697.
- MURICIA. Monoec. G. 50. 432
 1. Muric. Cochinchinensis. 596.
- MUSA. Polyg. G. 1. 433
 1. Mus. Seminifera. 644.
 2. Mus. Odorata. 644.
 3. Mus. Nana. 644.
 4. Mus. Corniculata. 644.
 5. Mus. Uranoscopos. 645.
- MUSSENDIA. G. 57. 434
 1. Muss. Frondosa. 151.
 2. Muss. Chinenfis. 152.

- MYRTUS.** Icof. G. 5.
 1. Myrt. Canescens. 311.
 2. Myrt. Trinervia. 312.
 3. Myrt. Zeylanica. 312.
 4. Myrt. Androsamoides. 312.
 5. Myrt. Chinenfis. 313.
- N**
- NARDUS.** Triandr. G. 10.
 1. Nard. Indica. 44.
- NAUCLEA.** Pent. G. 45.
 1. Naucel. Orientalis. 141.
- NEPETA.** Didyn. G. 9.
 1. Nep. Hirsuta. 366.
- NEPHROIA.** Monoec. G. 24.
 1. Nephr. Sarmentosa. 565.
- NEPRUNIA.** Polyg. G. 10.
 1. Nept. Oleracea. 654.
- NERIUM.** Pent. G. 16.
 1. Ner. Oleander. 115.
 2. Ner. Divaricatum. 115.
 3. Ner. Antidysentericum. 116.
 4. Ner. Scandens. 116.
- NICOTIANA.** Pent. G. II.
 1. Nicot. Fruticosa. 111.
- NYCTANTHES.** Diandr. G. 5.
 1. Nyct. Sambac. 21.
 2. Nyct. Grandiflora. 21.
- NYPHÆA.** Polyand. G. 15.
 1. Nymph. Nelumbo. 340.
- NYPHANTHUS.** Monoec. G. 2.
 1. Nymphant. Squamifolia. 544.
 2. Nymphant. Pilosa. 544.
 3. Nymphant. Chinenfis. 544.
 4. Nymphant. Rubra. 544.
 5. Nymphant. Niruri. 545.
- O**
- OCTARILLUM.** Tetrand. G. 34.
 1. Octar. Fruticosum. 90.
- OCCYMUM.** Didyn. G. 14.
 1. Ocym. Gratissimum. 369.
 2. Ocym. Basilicum. 370.
 3. Ocym. Minimum. 370.
 4. Ocym. Africanum. 370.
- OLDENLANDIA.** Tetrand. G. 16.
 1. Old. Repens. 78.
 2. Old. Paniculata. 78.
 3. Old. Zanguebaria. 78.
- OLYRA.** Monoec. G. 9.
 1. Olyr. Orientalis. 552.
- ONCINUS.** Pent. G. 26.
 1. Oncin. Cochinchinensis. 123.
- ONCUS.** Hex. G. 4.
 1. Oncus Esculentus. 194.
- OPA.** Icof. G. 3.
 1. Opa Odorata. 309.
 2. Opa Metrodideros. 309.
- OPHELUS.** Monad. G. 11.
 1. Ophel. Sitularius. 412.
- OPHIGLOSSUM.** Crypt. G. 2.
 1. Ophiogl. Lusitanicum. 672.
 2. Ophiogl. Scandens. 672.
- OPHISPERMUM.** Dec. G. 24.
 1. Ophisp. Sinenfe. 281.
- ORCHIS.** Gyn. G. 7.
 1. Orch. Sulannæ. 522.
 2. Orch. Morio. 523.
 3. Orch. Latifolia. 523.
- ORIGANUM.** Didyn. G. 18.
 1. Orig. Dictamnus. 373.
 2. Orig. Creticum. 373.
 3. Orig. Heracleoticum. 373.
 4. Orig. Syriacum. 374.
 5. Orig. Maiorana. 374.
- ORNITHOGALUM.** Hex. G. 20.
 1. Ornith. Sinenfe. 206.
- ORNITHOPUS.** Diad. G. 22.
 1. Ornithop. Ruber. 452.
- ORONTIUM.** Hex. G. 23.
 1. Oront. Cochinchinense. 208.
- ORYZA.** Hex. G. 29.
 1. Oryz. Communissima. 215.
 2. Oryz. Præcox. 215.
 3. Oryz.

3. Oryz. Montana. 215.
 4. Oryz. Glutinosa. 215.
OSBECKIA. Octand. G. 4.
 1. Osb. Chinenfis. 228.
OSMANTHUS. Diandr. G. 15.
 1. Osm. Fragrans. 28.
OXALIS. Dec. G. 31.
 1. Oxal. Sensitiva. 285.
 2. Oxal. Corniculata. 285.
OXYCARPUS. Polyg. G. 6.
 1. Oxyc. Cochinchinensis. 648.
OXYCEROS. Pent. G. 56.
 1. Oxycer. Horrida. 151.
 2. Oxycer. Sinensis. 151.
P
PÆONIA. Polyand. G. 19.
 1. Pæon. Officialis. 343.
PANAX. Polyg. G. 13.
 1. Pan. Fruticosum. 656.
PANDANUS. Dioec. G. 1.
 1. Pand. Odoratissimus. 603.
 2. Pand. Humilis. 603.
 3. Pand. Lævis. 604.
PANICUM. Triandr. G. 12.
 1. Pan. Polystachion. 46.
 2. Pan. Italicum. 46.
 3. Pan. Crûs corvi. 46.
 4. Pan. Hirtellum. 47.
 5. Pan. Miliaceum. 47.
 6. Pan. Latifolium. 47.
PARIETARIA. Polyg. G. 11.
 1. Pariet. Cochinchinensis. 654.
PASSIFLORA. Gyn. G. 12.
 1. Pass. Pallida. 527.
 2. Pass. Cærulea. 527.
PAVETTA. Pent. G. 11.
 1. Pav. Arenosa. 73.
 2. Pav. Parasitica. 73.
PEDICELLIA. Polyg. G. 12.
 1. Pedic. Oppositifolia. 655.
PENÆA. Tetrand. G. 10.
 1. Pen. Nitida. 72.
 2. Pen. Scandens. 73.
PENTALOBA. Pent. G. 60.
 1. Pental. Sessilis. 154.
PENTAPETES. Monad. G. 7.
 1. Pentap. Phœnicea. 409.
PERGULARIA. Pent. G. 77.
 1. Pergul. Divaricata. 169.
 2. Pergul. Sinensis. 169.
PERIPLACA. Pent. G. 75.
 1. Peripl. Cochinchinensis. 167.
PETESIA. Tetrand. G. 14.
 1. Petes. Simplicissima. 177.
 2. Petes. Trifida. 177.
PEZIZA. Crypt. G. 25.
 1. Pez. Auricula. 695.
PHAIUS. Gyn. G. 15.
 1. Phai. Grandifolius. 529.
PHALARIS. Triandr. G. 15.
 1. Phalaris. Zizanoïdes. 49.
PHALLUS. Crypt. G. 22.
 1. Phall. Impudicus. 694.
PHANERA. Triandr. G. 5.
 1. Phan. Coccinea. 37.
PHARNACEUM. Pent. G. 104.
 1. Pharn. Molligo. 185.
PHASEOLUS. Diadr. G. 12.
 1. Phas. Vulgaris. 434.
 2. Phas. Lunatus. 434.
 3. Phas. Tuberosus. 434.
 4. Phas. Tunkinensis. 435.
 5. Phas. Radiatus. 435.
 6. Phas. Mungo. 435.
PHELEUM. Triandr. G. 14.
 1. Phl. Cochinchinense. 48.
 2. Phl. Africanum. 48.
PHILLYREA. Diandr. G. 1.
 1. Phil. Indica. 16.
PHENIX. Dioec. G. 19.
 1. Phœn. Puffilla. 674.
PHOBEROS. Icoñ G. 11.
 1. Phob. Cochinchinensis. 318.
 2. Phob. Chinenfis. 318.

- PHYL. Tetrand. G. 11.
 1. Phyl. Chinenfis. 66.
- PHYLLAMPHORA. Diöec. G. 4.
 1. Phyllamphi Mirabilis. 606.
- PHYLLANTHUS. Monoöc. G. 12.
 1. Phyllanti Emblica. 553.
 2. Phyllanti Urinaria. 554.
- PHYLLAUREA. Monoöc. G. 33.
 1. Phyllaur. Codiaëum. 575.
- PHYLLODES. Monandr. G. 6.
 1. Phyllo. Placentaria. 13.
- PHYSLIS. Pent. G. 74.
 1. Physf. Somnifera. 132.
 2. Physf. Angulata. 132.
 3. Physf. Pubescens. 133.
 4. Physf. Alkekengi. 133.
- PHYSKIUM. Polyg. G. 20.
 1. Physk. Natans. 662.
- PHYTEUMA. Pent. G. 42.
 1. Phyt. Bipinnata. 138.
 2. Phyt. Cochinchinenfis. 139.
- PIKRIA. Didyn. G. 42.
 1. Pikr. Fel terra. 393.
- PICRIS. Syng. G. 2.
 1. Picr. Repens. 478.
- PIMELA. Monad. G. 6.
 1. Pim. Nigra. 407.
 2. Pim. Alba. 408.
 3. Pim. Oleosa. 408.
- PINUS. Monad. G. 37.
 1. Pin. Sylvestris. 579.
 2. Pin. Abies. 579.
- PIPER. Diandr. G. 16.
 1. Pip. Nigrum. 30.
 2. Pip. Sylvestre. 30.
 3. Pinnatum. 31.
 4. Pip. Betle. 31.
 5. Pip. Longum. 32.
- PISTACIA. Diöec. G. 15.
 1. Pist. Oleosa. 165.
- PISUM. Diad. G. 14.
 1. Pis. Sativum. 443.
- PLACUS. Syng. G. 24.
 1. Plac. Tomentofus. 497.
 2. Plac. Lævis. 497.
- PLANTAGO. Tetrand. G. 8.
 1. Plantago Maior. 71.
- PLECTRONIA. Pent. G. 69.
 1. Plectronia Chinenfis. 162.
- PLUMIERIA. Pent. G. 17.
 1. Plumier. Obtusa. 1170.
- POA. Triandr. G. 21.
 1. Poa Chinenfis. 54.
- POINCIANA. Dec. G. 2.
 1. Poinc. Bijuga. 260.
 2. Poinc. Pulcherrima. 161.
 3. Poinc. Elata. 261.
- POLIA. Pent. G. 72.
 1. Pol. Arenaria. 164.
- POLYANTHES. Hex. G. 18.
 1. Polyanth. Tuberosa. 204.
- POLYCHROA. Monoöc. G. 18.
 1. Polychr. Repens. 559.
- POLYGALA. Diad. G. 1.
 1. Polyg. Glomerata. 426.
- POLYGONUM. Octand. G. 17.
 1. Polyg. Hydropiper. 240.
 2. Polyg. Persicaria. 240.
 3. Polyg. Barbatum. 241.
 4. Polyg. Tinctorium. 241.
 5. Polyg. Aviculare. 241.
 6. Polyg. Chinenfe. 241.
 7. Polyg. Perfoliatum. 242.
 8. Polyg. Tararicum. 242.
 9. Polyg. Ciliatum. 243.
 10. Polyg. Odorum. 243.
- POLYZOZUS. Tetrand. G. 129.
 1. Polyzozus Bipinnata. 74.
 2. Polyzoz. Lanceolata. 75.
- POLYPARA. Triandr. G. 28.
 1. Polyp. Cochinchinenfis. 619.
- POLYPHEMA. Monoöc. G. 7.
 1. Polyph. Jaca. 546.
 2. Polyph. Champeden. 547.
- POLYPODIUM. Crypt. G. 4.
 1. Polypod. Repandum. 673.

2. Polypod. Biforme. 673.
 3. Polypod. Phymatodes. 673.
 4. Polyp. Scolopendriodes. 674.
 5. Polyp. Loricum. 674.
 6. Polyp. Venosum. 674.
 7. Polyp. Simile. 674.
 8. Polyp. Fragrans. 675.
 9. Polyp. Varium. 675.
 10. Polyp. Baromez. 675.
 11. Polyp. Arboreum. 676.
 12. Polyp. Speluncæ. 677.
PONTEDERIA. Hex. G. 10.
 1. Ponted. Cordara. 198.
 2. Ponted. Hastata. 199.
PORELLA. Crypt. G. 10.
 1. Por. Imbricata. 683.
PORPHYRA. Tetrand. G. 5.
 1. Porph. Dichotoma. 70.
PORTULACA. Dodec. G. 3.
 1. Portul. Oleracea. 293.
POTENTILLA. Icol. G. 20.
 1. Potent. Fruticosa. 326.
POTHOS. Gynand. G. 16.
 1. Poth. Scandens. 532.
PRIMULA. Pent. G. 6.
 1. Prim. Mutabilis. 104.
 2. Prim. Sinensis. 105.
PRUNUS. Icol. G. 10.
 1. Prun. Domestica. 317.
PSELIUM. Dioec. G. 21.
 1. Psel. Heterophyllum. 621.
PSIDIUM. Icol. G. 4.
 1. Psid. Pyriferum. 309.
 2. Psid. Pomiferum. 310.
 3. Psid. Caninum. 310.
 4. Psid. Nigrum. 311.
 5. Psid. Rubrum. 311.
PSORALEA. Diad. G. 16.
 1. Psor. Scutellata. 443.
 2. Psor. Rubescens. 444.
PTELEA. Tetrand. G. 23.
 1. Ptel. Ovata. 82.
PTERIS. Crypt. G. 6.
 1. Pter. Pilofelloides. 678.
 2. Pter. Lanceolata. 679.
 3. Pter. Vittata. 679.
 4. Pter. Biaurita. 679.
 5. Pter. Caudata. 680.
PTEROCARPUS. Diad. G. 9.
 1. Pteroc. Flavus. 431.
PTERONIA. Syng. G. 18.
 1. Pter. Tomentosa. 489.
PTEROTUM. Dodec. G. 2.
 1. Pterotum Procumbens. 293.
PUNICA. Icol. G. 6.
 1. Pun. Granatum. 313.
 2. Pun. Nana. 314.
PYRGUS. Pent. G. 22.
 1. Pyrg. Racemosa. 121.
PYRUS. Icol. G. 15.
 1. Pyr. Communis. 321.
 2. Pyr. Malus. 321.
 3. Pyr. Cydonia. 322.
PYTHAGOREA. Octand. G. 18.
 1. Pythag. Cochinchinensis. 244.

Q

- QUERCUS.** Monoec. G. 30.
 1. Querc. Ilex. 571.
 2. Querc. Cornea. 572.
 3. Querc. Concentrica. 572.
QUINARIA. Dec. G. 15.
 1. Quin. Lanfium. 272.
QUISQUALIS. Dec. G. 18.
 1. Quisq. Indica. 274.

R

- RAPHANUS.** Tetrad. G. 3.
 1. Raph. Sativus. 390.
RAPINIA. Pent. G. 31.
 1. Rapin. Herbacea. 127.
RENANTHERA. Gyn. G. 5.
 1. Renant. Coccinea. 521.
RESEDA. Dodec. G. 10.
 1. Ref.

1. Ref. Cochinchenfis. 299.
 2. Ref. Chinenfis. 299.
 3. Ref. Odorata. 300.
- RESTIARIA.** Dioec. G. 38.
 1. Rest. Cordata. 639.
- RHAMNUS.** Pent. G. 65.
 1. Rhamn. Jujuba. 157.
 2. Rhamn. Zizyphus. 158.
 3. Rhamn. Soporifer. 158.
 4. Rhamn. Agrestis. 158.
 5. Rhamn. Lineatus. 159.
- RHAPHIS.** Monoec. G. 11.
 1. Rhaphis Trivialis. 553.
- RHEUM.** Enneand. G. 4.
 1. Rhe. Palmatum. 255.
 2. Rhe. Barbarum. 255.
- RHIZOPHORA.** Dodec. G. 8.
 1. Rhiz. Cafeolaris. 296.
 2. Rhiz. Sexangula. 297.
 3. Rhiz. Gymnorhiza. 297.
- RHODIOLA.** Dioec. G. 25.
 1. Rhod. Biternata. 627.
- RHUS.** Pent. G. 101.
 1. Rhus Javanicum. 183.
- RHYNCHOSIA.** Diad. G. 32.
 1. Rhync. Volubilis. 460.
- RHYTIS.** Polyg. G. 18.
 1. Rhyt. Fruticosa. 660.
- RICINUS.** Monoec. G. 41.
 1. Ricin. Communis. 584.
 2. Ricin. Tanarius. 584.
 3. Ricin. Apelta. 585.
- RICORIA.** Tetrad. G. 5.
 1. Ric. Cantoniensis. 397.
- ROBINIA.** Diad. G. 27.
 1. Robin. Mitis. 455.
 2. Robin. Amara. 455.
 3. Robin. Flava. 456.
- ROSA.** Icof. G. 17.
 1. Ros. Cinnamomea. 323.
 2. Ros. Spiniflisma. 323.
 3. Ros. Centifolia. 323.
 4. Ros. Indica. 323.
 5. Ros. Alba. 323.
 6. Ros. Nankinenfis. 324.
- ROSMARINUS.** Diandr. G. 13.
 1. Rosm. Officialis. 28.
- ROTULA.** Pent. G. 23.
 1. Rot. Aquatica. 121.
- RUBUS.** Icof. G. 18.
 1. Rub. Moluccanus. 324.
 2. Rub. Parvifolius. 324.
 3. Rub. Fruticosus. 325.
- RUELLIA.** Didyn. G. 27.
 1. Ruell. Antipoda. 380.
 2. Ruell. Ciliaris. 381.
- RUMEX.** Hex. G. 31.
 1. Rum. Crispus. 216.
 2. Rum. Hostilis. 217.
- RUTA.** Decand. G. 11.
 1. Rut. Chalepensis. 269.

S

- SACCHARUM.** Triand. G. 19.
 1. Sacch. Spontaneum. 52.
 2. Sacch. Officinarum. 52.
 3. Sacch. Jaculatorium. 53.
 4. Sacch. Spicatum. 53.
- SAGITTARIA.** Monoec. G. 28.
 1. Sagitt. Sagittifolia. 570.
- SALACIA.** Gyn. G. 10.
 1. Salac. Cochinchenfis. 526.
- SALIX.** Dioec. G. 7.
 1. Sal. Babilonica. 609.
- SALOMONIA.** Monand. G. 7.
 1. Salom. Cantoniensis. 142.
- SALSOLA.** Pent. G. 83.
 1. Sals. Didyma. 173.
- SALVADORA.** Tetrand. G. 30.
 2. Salvad. Capitulata. 87.
 2. Salvad. Biflora. 88.
- SAMBUCUS.** Pent. G. 98.
 1. Samb. Nigra. 181.
- SANTALUM.** Tetrand. G. 29.
 1. Sant. Album. 87.

- SAPINDUS. Oct. G. 14.
 1. Sapind. Saponaria 238.
 2. Sapind. Abruptus. 238.
- SARCODUM. Diad. G. 35.
 1. Sarc. Scandens. 462.
- SAROTHA. Pent. G. 99.
 1. Sarot. Gentianoides. 182.
- SAXIFRAGA. Dec. G. 15.
 1. Saxifr. Chinenfis. 281.
- SCABIOSA. Tetrand. G. 3.
 1. Scab. Cochinchinenfis. 68.
- SCHOENUS. Triand. G. 7.
 1. Schoen. Coloratus. 41.
 2. Schoen. Ruber. 41.
- SCIRPUS. Triandr. G. 9.
 1. Scirp. Supinus. 43.
 2. Scirp. Miliaceus. 43.
 3. Scirp. Capsularis. 44.
- SCOPARIA. Tetrand. G. 7.
 1. Scop. Dulcis. 71.
- SCORZONERA. Syng. G. 4.
 1. Scorzon. Pinnatifida. 479.
- SCUTELLARIA. Didyn. G. 11.
 1. Scutell. Altissima. 367.
 2. Scutell. Albida. 367.
 3. Scutell. Alpina. 367.
- SCUTULA. Oct. G. 12.
 1. Scut. Scutellata. 235.
 2. Scut. Umbellata. 236.
- SEBIFERA. Dioc. G. 36.
 1. Sebif. Glutinosa. 638.
- SEDUM. Dec. G. 34.
 1. Sed. Stellatum. 287.
 2. Sed. Anacampferos. 287.
- SEGUIERIA. Polyand. G. 16.
 1. Seguier. Asiatica. 341.
- SENECIO. Syng. G. 32.
 1. Sen. D. varicatus. 502.
- SEPTAS. Didyn. G. 41.
 1. Sept. Repens. 392.
- SERRATULA. Syng. G. 10.
 1. Serrat. Multiflora. 483.
 2. Serrat. Scordium. 483.
- SESAMUM. Didyn. G. 29.
 1. Ses. Orientale. 382.
- SIDA. Monad. G. 12.
 1. Sid. Alnifolia. 413.
 2. Sid. Vitifolia. 413.
 3. Sid. Cordifolia. 414.
 4. Sid. Indica. 414.
 5. Sid. Scoparia. 414.
- SIDEROXYLON. Pent. G. 25.
 1. Siderox. Cantonienfe. 122.
- SIEGISBECKIA. Syng. G. 36.
 1. Siegisb. Orientalis. 504.
- SINAPIS. Tetrad. G. 8.
 1. Sin. Chinenfis. 399.
 2. Sin. Brassicata. 399.
 3. Sin. Pekinenfis. 400.
- SISYMBRIUM. Tetrad. G. 9.
 1. Sisymp. Apetalum. 400.
- SIUM. Pent. G. 93.
 1. Sium Sifarum. 179.
 2. Sium Græcum. 179.
- SMILAX. Dioc. G. 22.
 1. Smil. Perfoliata. 622.
 2. Smil. China. 622.
 3. Smil. Caduca. 622.
 4. Smil. Lanceolata. 623.
 5. Smil. Pseudochina. 623.
- SOLANUM. Pent. G. 33.
 1. Sol. Verbascifolium. 128.
 2. Sol. Biflorum. 129.
 3. Sol. Album. 129.
 4. Sol. Dichotomum. 129.
 5. Sol. Nigrum. 129.
 6. Sol. æthyopicum. 130.
 7. Sol. Melongena. 130.
 8. Sol. Lycopersicum. 130.
 9. Sol. Peruvianum. 131.
- SOLENA. Syng. G. 49.
 1. Solen. Heterophylla. 514.
- SOLIDAGO. G. 30.
 1. Solid. Decurrens. 501.
 2. Solid. Cantonienfis. 501.
- SONCHUS. Syng. G. 6.
 1. Son-

1. Sonch. Floridanus. 480.
 2. Sonch. Sibiricus. 481.
 SPATHIUM. Hex. G. 32.
 1. Spath. Chinenfe. 217.
 SPERMACOCE. Tetrand. G. 18.
 1. Sperm. Flexuofa. 79.
 SPHERANTHUS. Syng. G. 44.
 1. Spher. Cochinchinenfis. 510.
 SPHAGNUM. Crypt. G. 11.
 1. Sphag. Simpliciffimum. 683.
 SPILANTHUS. Syng. G. 11.
 1. Spilant. Tinctorius. 484.
 SPINACIA. Dioec. G. 17.
 1. Spinac. Oleracea. 617.
 SPINEX. Polyg. G. 5.
 1. Spinifex. Squarofus. 647.
 SPIRÆA. Icof. G. 16.
 1. Spir. Cantonienfis. 322.
 STACHYS. Didyn. G. 8.
 1. Stach. Artemifia. 365.
 STAPELIA. Pent. G. 73.
 1. Stap. Chinenfis. 165.
 2. Stap. Cochinchinenfis. 165.
 STEGOSIA. Triand. G. 18.
 1. Stegof. Cochinchinenfis. 51.
 STEMONA. Monad. G. 2.
 1. Stem. Tuberofa. 404.
 STEPHANIA. Dioec. G. 6.
 1. Steph. Rotunda. 608.
 2. Steph. Longa. 609.
 STERCULIA. Monoec. G. 43.
 1. Sterc. Fœrida. 586.
 STIGMAROTA. Dioec. G. 32.
 1. Stig. Jangomas. 634.
 2. Stig. Africana. 634.
 STIGMANTHUS. Pent. G. 52.
 1. Stigant. Cymofus. 146.
 STIXIS. Dodec. G. 6.
 1. Stix. Scandens. 295.
 STREBLUS. Dioec. G. 14.
 1. Streb. Afper. 615.
 2. Streb. Cordatus. 615.
 STRIGA. Diand. G. 6.
 1. Strig. Lutea. 22.
 STRYCHNOS. Pent. G. 29.
 1. Stryc. Nux Vomica. 125.
 STYLIDIUM. Hept. G. 2.
 1. Stylid. Chinenfe. 221.

T

- TABERNÆMONTANA. Pent. G. 18.
 1. Tabern. Bufalina. 117.
 2. Tabern. Bovina. 118.
 TACCA. Dodec. G. 11.
 1. Tac. Pinnatifida. 300.
 TAGETES. Syng. G. 35.
 1. Tag. Patula. 504.
 TAMARINDUS. Monad. G. 1.
 1. Tamar. Indica. 403.
 TAMARIX. Pent. G. 100.
 1. Tam. Chinenfis. 182.
 TECTONIA. Pent. G. 39.
 1. Tect. Theka. 137.
 TETRADIUM. Tetrand. G. 37.
 1. Tetrad. Trichotomum. 91.
 TETRAPILUS. Dioec. G. 9.
 1. Tetrap. Brachiatus. 611.
 TEUCRIUM. Didyn. G. 3.
 1. Teuc. Polium. 362.
 2. Teuc. Maffilienfe. 362.
 3. Veuc. Undulatus. 362.
 4. Teuc. Thea. 363.
 THALICFRUM. Polyand. G. 22.
 1. Thal. Sinenfe. 346.
 THEA. Polyand. G. 13.
 1. The. Cochinchinenfis. 338.
 2. The. Cantonienfis. 339.
 3. The. Oleofa. 339.
 THELA. Pent. G. 20.
 1. Thel. Coccinea. 119.
 2. Thel. Alba. 119.
 THILACHIVM. Pol. G. 17.
 1. Thil. Africanum. 342.
 THLASPI. Tetrad. G. 2.
 1. Thl. Bursâ pastoris. 395.

- THRIXSPERMUM.** Gyn. G. 3.
 1. Thrixsp. Centipeda. 520.
THUJA. Monoec. G. 39.
 1. Thuj. Orientalis. 580.
THYSANUS. Dec. G. 29.
 1. Thyf. Palala. 284.
TOLUIFERA. Dec. G. 4.
 1. Toluif. Cochinchinensis. 262.
TOURNEFORTIA. Pent. G. 24.
 1. Tournef. Montana. 122.
TRADESCANTIA. Hex. G. 3.
 1. Tradesc. Genuculata. 193.
 2. Tradesc. Vaga. 193.
TRALLIANA. Pent. G. 64.
 1. Trall. Scandens. 157.
TRAPA. Tetrand. G. 28.
 1. Trap. Cochinchinensis. 86.
 2. Trap. Chinenfis. 86.
TREMA. Monoec. G. 21.
 1. Trem. Cannabina. 563.
TRIADICA. Dioc. G. 8.
 1. Triad. Cochinchinensis. 610.
 2. Triad. Sinensis. 610.
TRIBULUS. Dec. G. 12.
 1. Trib. Terrestris. 270.
TRICARIUM. Monoec. G. 16.
 1. Tric. Cochinchinense. 557.
TRICEROS. Pent. G. 103.
 1. Tric. Cochinchinensis. 184.
TRICHOMANES. Crypt. G. 8.
 1. Trichom. Hirsutum. 681.
TRICHOSANTHES. Monoec. G. 45.
 1. Trichof. Anguina. 588.
 2. Trich. Cucumerina. 588.
 3. Trich. Pilosa. 588.
 4. Trich. Tricuspidata. 589.
 5. Trich. Scabra. 589.
TRICHOSTEMA. Didyn. G. 16.
 1. Trichost. Spiralis. 371.
TRIDESMIS. Monoec. G. 34.
 1. Trid. Hispida. 576.
 2. Trid. Tomentosa. 576.
TRIFOLIUM. Diad. G. 17.
 1. Trif. Mel. Indica. 444.
 2. Trifol. Globosum. 444.
 3. Trifol. Cuspidatum. 445.
 4. Trifol. Volubile. 445.
TRIPHACA. Monoec. G. 35.
 1. Triph. Africana. 577.
TRIPINNA. Didyn. G. 40.
 1. Trip. Tripinnata. 391.
TRISANTHUS. Pent. G. 87.
 1. Trif. Cochinchinensis. 176.
TRITICUM. Triand. G. 23. p. 59.
TUSSILAGO. Syng. G. 33.
 1. Tussil. Farfara. 502.
 2. Tussil. Anandria. 503.
TYPHA. Monoec. G. 10.
 1. Typha Latifolia. 552.

V U

- VANIERIA.** Monoec. G. 23.
 1. Vanier. Cochinchinensis. 564.
 2. Vanier. Chinenfis. 565.
VARRONIA. Pent. G. 41.
 1. Varron. Sinensis. 138.
VATERIA. Polyand. G. 6.
 1. Vat. Flexuosa. 334.
VERBENA. Diandr. G. 11.
 1. Verb. Officinalis. 27.
VERBESINA. Syng. G. 39.
 1. Verbes. Calendulacea. 506.
 2. Verbes. Spicata. 507.
VERNICEA. Monoec. G. 44.
 1. Vernic. Montana. 587.
VICIA. Diad. G. 15.
 1. Vic. Faba. 443.
VINCA. Pent. G. 19.
 1. Vinc. Rosea. 118.
VIOLA. Syng. G. 47.
 1. Viol. Odorata. 513.
 2. Viol. Primulifolia. 513.
VITEX. Didyn. G. 39.
 1. Vit. Trifolia. 390.
 2. Vit. Negundo. 390.
 3. Vit.

3. Vit. Spicata. 390.
VIIIS. Pent. G. 61.
 1. Vit. Vinifera. 155.
 2. Vit. Indica. 155.
 3. Vit. Lebrusca. 155.
ULVA. Crypt. G. 16.
 1. Ulv. Plum. 687.
VOLKAMERIA. Dicyn. G. 38.
 1. Volk. Inermis. 388.
 2. Volk. Pumila. 388.
 3. Volk. Parasites. 388.
 4. Volk. Angulata. 389.
URENA. Monad. G. 15.
 1. Ur. Lobata. 416.
 2. Ur. Sinuata. 417.
 3. Ur. Procumbens. 417.
 4. Ur. Polyflora. 417.
 5. Ur. Monopetala. 418.
URTICA. Monoec. G. 17.
 1. Urt. Interrupta. 557.
 2. Urt. Gemina. 558.
 3. Urt. Pilosa. 558.
 4. Urt. Nivea. 558.
UTRICULARIA. Diand. G. 10.
 1. Utric. Recurva. 26.
 2. Utric. Aurea. 26.
UVARIA. Polyand. G. 25.
 1. Uvar. Zeylanica. 348.
 2. Uvar. Uncata. 349.

W

- WINTERANIA.** Dodec. G. 4.
 1. Winter. Canela. 293.

X

- XANTHIUM.** Monoec. G. 22.
 1. Xanth. Strumarium. 563.
XERANTHEMUM. Syng. G. 26.
 1. Xer. Chinenic. 498.
 2. Xer. Retorium. 498.

Z

- ZALA.** Monad. G. 3.
 1. Zal. Asiatica. 405.
ZANICHELLIA. Monoec. G. 1.
 1. Zanich. Tuberosa. 543.
ZANTHOXYLUM. Polyg. G. 17.
 1. Zant. Clava Herculis. 659.
ZEAE. Monoec. G. 7.
 1. Zea Mays. 550.
ZIZIPHORA. Diandr. G. 12.
 1. Ziziph. Siliquosa. 27.

E R R A T A

Insueti typographi patienter corriges : præcipua hic notantur. Litera p paginam, / lineam ostendit.

T O M. I.

- P. 1. l. 17, & 19. petata -- pelata.
 p. 2. l. 29. febribus -- febribus.
 p. 5. l. 7. infundebuliformis -- infundibuliformis.
 p. 5. l. 13. glabum -- glabrum.
 p. 8. l. 13. infistens -- infistens.
 p. 9. l. 8. Mio -- Moi.
 p. 12. l. 22. subrotunum -- subrotundum.
 p. 13. l. 23. acanlis -- acaulis.
 p. 19. l. 16. Genu -- Genus.
 p. 29. l. 10. habiat -- habitat.
 p. 32. l. 19. lougum -- longum.
 l. 39. Plumicro -- Plumierio.
 p. 42. l. 26. rotuddus -- rotundus.
 p. 44. l. 23. accurunt -- occurrunt.
 p. 45. l. 7. Diofcoridis -- Diofcorides.
 l. 38. polliari -- pollicari.
 p. 46. l. 12. annus -- annuus.
 p. 47. l. 34. habitat -- habitant.
 p. 48. l. 3. Alopecurs -- Alopecurus.
 l. 9. 1-floris -- 1-florus.
 p. 48. l. 26. annus -- annuus.
 p. 53. l. 4. facchaem -- faccharum.
 l. 10. aliquod -- aliquot.
 p. 54. l. 18. secunda -- spicata.
 p. 56. l. 8. feffilibus -- feffilibus.
 p. 63. l. 18. 4-partibus -- 4-partitus.
 p. 67. l. 21. 2-focularis -- 2-foculares.
 p. 69. l. 34. angula -- angulata.
 p. 72. l. 2. indiginae mele -- indigenae melle.
 p. 80. l. 32. emmanagoga -- emmenagoga.
 p. 90. l. 16. alterius -- alternis.
 p. 97. l. 3. nidulantibus -- nidulantibus.
 p. 101. l. 13. superantia : subrorundis --
 lege superantia : subrotundis.
 p. 104. l. 31. collitur -- collitur Cantone.
 p. 110. l. 39. observatur -- observantur.
 p. 120. l. 15. inferta -- infertae.
 p. 122. l. 15. agrestis -- agrestes.
 p. 127. l. 33. Capsium -- Capsicum.
 p. 139. l. 36. 3-focularis -- 3-foculares.
 p. 140. l. 2. aggregati -- aggregati.
 l. 15. Linnæna -- Linnæanâ.
 p. 141. l. 13. curvis -- curvis.
 p. 150. l. 21. tenuiori -- tenuiori.
 p. 153. l. 18. filiorum -- foliorum.
 p. 156. l. 21. Evonymus -- Evonymus.
 p. 170. l. 23. Grammica -- Grammica.
 l. 33. membranaceu -- membranacea.
 p. 175. l. 4. 2-pedatis -- 2-pedalis.
 l. 5. purpurafcentibus -- purpurafcentibus.
 p. 191. l. 6. tetrigynia -- tetragynia.
 p. 199. l. 9. Roung mac -- Boung mac.
 p. 204. l. 14. alumnis -- aluminis.
 p. 214. l. 14. Mieu -- Mi.
 p. 215. l. 7. thàng tằm -- thàng tằm.
 p. 229. l. 9. 251 -- 521.

- p. 230. l. 30. inrenditur -- intenditur.
 p. 232. l. 21. Allophillus -- Allophylus.
 p. 234. l. 15. alha -- alba.
 p. 236. l. 1. Maoc -- Maoc.
 p. 237. l. 19. Aioxyllum -- Aloexylum;
 p. 289. l. 5. edulis -- edulis.
 p. 327. l. 10. infecus -- inferus.
 p. 329. l. 10. Desmis -- Desmos.
 p. 333. l. 26. a vero -- cum vero.
 p. 339. l. 26. præciofa -- pretiofa.
 p. 340. l. 5. post vocavi -- dele pundum.
 p. 343. l. 10. Prothea -- Protea.
 p. 344. l. 25. deleatur titulus Descriptio Naturæ.
 p. 347. l. 36. mutæ -- multæ.

T O M. II.

- p. 364. l. 3. bracteis -- bracteis.
 p. 366. l. 30. inferus -- inferus.
 p. 375. l. 17. Sinnato -- sinuato.
 p. 381. l. 18. Dicerof -- Dicerof.
 p. 384. l. 10. ecaudatis -- ecaudatis.
 p. 389. l. 10. 1-spermis -- solitariis.
 p. 422. l. 26. Berm -- Burm.
 p. 425. l. 1. Phynchofia -- Rhynchofia.
 p. 439. l. 9. stigulis -- stipulis.
 p. 441. l. 6. bibeorus -- biflorus.
 p. 454. l. 12. binis -- bis.
 p. 455. l. 10. dele signum †
 p. 456. l. 3. abrupte -- abrupte.
 p. 465. l. 6. Thanh -- Thanh.
 l. 25. Canh -- Chanh.
 p. 466. l. 11. orbis -- orbis.
 p. 468. l. 13. ien -- bien.
 p. 486. l. 14. abstengens -- abstergens.
 p. 509. l. 1. diatus -- sulcatus.
 p. 535. l. 20. cullata -- cucullata.
 p. 539. l. 22, 23. 5-partitus -- 5-phyllus.
 p. 555. l. 27. Molos -- Moios.
 p. 563. l. 21. Ngau bang -- deleatur.
 p. 566. l. 4. planæ -- plantæ.
 p. 571. l. 28. sylvaticæ -- sylvatica.
 p. 577-37. Mocambiccum -- Mozambiccum.
 p. 592. l. 29. Cay Bau -- Cay Bau.
 p. 598. l. 33. planum -- plana.
 p. 600. l. 9. 6-phyllus -- 4-phyllus.
 p. 603. l. 15. Dioicus -- Dioicus.
 p. 603. l. 35. non tamen lactescens. deleatur!
 p. 611. l. 24. Cây Cau -- Cây Cau.
 p. 624. l. 4. fape -- fape.
 p. 632. l. 7. San tuc -- San tuc.
 p. 639. l. 31. platæ -- plantæ.
 p. 657. l. 24. polilioris -- polyphyllus.
 p. 659. l. 15. Muong truong -- Muong truong.
 p. 681. l. 8. glaber -- glabra.
 p. 683. l. 4. Râubac -- rêu bac.

I N D E X

NOMINUM COCHINCHINENSIVM,

quæ literâ Alphâ in corpore indicantur.

- A**
- Á. pag. 86.
 Áú rùng. 184.
- B**
- Bá cây. 666.
 Bạc đầu com. 495.
 Bạc đầu loun- 508.
 Bạc hà. 361.
 Bạch. bộ. 404.
 Bạch. chi. 90.
 Bạch đàn. 87.
 Bạch đàn nam. 584.
 Bạc đầu Khâu. 3.
 Bạch hạp. 207.
 Bạch hoa Xà. 119.
 Bạch phụ tử. 585.
 Bạch son. 487.
 Bạc thược. 343.
 Bạc mại. 45.
 Bạc thau rùng. 581.
 Ba đầu daì. 279.
 Ba đầu nam. 583.
- Ba đầu nhỏ lá. 280.
 Ba đầu tàu. 582.
 Bái bá. 232.
 Bái loi đêc. 253.
 Bái loi loun- 253.
 Bái loi nhót. 638.
 Bả cây. 233.
 Bậy. 389.
 Bậy cát. 417.
 Bậy chío. 418.
 Bậy chôi. 414.
 Bậy đống tiền. 413.
 Bậy giéc. 407.
 Bậy loun- 416.
 Bậy óc cây. 544.
 Bậy óc cò. 417.
 Bậy thi. 422.
 Bậy Xôi. 413.
 Bán hạ. 533.
 Bán hạ tàu. 533.
 Bả daì lá. 297.
 Bả đôn lá. 296.

- Baông Cây. 467.
 Baông baông. 681.
 Báp. 550.
 Báp. bệnh. 185.
 Bát bát tiêu. 588.
 Bát bát rùng. 589.
 Bát giác hương. 353.
 Bàu lá. 592.
 Beò cam. 550.
 Beò phù bình. 405.
 Beò tàu. 559.
 Bét. 635.
 Bí đao. 593.
 Diên bá tung. 636.
 Diên súc. 241.
 Bìm bìm biếc. 112.
 Bìm bìm dất. 106.
 Bìm bìm dòng tiền. 108.
 Bìm bìm lá dưa. 109.
 Bìm bìm lound. 108.
 Bìm bìm rùng. 107.
 Bìm bìm trắng. 108.
 Bìm bìm tiêu. 109.
 Bìm bìm Vàng. 107.
 Bí ngô. 593.
 Bình ba. 321.
 Bình bát. 350.
 Bồ bồ. 77.
 Bồ bồ biến. 105.
 Bồ bồ. 551.
 Bồ bồ hoang. 551.
 Bồ coung anh. 479.
 Bồ đao. 155.
 Bồ dể. 664.
 Bồ giẻ. 351.
 Bồ giẻ dec. 156.
 Bồ hoàng. 552.
 Bồi bồi cỏ. 103.
 Bồi bồi dec. 116.
 Bồi mẫu. 346.
 Bồ lound. 378.
 Bồn bồn. 15.
 Bồn bồn tròn lá. 127.
 Bồn hòn. 238.
 Bột muối. 446.
 Bột muối Cây. 544.
 Bột vàng dinh cây. 687.
 Bounding. 415.
 Bounding. 427.
 Bounding. 204.
 Bounding mác cây. 198.
 Bounding mác lá. 198.
 Bounding -

Boung. mặt. 456.	Cà hoang gai. 131.
Boung ngọt. 553.	Cà la va. 656.
Boung rôi. 388.	Cà na. 408.
Boung tlang dô. 75.	Cà quảnh. 132.
Boung tlang núi. 76.	Cà tàù tlang. 130.
Boung tlang tlang. 76.	Cà tàù vàng. 131.
Boung toi. 183.	Cà tien. 130.
Boung vang. 309.	Cà Ung. 131.
Boung vàng, chia lá. 421.	Cài bạch thoi. 399.
Boung vang lá. 319.	Cài bển. 400.
Bú chó. 667.	Cài cu. 399.
Búa. 648.	Cài củ. 396.
Bùi. 407.	Cài hoang. 400.
Bùi đen. 562.	Cài mỗ. 399.
Bún 331.	Cài nhà trôi. 481.
Bưởi. 467.	Cài rổ annam. 397.
Buóm bạc. 151.	Cài rổ tàù. 396.
Buóm rừng tiá. 76.	Cài sen. 399.
Buóm rừng tlang. 76.	Cám. 295.
Buóm rừng tròn lá. 146.	Cam 466.
Búp búp. 167.	Cam dăng. 271.
	Cam giá. 52.
	Cam rượu. 262.
	Cam sanh. 466.
	Cam thảo. 445.
	Cam thảo đất. 71.
	Cam

C

Cà añ. 130.
 Cà cò. 129.
 Cà được. 110.

- Cam thảo đỏ hột. 428.
 Cam trước. 282.
 Cam tung. 44.
 Cao lương củong. 5.
 Caong. 142.
 Cát căn. 439.
 Cầu cầu. 278.
 Cau cây. 567.
 Cầu cây. 611.
 Cầu Khi. 133.
 Cau rừng. 568.
 Cầu tích. 675.
 Cây cò. 374.
 Cha la. 614.
 Cham bia ăn tẩu. 432.
 Cham bia gai. 652.
 Cham bia trơn. 639.
 Châm lớn lá. 484.
 Châm nhỏ lá. 458.
 Châm trâu. 229.
 Châm trâu trắng. 273.
 Chanh cây. 465.
 Chanh ba. 232.
 Chanh cội đỏ. 142.
 Chanh cội tròn lá. 73.
 Cháong cháong. 623.
 Chập chồi. 352.
 Chắt chắt. 137.
 Châu tử. 467.
 Chày cây. 222.
 Chè Annam. 338.
 Chè bông. 363.
 Chè deàu. 339.
 Chè rau. 339.
 Chià bôi. 128.
 Chìm chìm nhà. 187.
 Chìm chìm rừng. 586.
 Chỉ Xác. 467.
 Chó dẻ. 545.
 Chối dục. . . . 608.
 Chối mồi. 660.
 Chồm Chồm. 234.
 Chồm Chồm đất. 406.
 Chon dúng. 319.
 Chua ke. 335.
 Chua me. 285.
 Chua me lá me. 285.
 Chu bien. 653.
 Chúi ba. 644.

Chúoi boi. 644.	Cổ cú lép. 43.
Chúoi cau. 644.	Cổ cúc lón. 365.
Chúoi đá 644.	Cổ đáng. 185.
Chúoi duu. 644.	Cổ đêe. 50.
Chúoi mặt. 644.	Cổ dui còung. 60.
Chúoi moi. 644.	Cổ duoi hùm. 496.
Chúoi nước. 197.	Cổ duoi lươn. 41.
Chúoi fú. 644.	Cổ duoi phụng. 542.
Chúoi tàu. 645.	Cổ dàu dàu 41.
Chúoi tieo. 644.	Cổ gà. 45.
Cổ áo cây. 649.	Cổ gạo. 49.
Cổ áo cỏ. 453.	Cổ hột gai. 177.
Cổ bò Xít. 510.	Cổ Khê. 47.
Cổ chát. 60.	Cổ lung. 49.
Cổ chày. 352.	Cổ luoi răn. 77.
Cổ chày bãi biển. 647.	Cổ măng châu. 213.
Cổ chỉ tiá. 59.	Cổ may. 553.
Cổ chỉ trắng. 59.	Cổ mè. 185.
Cổ chia ba. 445.	Com lãng. 527.
Cổ chούng. 48.	Com ngươì chia lá. 667.
Cổ chước mặt. 49.	Còm trắng. 294.
Cỏ cỏ. 103.	Còm vàng. 83.
Cổ cỏ. 371.	Cổ mục. 505.
Cổ cú. 42.	Cổ naoc. 78.
Cổ cú chít. 43.	Con hát. 500.

- Cỏ óúng. 646.
 Cỏ phỏo luóí. 50.
 Cỏ rỏt. 43.
 Cỏ roi ngựa. 27.
 Cỏ sỏu rom. 46.
 Cỏ sủ ỏ. 554.
 Cỏ the. 493.
 Cỏ thỏ. thỏ. 29.
 Cỏ đón gỏ. 186.
 Cỏ tranh. 51.
 Cỏt toỏi bỏ. 673.
 Cỏ Xuỏc. 102.
 Cỏc ỏn rau. 507.
 Cỏc bỏnh ít tím. 497.
 Cỏc bỏnh ít. vỏng. 497.
 Củ chỏoc. 533.
 Củ chỏoc gỏi. 81.
 Củc rang Kủa. 498.
 Củc tang ỏ. 506.
 Củc vỏn thỏ. 504.
 Củ óỏ chỳm. 40.
 Củ óỏ rỏi. 40.
 Củ gỏ. 182.
 Củ mỏt. 608.
 Cung cang đỏi thỏi. 592.
 Củ nhang. 514.
 Cuoi. 45.
 Cuỏn nhỏm lỏu. 182.
 Coung tỏu. 154.
 D
 Đỏi bi. 494.
 Đỏi cúc. 499.
 Đỏi boỏng. 255.
 Đỏi hoỏng chỏi lỏ. 255.
 Đỏi hỏi. 353.
 Đỏi tỏo. 157.
 Đỏo Annam. 307.
 Đỏo hoỏ hoỏng. 316.
 Đỏo huỏng tỏu. 306.
 Đỏo lỏ. 115.
 Đỏo nhỏn. 315.
 Đỏu lỏng. 23.
 Đỏu Xuỏng. 83.
 Đỏu bỏc. 441.
 Đỏu bỏn. phủ yẻn. 438.
 Đỏu bỏn tiỏ. 438.
 Đỏu bỏn tỏng. 439.
 Đỏu biẻc. 454.
 Đỏu Chỏi. 452.

Dậu dài. 434.	Dậy mằm. 451.
Dậu đà. 441.	Dèa cây. 297.
Dậu đầu. 91.	Dềa trơn lá. 665.
Dậu đen. 441.	Đeai chôn. 461.
Dậu đũa. 436.	Deanh nam. 147.
Dậu Kẽ bác. 435.	Deanh tau. 147.
Dậu lẩn rừng. 459.	Đeàu dáng. 251.
Dậu leo vàng. 463.	Đeàu lai. 573.
Dậu ma. 263.	Đeàu mọi. 555.
Dậu meo. 461.	Đeàu rai. 408.
Dậu muông. 263.	Đeàu rụy. 548.
Dậu muông ả. 435.	Đeàu sè. 555.
Dậu nanh. 441.	Đeàu sò. 411.
Dậu ngựa. 438.	Đeàu sen. 587.
Dậu nhút. 451.	Đeàu tau. 555.
Dậu phụng. 430.	Đeàu trường. 615.
Dậu rông. 437.	Đềe bốp. 572.
Dậu rựa. 437.	Đềe gạo. 571.
Dậu săng. 462.	Đềe sùng. 572.
Dậu sần rừng. 434.	Đeci chio. 341.
Dậu thẳng tau. 434.	Đeci chio tái. 342.
Dậu tiâu. 458.	Đeci dinh dang. 73.
Dậu trơn Xanh. 443.	Đeci hoa chôi. 193.
Dậu Xanh. 435.	Đeci Khê. 284.
Dậu Xuông rừng. 495.	Đeci ruột gà. 445.

Deei trôp. 67.	Dinh hương. 333.
Deei Xanh. 167.	Dinh lang. 656.
Deei Xanh. 565.	Dinh lịch. 395.
Den cây. 391.	Đo do cây. 379.
Đeo bầu. 267.	Đồ dọt cỏ. 448.
Đeo duôi. 615.	Đồ dọt cây. 544.
Đeo nịch. 236.	Đồ dọt cỏ. 46.
Deom. 123.	Đôi muông. 379.
Deom ác ba chia. 595.	Đốm đốm. 362.
Deom ác ngũ chia. 595.	Đon cây. 124.
Deón lound. 675.	Đoung quý tử. 422.
Deón tlon. 675.	Đuà 566.
Deung bộp. 663.	Đuác. 618.
Deung Cây. 314.	Dua chuột. 591.
Deung sê. 315.	Dua Gang. 591.
Deuong leo. 111.	Dua hầu. 594.
Deuong trinh đạoc. 326.	Dua nhà trời. 589.
Địa phu tử. 160.	Dua nước. 567.
Địa tam thảo. 362.	Đù đù. 628.
Diễn diễn. 446.	Đù đù deàu. 584.
Điêu gai. 217.	Dùi dloúng. 330.
Điêu hoang. 216.	Dụng dính. 569.
Đieu canh. 481.	Duôi cây. 87.
Đi giết. 612.	Duôi chồn. 530.
Đi mỗ. 114.	Duôi chồn cỏ. 681.

Duôi chuột. 619.	Góc. 596.
Dương cây. 580.	Gòn. 415.
	Gùng. 2.
E	
É lớn lá. 369.	
É nhỏ lá. 370.	
É tiá. 370.	
G	
Gai. 558.	
Gai bôm. 318.	
Gai ma buong. 270.	
Gấm. 630.	
Gang com. 149.	
Gang tiêu. 149.	
Gang tu hú. 376.	
Gáo cây. 141.	
Gên dất. 560.	
Gên gai. 561.	
Gên muối. 561.	
Gên tiá. 561.	
Gên trắng. 561.	
Giàng cuóc. 316.	
Giầu dất. 661.	
Giầu tien. 661.	
Giúi. 668.	
Gieng gieng. 428.	
	H
	Hà Khố thảo. 164.
	Hà thủ ô nam. 167.
	Hạch đảo. 573.
	Hác lon. 529.
	Hang the. 77.
	Hành. 201.
	Hạnh nhon. 316.
	Hán sản thảo. 367.
	Hay. 260.
	Hay. 433.
	Hẹ nam. 203.
	Heò tau. 210.
	Hẹ tau. 203.
	Hoa Cỏ. 50.
	Hoac huong. 364.
	Hoa dea hap. 347.
	Hoa den mouc. 528.
	Hoa hải dàng. 118.
	Hoa hoàng, Khoung gai. 323.
	Hoa hoàng tau. 323.
	Hoa hoàng tiéo. 323.

- Hoa hoàng đấng. 323.
 Hoa Huệ. 204.
 Hoa Kách. 384.
 Hoa Khóm. 179.
 Hoa Kỳ. 509.
 Hoa lal. 21.
 Hoa lai tàu. 21.
 Hoa lí. 166.
 Hoa lon tiá. 523.
 Hoa lon tàu. 524.
 Hoa mọc tây. 29.
 Hoa muông gà. 163.
 Hoa nua ngài. 175.
 Hoa phân. 101.
 Hoa phân. 299.
 Hoa phụng. 261.
 Hoa quế. 323.
 Hoa sói. 89.
 Hoa sú nam. 348.
 Hoa sú trắng. 117.
 Hoa tị ngo. 409.
 Hoa Xiêm. 652.
 Hồ điệp. 447.
 Hồ hoàng liên. 478.
 Hồ la bạc. 178.
 Hón Cây. 633.
 Hồ nổi. 180.
 Hóp. 58.
 Hột đậu gió. 126.
 Hồ tiêu. 30.
 Hột man. 82.
 Hoàng cây. 226.
 Hoàng hiến. 560.
 Hoàng căn. 419.
 Hoàng căn biếc. 420.
 Hoàng nhung. 281.
 Hoàng táo. 158.
 Hương lâu. 197.
 Hương phụ. 42.
 Hùynh bá cây. 431.
 Hùynh bá lá. 575.
 Hùynh Cầm. 456.
 Hùynh dương. 554.
 Hùynh liên. 330.
 Hùynh lon. 199.
 Hùynh lục. 80.
 Hùynh tinh. 79.
 Ich mẫu. 365.
 Í di nhân. 551.

Ien chí hoa. 101.	Kiết tương hoa. 513.	
Júa. 603.	Kiệu. 202.	
Júa rừng. 603.	Kim châm hoa. 205.	
K		
Kánh kiến cây. 582.	Kim cúc. 499.	
Káo sát. 429.	Kim Kang mô. 622.	
Ké. 563.	Kim Kang rế. 623.	
Kê. 288.	Kim Kuit. 153.	
Kê cồ. 46.	Kim Kúit. 467.	
Khoai buu. 194.	Kim loung bánh. 25.	
Khoai cà. 528.	Kim luon. 672.	
Khoai cà hoa vàng. 106.	Kim ngân hoa nam. 150.	
Khoai lang. 107.	Kim ngân hoa tà. 150.	
Khoai leng. 625.	Kim phụng. 454.	
Khoai lồ. 625.	Kính giải nam. 374.	
Khoai mài. 624.	Kính giải tà. 373.	
Khoai ngà. 625.	Kôi xay. 414.	
Khoai tiá. 623.	Kuà gà. 431.	
Khoai tù. 108.	Kuông huyễn. 6.	
Khoai Xiêm. 112.	L	
Khoan đông hoa. 501.	La bạc. 396.	
Khổ sâm hoa tía. 455.	Lá bạc thau. 134.	
Khổ sâm hoa vàng. 455.	Lá buon. 604.	
Khổ thảo. 478.	Lách. 52.	
Khúc khác. 622.	Lách Khén. 578.	

- Lác làm chióc. 42.
 Lác tròn. 42.
 Lá deaong. 13.
 Lá líp. 213.
 Lá mấ^u cấ^u. 336.
 Lao linh. 72.
 Laóc chó. 667.
 Laong nảo. 249.
 Lá fa. 646.
 Lá trung cưỡn. 282.
 Lau. 53.
 Lâu. 144.
 Lâu bạc. 23.
 Lê ngành đố. 472.
 Lê ngành đấng. 471.
 Lê cây. 321.
 Liểo đố. 612.
 Liểo lá tle. 609.
 Lim vàng. 266.
 Lo buồn. 102.
 Lon bon. 662.
 Lon diêu rầu. 207.
 Lọ nẹ. 68.
 Lờ. 32.
 Lòung đèn. 488.
 Luá. 214.
 Luá mì. 59.
 Luá chính mùa. 215.
 Luá nếp. 215.
 Luá rẩy. 215.
 Luá tháng tám. 215.
 Lục cây. 261.
 Lục chốt. 121.
 Lục đầu. 435.
 Lục lạc. 429.
 Lu hội. 203.
 Lụi. 657.
 Lu lu Cái. 142.
 Lu lu dục. 129.
 Lu lu lound. 133.
 Lung. 11.
 Lươ^u mèò. 68.
 Lươ^u ròùng. 306.
 Lươ^u rầu. 165.
 Lựu chua. 314.
 Lựu ngọt. 313.

M

- Mạ ca cây. 70.
 Mạ ca lá chùm. 120.
 Mả^u cây. 296.

Mạch mao. 645.	Mật. đất. 393.
Mạch môn doung. 40.	Mật tang. 486.
Mạch môn nam. 543.	Máu chó. 605.
Mạch nha. 59.	Mây báo. 211.
Mác lừng. 370.	Mây báo bò cây. 212.
Mã. đê. 71.	Mây đá. 209.
Mã hoàng. 671.	Mây dăng. 210.
Mai boung vàng. 338.	Mây nước. 210.
Mã lân hoa. 503.	Mây ra. 210.
Mãng cầu. 349.	Mây saóng. 209.
Mang tang. 252.	Mây tũt. 211.
Mạn Kinh. 390.	Mè. 382.
Màn màn tiá. 397.	Mè cây. 403.
Màn màn. lừng. 398.	Mè đất. 264.
Màn ri. 174.	Mè đất. 366.
Màn thiên hương. 146.	Mè gà. 620.
Maóc com. 236.	Men. 276.
Maóc hột. 312.	Meo. 229.
Maóc meo. 265.	Mé tít. 4.
Maóc neo. 113.	Mé tít bà. 5.
Maóng tay cò. 512.	Mì. 59.
Maóng tay nhuộm. 229.	Mĩa. 52.
Maóng tay rau. 512.	Miếng sanh bãng lá. 251.
Maóng trâu. 678.	Miếng sanh caòng lá. 252.
Mạt cây. 82.	Mít. 546.
	Cccc
	Mít

- Mít nai. 547.
 Móc hoa đỏ. 115.
 Móc hoa trắng. 116.
 Mỏ cua. 573.
 Mu ho. 57.
 Mồi cây. 317.
 Mồi deci. 621.
 Mồi deci đlon. 609.
 Mỏn củ. 535.
 Mót. 574.
 Mỏn đlá. 551.
 Mỏn bánh hu. 697.
 Mỏn biét. 596.
 Mỏn đá. 697.
 Mỏn qua. 322.
 Mỏn tấc. 671.
 Mỏn thuong. 345.
 Mỏn Xanh tái hu. 697.
 Mua. 273.
 Mua thấp. 274.
 Mu củn. 634.
 Muối trói. 483.
 Muồng bién. 169.
 Muồng đất. 451.
 Muồng deci. 462.
 Muồng chượng. 239.
 Muồng chượng chùm. 240.
 Muồng nước. 225.
 Muồng rau. 109.
 Muồng trượng. 659.
 Mun. 613.
 Muóp dảng. 589.
 Muóp Khén. 591.
 Muóp ngọt. 590.
 Muóp sác. 136.
 Muóp sác. 588.
 Mu tru. 348.
 Mu u. 470.
N
 Na. 158.
 Nác nẻ. 511.
 Năm cau. 692.
 Năm Cây mục. 692.
 Năm chó. 694.
 Năm chuông. 691.
 Năm cục. 696.
 Năm củ. 693.
 Năm cút boi. 696.
 Năm cút ngựa. 691.
 Năm cút trâu. 691.
 Năm

N O M I N U M C O C H I N C H I N E N S I U M. 237

Năm dế. 691.	Nến hoa tím. 443.
Năm Gốc. 695.	Ngài bà. 220.
Năm juá. 693.	Ngài điệp. 491.
Năm meò. 695.	Ngài hoang. 10.
Năm moi. 690.	Ngài mặt trời. 2.
Năm moúc. 692.	Ngài moi. 9.
Năm rách. 694.	Ngài Xanh. 2.
Năm răn. 694.	Ngaoc điệp. 24.
Năm rôm. 691.	Ngaoc phù dương. 489.
Nam tinh. 534.	Ngaoc trâm hoa. 105.
Nam tinh tâu. 533.	Ngaông. 667.
Năm dăng nhâm. 693.	Ngát. 196.
Năm dúng. 692.	Ngâu. 173.
Năm trâm. 695.	Ngáy. 666.
Năm Xôi. 693.	Ngé. 6.
Năn cũ. 16.	Ngé bà. 140.
Năn thập. 43.	Ngé hoang. 9.
Nàng hai. 557.	Ngעי Chia lá. 325.
Nàng hai lound. 558.	Ngעי hoa tí. 324.
Nàng hai đon. 558.	Ngעי tòn lá. 324.
Nang nang. 70.	Ngò. 180.
Nấp ẩm. 606.	Ngô châu dau. 181.
Nén cây. 311.	Ngón. 140.
Nén cũ. 202.	Nguc ngac. 379.
Nếnh hoa đỏ. 444.	Ngũ già bì. 187.

- Ngủ tráo. 390.
 Nguyệt quý. 270.
 Nguyệt quý tau. 271.
 Nha dam. 203.
 Nhánh ba. 649.
 Nhánh gỏi lon. 519.
 Nhánh gỏi nhọn lá. 195.
 Nhánh gỏi rit. 520.
 Nhaoc. 351.
 Nhaoc. 629.
 Nhàu. 140.
 Nhứt bien tung. 639.
 Nho rừng. 155.
 Nho rừng Chia lá. 155.
 Nho tau. 155.
 Nhòn cây. 233.
 Nhòn cút dề. 234.
 Nhòn sâm phủ yen. 36.
 Nhòn trần nam. 386.
 Nhum. 676.
 Nhút. 90.
 Nhút rau. 654.
 Nổ. 309.
 Nua củ. 300.
 Nu áo ria. 504.
 Nu áo trơn. 505.
 Nu deei. 521.
 Nu trinh thảo. 389.
 O.
 Ô dục. 251.
 Ôi. 532.
 Ôi. 309.
 Ôi rừng nhỏ. 310.
 Ô mọc. 613.
 Ô rô cây. 91.
 Ô rô thấp. 375.
 Ốc cây. 128.
 Ốc tiền đá. 127.
 Ốc tau. 127.
 Óng thoáng. 58.
 P.
 Pháo lưới. 471.
 Phaong lon. 525.
 Phaong phung. 508.
 Phất dau. 196.
 Phục bồn tử. 325.
 Phủ dương. 419.
 Q.
 Quách lon diêu. 521.
 Quách rế. 37.

Quạ deci. 588.	Rát. 83.
Quan âm biền. 390.	Rát chiá ba. 70.
Quao. 380.	Rát loun. 86.
Quạ quạ. 595.	Rát nhỏ lá. 88.
Quế. 249.	Rau bung. 410.
Quế rãnh. 250.	Rau chiéo. 162.
Quòng. 187.	Rau chiéo heo. 384.
	Rau chiéo luong. 383.
R	Rau chiéo nước. 384.
Rác. 157.	Rau chon vit. 380.
Rạch loun. 563.	Rau cúc. 486.
Rạch tlon. 176.	Rau dảng. 385.
Râm. 19.	Rau diep hoang. 480.
Ran. 235.	Rau diep nhà. 480.
Ráng. 268.	Rau diep tà. 479.
Ráng lá. 677.	Rau éo tía. 193.
Rành rãnh Chối. 160.	Rau giáp Cá. 613.
Raong. 688.	Rau hien. 205.
Raong bai biền. 689.	Rau juà. 275.
Raong biền. 688.	Rau Kân hoang. 179.
Raong hai thú lá. 244.	Rau Kân nhà. 180.
Raong mái cheo. 663.	Rau Kân nước. 179.
Raong nôi. 688.	Rau Kaóc. 493.
Raong thía thía. 688.	Rau Kém. 114.
Raong tlon lá. 105.	Rau lui. 485.
Ráo ráo. 159.	

Rau má. 176.	Rau toni. 231.
Rau má m ^o . 177.	Ráy bạc hà. 534.
Rau me ^o . 371.	Ráy cây. 536.
Rau mo. 171.	Ráy hoang. 535.
Rau môi. 112.	Ráy leo. 532.
Rau mu ^o ng. 109.	Ráy tía. 534.
Rau nha ^o ng. 364.	Ráy t ^u ng. 535.
Rau ngu ^o . 381.	Rê ^o quách. 37.
Rau ngu ^o hoang. 361.	Ré quat. 36.
Rau ngu ^o úng. 115.	Rêu bạc. 683.
Rau nhút. 654.	Rêu báy cá. 686.
Rau quê. 370.	Rêu bọt. 687.
Rau ram. 243.	Rêu bọt t ^u ng. 685.
Rau ram nhà t ^u oi. 240.	Rêu cây. 682.
Rau ri ^o . 40.	Rêu cau. 685.
Rau sâm. 293.	Rêu chỉ r ^o i. 687.
Rau sóng chua. 242.	Rêu đá. 685.
Rau sóng ău g ^o i. 496.	Rêu đ ^u ng. 683.
Rau thom đất. 381.	Rêu gác mai. 686.
Rau thom l ^u ng. 372.	Rêu rừng. 685.
Rau thom nam. 361.	Rêu thành g ^o ch. 687.
Rau thom r ^u i. 360.	Rêu th ^u m nhà. 682.
Rau t ^u i ă ^o n. 38.	Rêu t ^u c m ^u c. 686.
Rau t ^u i l ^u ng. 39.	Rêu Xanh. 684.
Rau t ^u i d ^u u. 39.	Riêng. 5.

Ri ri bò foug. 637.	Sim rừng lớn. 312.
Ri ri boung gáo. 68.	Sim rừng nhỏ. 312.
Ri ri bụi. 651.	Sinh Kường. 2.
Ri ri cát. 121.	Sơ đũa. 170.
Ri ri cây. 67.	Sỏi cây. 308.
Rum 48f.*	Sỏi tiá. 610.
S	
Sài hồ nạm 164.	Son cây. 72.
Sấm com. 622.	Son cây. 337.
Sấm cay. 231.	Son cỏ. 497.
Sấm deái củ. 439.	Son châu dũ. 138.
Sanh cây. 665.	Son dong. 427.
Sa nhon. 4.	Song. 80.
San hô Xanh. 299.	Son già Cây. 606.
Sấm rừng. 440.	Son lục. 134.
Sấm ruộng. 439.	Son mọc. 345.
San tũ. 632.	Son tra. 320.
Sao cây. 137.	Sốt cây. 630.
Saong Kẽm. 114.	Soung chua. 420.
Sâu dầu cây. 269.	Sủ cuốn củ. 274.
Sâu dầu chươt. 72.	Sung cây. 664.
Sâu dầu rừng. 658.	Sung taũ. 664.
Sây. 54.	Sung bò. 118.
Sen. 340.	Sung trâu. 117.
Sim nhậ. 312.	T
	Tám buoi. 556.

Tam đầu. 443.	Thiên hoa. 686.
Tam lang. 307.	Thiên liên. 12.
Tam nại. 12.	Thiên môn đong. 216.
Tam phong. 239.	Thiên pháo. 129.
Tam thất. 485.	Thiết cốt tâu. 367.
Táo tiên. 201.	Thổ phục linh. 622.
Tạo giác. 652.	Thoung Cây. 579.
Tây dương Chối. 28.	Thoung đất. 682.
Tê tấn. 292.	Thoung tâu. 579.
Thạch haoc. 518.	Thoung thảo. 344.
Thạch hoa. 690.	Thuốc ăn. 111.
Thạch lưu. 313.	Thuốc dục. 343.
Thạch vị. 672.	Thuốc gội. 654.
Thạch vị deei. 672.	Thuốc Kúu. 491.
Thạch Xương bồ. 208.	Thuốc lác nhỏ. 26.
Thanh hao. 490.	Thuốc mọi. 122.
Thanh laong. 298.	Thuốc mọi. 139.
Thanh thương tử. 163.	Thuốc ôn. 390.
Thanh yên. 465.	Thuốc ôn rừng. 390.
Thảo quả. 4.	Thương sơn. 301.
Thất phát. 32.	Thủy tung. 490.
Thị cây. 227.	Thủy Xương bồ. 208.
Thị trầm. 228.	Tiá tô đất. 362.
Thích đong bì. 427.	Tiá tô nhậm lá. 368.
Thích thảo. 363.	Tiá tô rừng. 367.

Tiá tô tau. 372.	To hoàng đằng. 171.
Ti bà diep. 319.	To hoàng Xanh. 247.
Tiêu hồi. 181.	Tô hạp bình Khang. 230.
Tieu bô. 30.	Toi. 201.
Tieu rừng. 30.	Toi loi. 198.
Tla. 418.	Tô mouch. 262.
Tl ₂ làm chio. 418.	Trác bá diep. 580.
Tlai cây. 376.	Trach lan. 483.
Tlai loun. 581.	Trái. 55.
Tlai đen. 143.	Trám. 311.
Tlai thom. 192.	Trám ná. 74.
Tlai Xiem. 264.	Trám ung. 557.
Tlám cây. 235.	Tranh Cỏ. 53.
Tlám bô. 308.	Trần hùynh. 332.
Tlám cây. 468.	Traóc máu. 526.
Tlám deci. 650.	Trúc. 55.
Tlâu ăn. 31.	Trường cây. 334.
Tle lang nga. 58.	Trường deci. 293.
Tle núa. 58.	Trường Khế. 649.
Tle si. 57.	Truong sinh. 24.
Tle vườn. 56.	Truong sinh lớn lá. 287.
Tlo cây. 212.	Truong sinh rách lá. 286.
Tlùn cây. 274.	Truong sinh tròn lá. 287.
Toán táo. 158.	Trường trường. 655.
Tổ diá. 651.	Truong Xiên hơi. 135.

ERRATA

Infucti typographi patienter corriges: aliqua hic norantur. Litera p paginam, l lineam ostendit.

T O M O I.

- P. X. l. 35. auctus - - - auctum.
 p. XII. l. 30. noxas - - - noxias.
 l. 34. Germina - - - Pistilla.
 p. x. l. 17, & 19. petala - - - petals.
 p. 2. l. 29. febribus - - febribus.
 p. 5. l. 7. infundebulliformis - - infundibuliformis.
 p. 5. l. 13. glabrum - - - glabrum.
 p. 8. l. 13. infistens - - - infistens.
 p. 9. l. 8. Mjo - - - Mj.

 p. 12. l. 22. subrotunum - - - subrotundum.
 p. 13. l. 23. acanlis - - - acaulis.
 p. 19. l. 16. Genu - - - Genus.
 p. 29. l. 10. habiat - - - habitat.
 p. 32. l. 19. lougum - - longum.
 l. 39. Plumicro - - Plumierio.
 p. 42. l. 26. rotuddus - - rotundus.
 q. 44. l. 23. accurrunt - - occurrunt.
 p. 45. l. 7. Diofcoridis - - Diofcorides.
 l. 38. pollitari - - pollicari.
 p. 46. l. 12. annus - - annuus.
 p. 47. l. 34. habitat - - habitant.
 p. 48. l. 3. Alopecurs - - Alopecurus.
 l. 9. r-floris - - r-florus.
 p. 48. l. 26. annus - - annuus.
 p. 53. l. 4. saccheum - - saccharum.
 l. 10. aliquod - - aliquot.
 p. 56. l. 8. fessilis - - fessilibus.
 p. 63. l. 18. 4-partibus - - 4-partitus.
 p. 67. l. 21. 2-locularis - - 2-loculares.
 p. 69. l. 34. angula - - angulata.
 p. 72. l. 2. indiginæ mele - - indiginæ melle.
 p. 80. l. 32. emmanagoga - - emmenagoga.
 p. 90. l. 16. alterius - - alternis.
 p. 97. l. 3. nidulantibus - - nidulantibus.
 p. 101. l. 13. superantia: subrotundis - -
 lege superantia: subrotundis.
 p. 104. l. 31. collitur - - collitur Cantone.
 p. 110. l. 39. observatur - - observantur.
 p. 120. l. 15. inferta - - inferta.
 p. 122. l. 15. agrestis - - agrestes.
 p. 127. l. 33. Capsum - - Capicum.
 p. 139. l. 36. 3-locularis - - 3-loculares.
 p. 140. l. 2. aggregati - - aggregati.
 l. 15. Linnauna - - Linnauna.
 p. 141. l. 13. curvis - - curvis.
 p. 150. l. 21. tenacori - - tenuiori.
 p. 153. l. 18. filiorum - - foliorum.
 p. 156. l. 21. Evonymus - - Evonymus.
 p. 170. l. 23. Grammica - - Grammica.
 l. 33. membranaceu - - membranacea.
 p. 175. l. 4. 2-pedatis - - 2-pedalis.
 l. 5. purpurafcentibus - - purpurafcentibus.

 p. 191. l. 6. tetragynia - - tetragynia.
 p. 199. l. 9. Roung mac - - Boung mac.
 p. 204. l. 14. alumnis - - aluminis.
 p. 214. l. 14. Mêu - - Ml.
 p. 215. l. 7. thâng tlam - - thâng tám.

- p. 216. l. 27, & p. 217. l. 6. diéd - - Diéu.
 p. 229. l. 9. 231 - - 521.
 p. 230. l. 10. inrenditur - - intenditur.
 p. 232. l. 21. Allophillus - - Allophylus.
 p. 234. l. 15. alhx - - alba.
 p. 236. l. 11. Mãc - - Mãc.
 p. 237. l. 19. Aioexylum - - Aloexylum.
 p. 289. l. 5. edulis - - edulius.
 p. 327. l. 10. infecus - - inferus.
 p. 329. l. 10. Desmis - - Desmos.
 p. 333. l. 26. a vero - - cum vero.
 p. 339. l. 26. præciofx - - pretiofx.
 p. 340. l. 5. post vocavi - - ãele pundum.
 p. 343. l. 10. Prothea - - Protea.
 p. 344. l. 25. delectat titulus Descriptio Naturalis.
 p. 347. l. 36. mutæ - - multæ.

T O M O II.

- p. 364. l. 3. bracteis - - bracteis.
 p. 366. l. 30. inferus - - inferius.
 p. 375. l. 17. Sinnato - - sinuato.
 p. 381. l. 18. Dicerfos - - Diceros.
 p. 384. l. 10. ecaudatis - - ecaudatis.
 p. 389. l. 10. 1-spermis - - folitatis.
 p. 425. l. 33. delineato - - delineatio.
 p. 422. l. 26. Berm - - Burn.
 p. 425. l. 11. Phynchofia - - Rhynchofia.
 p. 439. l. 9. stigulis - - stipulis.
 p. 441. l. 6. biblots - - biflorus.
 p. 454. l. 12. binis - - bis.
 p. 455. l. 10. ãele signum †
 p. 456. l. 3. abtuptè - - abruptè.
 p. 465. l. 6. Tanh - - Thanh.
 l. 25. Canh - - Cãnh.
 p. 466. l. 11. obls - - orbis.
 p. 468. l. 13. ien - - bien.
 p. 486. l. 14. abstengens - - abstergens.
 p. 509. l. 11. diatus - - fulcatus.
 p. 535. l. 20. cullata - - cucullata.
 p. 539. l. 22, 23. 5-partitus - - 5-phyllus.
 p. 555. l. 27. Molos - - Moios.
 p. 563. l. 21. Nguu dang ã - delectur.
 p. 566. l. 4. plauc - - plantæ.
 p. 571. l. 28. sylvaticæ - - sylvatica.
 p. 577. l. 37. Mocambicum - Mozambicum.

 p. 592. l. 29. Cay Bàu - - Cây Bàu.
 p. 598. l. 33. planum - - plana.
 p. 600. l. 0. 6-phyllus - - 4-phyllus.
 p. 603. l. 15. Dioicus - - Dioicus.
 p. 603. l. 35. non tamen lactescens. delectur.

 p. 611. l. 24. Cây Càu - - Cây Càu.
 p. 624. l. 4. fape - - fape.

 p. 632. l. 7. San tuè^h - - San tuè.
 p. 639. l. 31. platæ - - plantæ.
 p. 659. l. 15. Muông tróung - Muông tróung.
 p. 681. l. 8. glaber - - glabra.
 p. 683. l. 4. Raubac - - rêu bạc.